

Mock-up Label

Net Contents/Contenu Net: XX L = 3.8L, 4 x 3.8L, 18.9L, 56.8L, 208L, 1040 L

DIN 02299720

Veterinary use only / Usage vétérinaire seulement

HEXI PREP

1.6% w/w CHLORHEXIDINE ACETATE UDDER WASH

LAVE-PIS À BASE D'ACETATE DE CHLORHEXIDINE 1.6% p/p

WARNINGS: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Avoid breathing vapours. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention if symptoms occur or persist. Wash hands thoroughly after handling product. Do not use for cleaning or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

INDICATIONS: An udder wash used as an aid in preventing and controlling mastitis in dairy cattle by reducing the bacterial population on teats and udders.

ACTIVE INGREDIENTS: Chlorhexidine Acetate 1.6% w/w

DIRECTIONS FOR USE:

Prepare solution by adding 30mL of HEXI PREP solution to 10 L of warm water. Prior to each milking, approximately 1 minute before applying teat cups, dip a single service paper towel into the solution and wash udder and teats. Dry the udder and teats before milking. Avoid contamination of udder wash. When the solution becomes visibly dirty, discard and use fresh solution.

CAUTIONS: Consult your veterinarian before using on teats that are irritated.

STORAGE CONDITIONS: Store between 15°C and 30°C. Avoid freezing. Dispose of product according to municipal guidelines. Keep container closed.

**Manufactured by/Fabriqué par Agrisan Specialty Chemical & Pharmaceutical (A Division of Agrisan Inc),
451 Smith Street P.O. Box 69, Arthur, Ontario, N0G 1A0 1-877-731-7194 www.agrisan.ca**

MISES EN GARDE: Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux si des symptômes apparaissent ou persistent. Bien se laver les mains après manipulation du produit. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

INDICATIONS: Un lave-pis pour aider à prévenir et contrôler la mammite chez les vaches laitières en réduisant la population bactérienne sur les pis et les trayons.

INGRÉDIENTS ACTIFS: Acétate de chlorhexidine 1,6% p/p

MODE D'EMPLOI:

Préparez la solution en ajoutant 30 ml de HEXI PREP à 10 L d'eau chaude. Avant chaque traite, trempez une serviette fraîche dans la solution et lavez le pis et les trayons environ une minute avant d'attacher la

Mock-up Label

trayeuse. Séchez le pis et les trayons avant la traite. Évitez la contamination de la solution lave-pis. Quand la solution devient visiblement sale, jetez-la et préparez une solution fraîche.

PRÉCAUTIONS: Consulter votre vétérinaire avant d'utiliser sur les trayons irrités.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE : Entreposer entre 15°C à 30°C. Protéger du gel. Se débarrasser du produit selon les directives municipales. Garder le récipient fermé.

LOT : XXXXXX

EXP : XX/XX



AGRISAN SC PHARMA



HEXI PREP

DIN 02299720

1.6% Chlorhexidine Acetate Udder Wash Lave-pis à base d'acéte de chlorhexidine 1,6%

Indications: An udder wash used as an aid in preventing and controlling mastitis in dairy cattle by reducing the bacterial population on teats and udders.

Directions For Use:

Prepare solution by adding 30mL of HEXI PREP solution to 10 L of warm water. Prior to each milking, approximately 1 minute before applying teat cups, dip a single service paper towel into the solution and wash udder and teats. Dry the udder and teats before milking. Avoid contamination of udder wash. When the solution becomes visibly dirty, discard and use fresh solution.

Warnings: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Avoid breathing vapours. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention if symptoms occur or persist. Wash hands thoroughly after handling product. Do not use for cleaning or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

Cautions: Consult your veterinarian before using on teats that are irritated.

Storage Conditions: Store between 15°C and 30°C. Avoid freezing. Dispose of product according to municipal guidelines. Keep container closed.

Active Ingredients: Chlorhexidine Acetate 1.6% w/w

LOT:

EXP:

NET CONTENTS/CONTENU NET: 3.8 L 4x3.8 L 18.9 L 56.8 L 208 L 1040 L

Manufactured By/
Fabriqué par:

AGRISAN

Specialty Chemical & Pharmaceutical (A Division of Agrisan Inc)
451 Smith St., P.O. Box 69, Arthur, Ontario N0G 1A0
www.agrisan.ca 1-877-731-7194

Revision/Révision: 26-10-21

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Indications: Un lave-pis pour aider à prévenir et contrôler la mammite chez les vaches laitières en réduisant la population bactérienne sur les pis et les trayons.

Mode d'Emploi:

Préparez la solution en ajoutant 30 ml de HEXI PREP à 10 L d'eau chaude. Avant chaque traite, trempez une serviette fraîche dans la solution et lavez le pis et les trayons environ une minute avant d'attacher la trayeuse. Séchez le pis et les trayons avant la traite. Évitez la contamination de la solution lave-pis. Quand la solution devient visiblement sale, jetez-la et préparez une solution fraîche.

Mises en garde: Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux si des symptômes apparaissent ou persistent. Bien se laver les mains après manipulation du produit. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

Précautions: Consulter votre vétérinaire avant d'utiliser sur les trayons irrités.

Conditions d'entreposage: Entreposer entre 15°C à 30°C. Protéger du gel. Se débarrasser du produit selon les directives municipales. Garder le récipient fermé.

Ingrédients actifs: Acéte de chlorhexidine 1,6% p/p