

Pouch 100 g, front panel (bilingual) Super Booster – BAM LP

DIN 00524115

Pr Super Booster

WATER SOLUBLE ANTIBIOTIC AND VITAMIN POWDER FOR SWINE AND CALVES
POUDRE HYDROSOLUBLE D'ANTIBIOTIQUES ET DE VITAMINES POUR PORCS ET
VEAUX

Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement

Active ingredients	per pouch/par sachet (100 g)	Ingrédients actifs
Penicillin G potassium	4 961 333 I.U./U.I.	Pénicilline G potassique
Streptomycin sulfate	15 333 mg	Sulfate de streptomycine
Vitamin A	750 000 I.U./U.I.	Vitamine A
Vitamin D ₃	250 000 I.U./U.I.	Vitamine D ₃
Vitamin B ₁₂	241 µg	Vitamine B ₁₂
Riboflavin	333 mg	Riboflavine
Calcium d-pantothenate	750 mg	d-pantothénate de calcium
Niacinamide	2 500 mg	Niacinamide
Pyridoxine HCl	326 mg	Pyridoxine HCl
Vitamin K ₃	333 mg	Vitamine K ₃
Vitamin E (dl-alpha-tocopheryl acetate)	750 I.U./U.I.	Vitamine E (acétate de dl-alpha tocophérol)

Net 100 g

WARNINGS: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 5 days after the latest treatment with this drug. Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

MISES EN GARDE : Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 5 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.



Bio Agri Mix LP
PO Box 399 / CP 399
Mitchell, ON
NOK 1N0



**CONTAINS
ANTIMICROBIAL
USE RESPONSIBLY**
**CONTIENT UN
ANTIMICROBIEN
UTILISEZ DE FAÇON RESPONSABLE**

Pouch 100 g, back panel, left side (English version) Super Booster – BAM LP

DESCRIPTION

A water soluble vitamin powder medicated with penicillin G potassium and streptomycin sulfate.

INDICATIONS

Swine and calves: As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours).

DOSAGE and ADMINISTRATION

To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.

Swine (scours): Dissolve 300 g (3 pouches) in 250 L of drinking water and administer orally for 4 or 5 days.

Calves (scours): Administer 4 g of powder per 45 kg of body weight; mix with water or milk and give orally every 12 hours for 2 or 3 days.

CAUTIONS

These solutions are not stable for more than 24 hours. Prepare fresh solutions daily. Give no other drinking water during the treatment. Provide ample watering space. Proper sanitary measures should prevail. If no improvement is noted after 5 days, the diagnosis should be re-evaluated.

1 teaspoonful equals 4 g.

STORAGE CONDITIONS

Store between 15°C and 25°C. Protect from moisture.

Rev. BAM Feb 25/22

Pouch 100 g, back panel, right side (French version) Super Booster – BAM LP

DESCRIPTION

Une poudre hydrosoluble de vitamines contenant de la pénicilline G potassique et du sulfate de streptomycine.

INDICATIONS

Porcs et veaux : Pour aider au traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée).

POSOLOGIE et ADMINISTRATION

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Porcs (diarrhées) : Dissoudre 300 g (3 sachets) dans 250 L d'eau de boisson et administrer par voie orale pendant 4 ou 5 jours.

Veaux (diarrhées) : Administrer 4 g de poudre par 45 kg de poids corporel; mélanger dans l'eau ou du lait et donner par voie orale à toutes les 12 heures pendant 2 ou 3 jours.

PRÉCAUTIONS

Ces solutions ne sont plus stables après 24 heures. Préparer des solutions fraîches chaque jour. Ne servir que de l'eau médicamenteuse pendant le traitement. Voir à ce qu'il y ait amplement d'abreuvoirs. Appliquer de bonnes mesures sanitaires. Si des résultats favorables ne sont pas évidents après 5 jours, le diagnostic devrait être réévalué.

1 c. à thé équivaut à 4 g.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Entreposer entre 15°C et 25°C. Protéger contre l'humidité.

Lot :

Exp. :

Pouch 400 g, front panel (bilingual) Super Booster – BAM LP

Pr Super Booster

WATER SOLUBLE ANTIBIOTIC AND VITAMIN POWDER FOR SWINE AND CALVES
POUDRE HYDROSOLUBLE D'ANTIBIOTIQUES ET DE VITAMINES POUR PORCS ET
VEAUX

Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement

Net 400 g

Active ingredients	per pouch/par sachet (400 g)	Ingrédients actifs
Penicillin G potassium	19 845 332 I.U./U.I.	Pénicilline G potassique
Streptomycin sulfate	61 332 mg	Sulfate de streptomycine
Vitamin A	3 000 000 I.U./U.I.	Vitamine A
Vitamin D ₃	1 000 000 I.U./U.I.	Vitamine D ₃
Vitamin B ₁₂	964 µg	Vitamine B ₁₂
Riboflavin	1 332 mg	Riboflavine
Calcium d-pantothenate	3 000 mg	d-pantothénate de calcium
Niacinamide	10 000 mg	Niacinamide
Pyridoxine HCl	1 304 mg	Pyridoxine HCl
Vitamin K ₃	1 332 mg	Vitamine K ₃
Vitamin E (dl-alpha-tocopheryl acetate)	3 000 I.U./U.I.	Vitamine E (acétate de dl-alpha tocophérol)

WARNINGS: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 5 days after the latest treatment with this drug. Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

MISES EN GARDE : Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 5 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

DIN 00524115



Bio Agri Mix LP
PO Box 399 / CP 399
Mitchell, ON
NOK 1N0



Rev. BAM Feb 25/22

BAM Feb 25/22

Pouch 400 g, back panel, left side (English version) Super Booster – BAM LP

DESCRIPTION

A water soluble vitamin powder medicated with penicillin G potassium and streptomycin sulfate.

INDICATIONS

Swine and calves:

As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours).

DOSAGE and ADMINISTRATION

To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.

Swine (scours):

Dissolve 400 g (1 pouch) in 330 L of drinking water and administer orally for 4 or 5 days.

FOR AUTOMATIC PROPORTIONER:

Set the apparatus to distribute 30 mL stock solution per 3.78 L of drinking water (1 oz/gallon U.S.). Prepare the stock solution by dissolving 400 g (1 pouch) in 2.6 L of water. This will medicate 330 L of drinking water.

Calves (scours):

Administer 4 g of powder per 45 kg of body weight; mix with water or milk and give orally every 12 hours for 2 or 3 days.

CAUTIONS

These solutions are not stable for more than 24 hours. Prepare fresh solutions daily. Give no other drinking water during the treatment. Provide ample watering space. Proper sanitary measures should prevail. If no improvement is noted after 5 days, the diagnosis should be re-evaluated.

1 teaspoonful equals 4 g.

STORAGE CONDITIONS

Store between 15°C and 25°C. Protect from moisture.

Pouch 400 g, back panel, right side (French version) Super Booster – BAM LP

DESCRIPTION

Une poudre hydrosoluble de vitamines contenant de la pénicilline G potassique et du sulfate de streptomycine.

INDICATIONS

Porcs et veaux :

Pour aider au traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée).

POSOLOGIE et ADMINISTRATION

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Porcs (diarrhées) :

Dissoudre 400 g (1 sachet) dans 330 L d'eau de boisson et donner par voie orale pendant 4 ou 5 jours.

POUR DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE :

Ajuster l'appareil pour qu'il distribue 30 ml de solution concentrée par 3,78 L d'eau de boisson (1 oz/gallon E.-U.). Préparer une solution concentrée en dissolvant 400 g (1 sachet) dans 2,6 L d'eau. Sert à traiter 330 L d'eau de boisson.

Veaux (diarrhées) :

Administer 4 g de poudre par 45 kg de poids corporel; mélanger dans l'eau ou le lait et donner par voie orale à toutes les 12 heures pendant 2 ou 3 jours.

PRÉCAUTIONS

Ces solutions ne sont plus stables après 24 heures. Préparer des solutions fraîches chaque jour. Ne servir que de l'eau médicamenteuse pendant le traitement. Voir à ce qu'il y ait amplement d'abreuvoirs. Appliquer de bonnes mesures sanitaires. Si des résultats favorables ne sont pas évidents après 5 jours, le diagnostic devrait être réévalué.

1 c. à thé équivaut à 4 g.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE : Entreposer entre 15°C et 25°C. Protéger contre l'humidité.

Lot :

Exp. :

Pail 10 kg, center panel (bilingual) Super Booster – BAM LP

Pr Super Booster

WATER SOLUBLE ANTIBIOTIC AND VITAMIN POWDER FOR SWINE AND CALVES
POUDRE HYDROSOLUBLE D'ANTIBIOTIQUES ET DE VITAMINES POUR PORCS ET
VEAUX

Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement

Net 10 kg

Active ingredients	per/par 100 g	Ingrédients actifs
Penicillin G potassium	4 961 333 I.U./U.I	Pénicilline G potassique
Streptomycin sulfate	15 333 mg	Sulfate de streptomycine
Vitamin A	750 000 I.U./U.I.	Vitamine A
Vitamin D ₃	250 000 I.U./U.I.	Vitamine D ₃
Vitamin B ₁₂	241 µg	Vitamine B ₁₂
Riboflavin	333 mg	Riboflavine
Calcium d-pantothenate	750 mg	d-pantothénate de calcium
Niacinamide	2 500 mg	Niacinamide
Pyridoxine HCl	326 mg	Pyridoxine HCl
Vitamin K ₃	333 mg	Vitamine K ₃
Vitamin E (dl-alpha-tocopheryl acetate)	750 I.U./U.I.	Vitamine E (acétate de dl-alpha tocophérol)

WARNINGS: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 5 days after the latest treatment with this drug. Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

MISES EN GARDE : Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 5 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

DIN 00524115



Bio Agri Mix LP
PO Box 399 / CP 399
Mitchell, ON
NOK 1N0



CONTAINS
ANTIMICROBIAL
USE RESPONSIBLY
CONTIENT UN
ANTIMICROBIEN
UTILISEZ DE FAÇON RESPONSABLE

Rev. BAM Feb 25/22

BAM Feb 25/22

Pail 10 kg, left panel (English version) Super Booster – BAM LP

DESCRIPTION

A water soluble vitamin powder medicated with penicillin G potassium and streptomycin sulfate.

INDICATIONS

Swine and calves:

As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours).

DOSAGE and ADMINISTRATION

To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.

Swine (scours):

Dissolve 400 g of powder in 330 L of drinking water and give orally for 4 or 5 days.

FOR AUTOMATIC PROPORTIONER:

Set the apparatus to distribute 30 mL stock solution per 3.78 L of drinking water (1 oz/gallon U.S.). Prepare the stock solution by dissolving 400 g of powder in 2.6 L of water. This will medicate 330 L of drinking water.

Calves (scours):

Administer 4 g of powder per 45 kg of body weight; mix with water or milk and give orally every 12 hours for 2 or 3 days.

CAUTIONS

These solutions are not stable for more than 24 hours. Prepare fresh solutions daily. Give no other drinking water during the treatment. Provide ample watering places. Proper sanitary measures should prevail. If no improvement is noted after 5 days, the diagnosis should be re-evaluated.

The measuring cup contained herein, when filled with a level quantity, provides approximately 50 g of product.

STORAGE CONDITIONS

Store between 15°C and 25°C. Protect from moisture.

Pail 10 kg, right panel (French version) Super Booster – BAM LP

DESCRIPTION

Une poudre hydrosoluble de vitamines contenant de la pénicilline G potassique et du sulfate de streptomycine.

INDICATIONS

Porcs et veaux :

Pour aider au traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée).

POSOLOGIE et ADMINISTRATION:

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

Porcs (diarrhées) :

Dissoudre 400 g de poudre dans 330 L d'eau de boisson et administrer par voie orale pendant 4 ou 5 jours.

POUR DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE :

Ajuster l'appareil pour qu'il distribue 30 ml de solution concentrée par 3,78 L d'eau de boisson (1 oz/gallon E.-U.). Préparer une solution concentrée en dissolvant 400 g de poudre dans 2,6 L d'eau. Sert à traiter 330 L d'eau de boisson.

Veaux (diarrhées) :

Administrer 4 g de poudre par 45 kg de poids corporel; mélanger dans l'eau ou le lait et donner par voie orale à toutes les 12 heures pendant 2 ou 3 jours.

PRÉCAUTIONS

Ces solutions ne sont plus stables après 24 heures. Préparer des fraîches chaque jour. Ne servir que de l'eau médicamenteuse pendant le traitement. Voir à ce qu'il y ait amplement d'abreuvoirs. Appliquer de bonnes mesures sanitaires. Si des résultats favorables ne sont pas évidents après 5 jours, le diagnostic devrait être réévalué.

Le gobelet à mesurer ci-inclus, lorsque rempli d'une mesure rase, donne approximativement 50 g de produit.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Entreposer entre 15°C et 25°C. Protéger contre l'humidité.

Lot :

Exp. :