

Pouch, front panel (bilingual) Mineralytes Plus

DIN 02122014

Mineralytes Plus

VITAMIN AND ELECTROLYTE WATER SOLUBLE POWDER FOR
CHICKENS, TURKEYS, SWINE, CATTLE, SHEEP AND HORSES

POUDRE HYDROSOLUBLE DE VITAMINES ET D'ELECTROLYTES POUR
POULETS, DINDES, PORCS, BOVINS, MOUTONS ET CHEVAUX

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Net 100 g

Active Ingredients	per/par 100 g	Ingrédients actifs
Vitamin A (Vitamin A acetate)	320 000 I.U./U.I.	Vitamine A (acétate de vitamine A)
Vitamin D ₃ (Cholecalciferol)	250 000 I.U./U.I.	Vitamine D ₃ (cholécalciférol)
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate)	375 I.U./U.I.	Vitamine E (acétate de dl-alpha-tocophérol)
Vitamin B ₁₂	640 mcg	Vitamine B ₁₂
Folic acid	37.5 mg	Acide folique
Menadione (Menadione sodium bisulfite)	125 mg	Ménadione (bisulfite sodique de ménadione)
Calcium d-pantothenate	800 mg	d-pantothénate de calcium
Niacinamide	1 680 mg	Niacinamide
Riboflavin	320 mg	Riboflavine
Choline bitartrate	1 440 mg	Bitartrate de choline
Sodium chloride	69.43 g	Chlorure de sodium
Sodium acetate	8.93 g	Acétate de sodium
Sodium diacetate	1.78 g	Diacétate de sodium
(Total Sodium eq. 30.14 g)		(Éq. total en sodium 30,14 g)
Potassium chloride (Potassium eq. 1.87 g)	3.57 g	Chlorure de potassium (Éq. en potassium 1,87 g)
Magnesium chloride (Magnesium eq. 0.45 g)	1.78 g	Chlorure de magnésium (Éq. en magnésium 0,45 g)
Calcium acetate (Calcium eq. 0.45 g)	1.78 g	Acétate de calcium (Éq. en calcium 0,45 g)

WARNINGS: Keep out of reach of children

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée des enfants



Bio Agri Mix LP
PO Box 399 / CP 399
Mitchell, ON
N0K 1N0

Pouch, back panel (English version) Minralytes Plus

DESCRIPTION:

A water soluble multi-vitamin and electrolyte mixture for chickens, turkeys, swine, cattle, sheep and horses.

INDICATIONS:

Chickens, turkeys, swine, cattle, sheep and horses:

- As an aid in stimulating appetite during periods of stress caused by disease, moving, crowding, vaccination, castration or weather.
- As an aid in preventing vitamin deficiencies when birds or animals are off normal feed.
- As an aid in correcting dehydration and electrolyte imbalance during periods of severe stress, scouring or other enteric diseases that may cause dehydration.
- As an aid in recovering from the stress effects of parasites, such as coccidia or intestinal worms.

DOSAGE (In drinking water):

Chickens, turkeys, swine, cattle, sheep and horses:

Dissolve 100 g (1 pouch) in 187.5 L of drinking water. Treat for 5 days or until feed consumption returns to normal and the effects of dehydration disappear.

For automatic proportioner: Set the apparatus to distribute 30 mL per 4 L of drinking water (1 oz/gallon U.S.). Prepare the stock solution by dissolving 100 g (1 pouch) in 1.4 L of water. This will medicate 187.5 L of drinking water.

For continuous low-level supplementation of a normal diet:

Dissolve 100 g (1 pouch) in 562.5 L of drinking water.

For automatic proportioner: Set the apparatus to distribute 30 mL per 4 L of drinking water (1 oz/gallon U.S.). Prepare the stock solution by dissolving 100 g (1 pouch) in 4.25 L of water. This will medicate 562.5 L of drinking water.

NOTE:

Prepare fresh solutions daily and mix only the amount that will be consumed in a 24-hour period. Use as the only source of drinking water. **1 teaspoonful equals 5 g.**

STORAGE CONDITIONS:

Store between 15°C and 25°C. Tightly close the envelope after each use. Protect from moisture.

LOT:

EXP:

Rev: BAM Feb 02/22

Pouch, back panel (French version) Mineralytes Plus

DESCRIPTION :

Un mélange hydrosoluble d'électrolytes et de vitamines pour poulets, dindes, porcs, bovins, moutons et chevaux.

INDICATIONS :

Poulets, dindes, porcs, bovins, moutons et chevaux :

- Pour aider à stimuler l'appétit durant les périodes de stress causées par la maladie, le déplacement, le surpeuplement, la vaccination, la castration ou la température.
- Pour aider à prévenir les carences vitaminiques quand les oiseaux ou les animaux manquent d'appétit.
- Pour aider à corriger la déshydratation et le déséquilibre électrolytique durant les périodes difficiles de stress, de diarrhée ou de maladies entériques qui causent la déshydratation.
- Pour aider les animaux à se rétablir des effets stressants causés par des parasites tels que les coccidies et les vers intestinaux.

POSOLOGIE (dans l'eau de boisson) :

Poulets, dindes, porcs, bovins, moutons et chevaux :

Dissoudre 100 g (1 sachet) dans 187,5 L d'eau de boisson. Traiter pendant 5 jours ou jusqu'à ce que la consommation alimentaire soit redevenue normale et que les effets de déshydratation soient disparus.

Pour distributeur automatique :

Ajuster l'appareil pour qu'il distribue 30 ml par 4 L d'eau (1 oz/gallon É.-U.). Préparer une solution concentrée en dissolvant 100 g (1 sachet) dans 1,4 L d'eau. Sert à traiter 187,5 L d'eau de boisson.

Comme supplément continu de la diète normale :

Dissoudre 100 g (1 sachet) dans 562,5 L d'eau de boisson.

Pour distributeur automatique :

Ajuster l'appareil pour qu'il distribue 30 ml par 4 L d'eau (1 oz/gallon É.-U.). Préparer une solution concentrée en dissolvant 100 g (1 sachet) dans 4,25 L d'eau. Sert à traiter 562,5 L d'eau de boisson.

REMARQUES :

Préparer des solutions fraîches chaque jour. Ne mélanger que la quantité qui sera consommée dans une période de 24 heures. Employer comme seule source d'eau de boisson. **1 c. à thé équivaut à 5 g.**

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE :

Entposer entre 15°C et 25°C.. Refermer hermétiquement le sachet après chaque usage. Protéger contre l'humidité