

DIN 00308196

**FLAVOURED / AROMATISÉ**

# **PIPERAZINE 34 SOLUTION**

Piperazine Dihydrochloride Solution / Solution de dihydrochlorure de pipérazine

Veterinary use only / Usage vétérinaire seulement

Antiparasitic / Antiparasitaire

FOR WATER USE IN  
SWINE – HORSES – CHICKENS – TURKEYS

À UTILISER DANS L'EAU CHEZ LES  
PORCS – CHEVAUX – POULETS – DINDONS

## **WARNINGS:**

No withdrawal period is required for chickens, chicken eggs, and turkeys when treated according to the label.

Treated swine must not be slaughtered for use in food for at least 7 days after the latest treatment with this drug.

Do not use in horses intended for food.

Keep out of reach of children.

## **MISES EN GARDE :**

Aucune période de retrait n'est nécessaire pour les poulets, les œufs de poule et les dindons lorsqu'utilisé selon les directives de l'étiquette.

Les porcs traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 7 jours après le traitement avec ce médicament.

Ne pas utiliser chez les chevaux destinés à la nourriture.

Garder hors de la portée des enfants.

**Net 250 ML**

Professional Veterinary Laboratories  
1199 Sanford Street  
Winnipeg, Manitoba R3E 3A1

English Side Panel

**INDICATIONS:**

PIPERAZINE 34 SOLUTION is an antiparasitic, to be administered once in water, for the control of large round worms in poultry (chickens and turkeys); large round worms and nodular worms in swine; ascarids and some strongyles in horses.

**ACTIVE INGREDIENT :**

Each 100 mL of PIPERAZINE 34 SOLUTION contains 34 g of piperazine (as piperazine dihydrochloride).

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

- 1) Remove all drinking water the night before treatment.
- 2) Prepare the amount of medicated water required for one day's intake.
- 3) Administer medicated water for one day; then revert to unmedicated water.
- 4) Treatment every 30 days is recommended.
- 5) Observe strict sanitation.

**Chickens:** Under six weeks of age, use 30 mL in sufficient water to treat approximately 200 birds. Over six weeks of age, use 30 mL in sufficient water for every 70 birds.

**Turkeys:** Under six weeks of age use 30 mL in sufficient water for every 150 birds. Over six weeks of age use 30 mL for every 136 kg of body weight.

**Swine:** Use 30 mL for every 68 kg of body weight.

**Horses:** Use 30 mL for every 90 kg of body weight.

**CAUTIONS:**

Do not treat brood sows during the 30 day period before farrowing. Consult a veterinarian before using in severely debilitated animals.

**STORAGE:** Store between 15°C and 30°C. Keep from freezing.

LOT

EXP

**INDICATIONS :**

PIPERAZINE 34 SOLUTION est un antiparasitaire, à administrer une seule fois dans l'eau, pour éliminer les gros vers ronds chez la volaille (poulets et les dindons) ; les gros vers ronds et vers nodulaires chez les porcs; les ascaris et certains strongles chez les chevaux.

**INGRÉDIENT ACTIF :**

Chaque 100 ml de PIPERAZINE 34 SOLUTION contient 34 g de pipérazine (sous forme de dihydrochlorure de pipérazine).

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

- 1) Priver les animaux d'eau la nuit avant le traitement.
- 2) Préparez une quantité d'eau médicamentée en fonction de la quantité totale quotidienne d'eau consommée par les animaux à traiter.
- 3) Administrer l'eau médicamentée pendant une journée ; puis revenez à l'eau non médicamentée.
- 4) Un traitement à tous les 30 jours est recommandé.
- 5) Respectez des conditions sanitaires strictes.

**Poulets :** Pour les poulets âgés de moins de six semaines, ajouter 30 ml dans suffisamment d'eau pour traiter environ 200 oiseaux. Pour les poulets âgés de plus de six semaines, ajouter 30 ml dans suffisamment d'eau pour traiter 70 oiseaux.

**Dindons :** Pour les dindons âgés de moins de six semaines, ajouter 30 ml dans suffisamment d'eau pour 150 dindons. Pour les dindons âgés de plus de six semaines, ajouter 30 ml pour 136 kg de poids corporel.

**Porcs :** Ajouter 30 ml pour chaque 68 kg de poids corporel.

**Chevaux :** Ajouter 30 ml pour chaque 90 kg de poids corporel.

**PRÉCAUTIONS:**

Ne pas traiter les truies reproductrices dans les 30 jours précédant la mise-bas. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser chez des animaux gravement affaiblis.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer entre 15°C et 30°C. Ne pas congeler.