

Meloxicam Injection
20 mg/mL
Bovicam 20

Net: 100 mL

DIN: XXXXXXXX

Pr
Bovicam 20
Meloxicam Injection
20 mg/mL

Veterinary Use Only
Sterile

Warning: Withdrawal periods:
Cattle: Meat: 20 days - Milk: 96 hours
Sheep: Meat: 11 days. **Swine:** 5 days.
Do not use in calves to be processed for veal as a withdrawal period has not been established for pre-ruminating calves.

For complete Warnings, see side panel.

Modern
Veterinary
Therapeutics

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) pour bovins, moutons, et porcs.
Chaque mL contient 20 mg de méloxicam comme actif ingrédient et 150 mg d'éthanol, comme conservateur.
Posologie: Bovins: Injection sous-cutanée ou intraveineuse unique de 0,5 mg de méloxicam/kg de poids vif (soit 2,5 mL pour 100 kg). **Moutons:** Injection sous-cutanée unique administrée 15 à 30 minutes avant une intervention douloureuse Injecter le produit dans la partie haute du cou derrière l'oreille à raison de 1,0 mg de méloxicam/kg de poids corporel (1,0 mL/20 kg). **Porcs:** Injection intramusculaire unique de 0,4 mg de méloxicam/kg de poids corporel (2,0 mL/100 kg). Si nécessaire, une seconde injection de méloxicam peut être administrée après 24 heures.
Un système d'injection multi-dosage devrait être utilisé si plus de 10 perforations sont prévues.
MISES EN GARDE: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires pendant au moins 20 jours pour les bovins, 5 jours pour les porcs et 11 jours pour les moutons après le plus récent traitement avec ce médicament. Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant le traitement et dans un délai de 96 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment. Ne pas administrer aux brebis gravides ou en lactation dans les 11 jours suivant la mise bas lorsque le lait peut être utilisé ou traité à des fins de consommation par les humains. Ne pas administrer aux veaux destinés à la production de viande de veau étant donné qu'un délai d'attente n'a pas été établi pour ces préruminants.
Garder hors de la portée des enfants.
Voir le dépliant pour les mises en garde et l'information complète.
Entreposage: Garder entre 15° - 25°C. Protéger du gel. Jeter 28 jours après la première ouverture.

Rev 05/22

Net: 100 mL

DIN: XXXXXXXX

Pr
Bovicam 20
Meloxicam Injection
20 mg/mL

Usage vétérinaire seulement
Stérile

MISES EN GARDE: Périodes de retrait:
Bovins: Viande: 20 jours - Lait: 96 heures
Moutons: Viande: 11 jours.
Porcins: 5 jours.
Ne pas utiliser aux veaux destinés à la production de viande de veau étant donné qu'un délai d'attente n'a pas été établi pour ces préruminants.

Voir le panneau latéral pour les mises en garde complètes.

Modern
Veterinary
Therapeutics

Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) for cattle, sheep, and swine.
Each mL contains 20 mg meloxicam as active ingredient, and 150 mg ethanol, as preservative.
Dosage: Cattle: Single subcutaneous or intravenous injection of 0.5 mg meloxicam/kg body weight (2.5 mL/100 kg).
Sheep: Single subcutaneous injection administered 15-30 minutes prior to painful procedure. Inject the product high on the neck behind the ear at a dose of 1.0 mg meloxicam/kg body weight (1.0 mL/20 kg).
Swine: Single intramuscular injection at a dosage of 0.4 mg meloxicam/kg body weight (2.0 mL/100 kg). If required, a second administration of meloxicam can be given after 24 hours.
A multi-dosing injection system should be used if more than 10 punctures are anticipated.
Warnings: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 20 days for cattle, 5 days for swine, and 11 days for sheep after the latest treatment with this drug. Milk taken from treated cows during treatment and within 96 hours after the latest treatment with this drug must not be used in food. Do not use in lactating ewes or pregnant ewes within 11 days of lambing where milk may be used or processed for human consumption. Do not use in calves to be processed for veal as a withdrawal period has not been established for pre-ruminating calves.
Keep out of reach of children.
See package for complete information.
Storage: Store between 15° - 25 °C. Keep from freezing. Discard 28 days from first opening.
Manufactured for / Fabriqué pour:
Modern Veterinary Therapeutics, LLC
Miami, FL 33186
Imported by / Importé par:
Modern Veterinary Therapeutics Inc,
261065 Wagon Wheel Way, Bay 3
Balzac (Rocky View County), AB T4A 0T5

Barcode

LOT:

EXP:

Bovicam 20
Meloxicam Injection
20 mg/mL

Pr

Net: 50 mL

DIN: XXXXXXXX

Pr

Bovicam 20 Meloxicam Injection 20 mg/mL

Veterinary Use Only
Sterile

Warning: Withdrawal periods:
Cattle: Meat: 20 days - Milk: 96 hours
Sheep: Meat: 11 days. **Swine:** 5 days.
Do not use in calves to be processed for veal as a withdrawal period has not been established for pre-ruminating calves.

For complete Warnings, see side panel.

**Modern
Veterinary
Therapeutics**

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) pour bovins, moutons, et porcs.

Chaque mL contient 20 mg de méloxicam comme actif ingrédié et 150 mg d'éthanol, comme conservateur.

Posologie: Bovins: Injection sous-cutanée ou intraveineuse unique de 0,5 mg de méloxicam/kg de poids vif (soit 2,5 mL pour 100 kg). **Moutons:** Injection sous-cutanée unique administrée 15 à 30 minutes avant une intervention douloureuse Injecter le produit dans la partie haute du cou derrière l'oreille à raison de 1,0 mg de méloxicam/kg de poids corporel (1,0 mL/20 kg).

Porcs: Injection intramusculaire unique de 0,4 mg de méloxicam/kg de poids corporel (2,0 mL/100 kg). Si nécessaire, une seconde injection de méloxicam peut être administrée après 24 heures.

Un système d'injection multi-dosage devrait être utilisé si plus de 10 perforations sont prévues.

MISES EN GARDE: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires pendant au moins 20 jours pour les bovins, 5 jours pour les porcs et 11 jours pour les moutons après le plus récent traitement avec ce médicament. Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant le traitement et dans un délai de 96 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment. Ne pas administrer aux brebis gravides ou en lactation dans les 11 jours suivant la mise bas lorsque le lait peut être utilisé ou traité à des fins de consommation par les humains. Ne pas administrer aux veaux destinés à la production de viande de veau étant donné qu'un délai d'attente n'a pas été établi pour ces pré-ruminants.

Garder hors de la portée des enfants.
Voir le dépliant pour les mises en garde et l'information complète.

Entreposage: Garder entre 15° - 25°C. Protéger du gel. Jeter 28 jours après la première ouverture.

Rev 05/22

Net: 50 mL

DIN: XXXXXXXX

Pr

Bovicam 20 Meloxicam Injection 20 mg/mL

Usage vétérinaire seulement
Stérile

MISES EN GARDE: Périodes de retrait:
Bovins: Viande: 20 jours - Lait: 96 heures
Moutons: Viande: 11 jours.
Porcins: 5 jours.

Ne pas utiliser aux veaux destinés à la production de viande de veau étant donné qu'un délai d'attente n'a pas été établi pour ces pré-ruminants.

Voir le panneau latéral pour les mises en garde complètes.

**Modern
Veterinary
Therapeutics**

Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) for cattle, sheep, and swine.

Each mL contains 20 mg meloxicam as active ingredient, and 150 mg ethanol, as preservative.

Dosage: Cattle: Single subcutaneous or intravenous injection of 0.5 mg meloxicam/kg body weight (2.5 mL/100 kg). **Sheep:** Single subcutaneous injection administered 15-30 minutes prior to painful procedure. Inject the product high on the neck behind the ear at a dose of 1.0 mg meloxicam/kg body weight (1.0 mL/20 kg).

Swine: Single intramuscular injection at a dosage of 0.4 mg meloxicam/kg body weight (2.0 mL/100 kg). If required, a second administration of meloxicam can be given after 24 hours.

A multi-dosing injection system should be used if more than 10 punctures are anticipated.

Warnings: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 20 days for cattle, 5 days for swine, and 11 days for sheep after the latest treatment with this drug. Milk taken from treated cows during treatment and within 96 hours after the latest treatment with this drug must not be used in food. Do not use in lactating ewes or pregnant ewes within 11 days of lambing where milk may be used or processed for human consumption. Do not use in calves to be processed for veal as a withdrawal period has not been established for pre-ruminating calves.

Keep out of reach of children.

See package for complete information.

Storage: Store between 15° - 25° C. Keep from freezing. Discard 28 days from first opening.

Manufactured for / Fabriqué pour: **Modern Veterinary Therapeutics, LLC, Miami, FL 33186**

Imported by / Importé par: **Modern Veterinary Therapeutics Inc 261065 Wagon Wheel Way, Bay 3 Balzac (Rocky View County), AB T4A 0T5**

Barcode

LOT:

EXP:

Pr

Bovicam 20

Meloxicam Injection

Meloxicam 20 mg/mL


Sterile

Veterinary Use Only

DIN XXXXXXXX

Each mL contains 20 mg meloxicam and 150 mg ethanol, as preservative.

Description: 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide, Empirical formula: $C_{14}H_{13}N_3O_4S_2$.
Molecular weight: 351.40 g/mol. Chemical structure:



Therapeutic Classification: Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).

Indications:

Cattle: As an aid in improving appetite and weight gains when administered at the onset of diarrhea, in combination with oral rehydration therapy, in calves over one week of age. For relief of pain following de-budding of horn buds in calves less than 3 months of age. For the symptomatic treatment of inflammation and pain associated with acute clinical mastitis. For the reduction of pain associated with abdominal surgery such as caesarean section.

Sheep: For single dose use in sheep and lambs 14 days of age or older for the alleviation of pain and inflammation.

Swine: For use in non-infectious locomotor disorders to reduce the symptoms of lameness and inflammation.

Dosage and Administration:

Cattle: Single subcutaneous or intravenous injection of 0.5 mg meloxicam/kg body weight (2.5 mL/100 kg). For reduction in pain associated with abdominal surgery administer 10 to 20 minutes before the painful procedure.

Sheep: Single subcutaneous injection administered 15-30 minutes prior to painful procedure. Inject the product high on the neck behind the ear at a dose of 1.0 mg meloxicam/kg body weight (1.0 mL/20 kg).

Swine: Single intramuscular injection at a dosage of 0.4 mg meloxicam/kg body weight (2.0 mL/100 kg). If required, a second administration of meloxicam can be given after 24 hours.

A multi-dosing injection system should be used if more than 10 punctures are anticipated.

Contraindications:

Do not use in animals suffering from gastrointestinal disorders such as irritation and hemorrhage, impaired hepatic, cardiac or renal function and hemorrhagic disorders or where there is individual hypersensitivity to the product.

Do not administer concurrently with steroidal, other nonsteroidal anti-inflammatory drugs or with anti-coagulant agents.

Concomitant use of NSAIDs with aminoglycoside antimicrobials in very young animals may result in renal toxicity.

Cautions: Do not use in bulls, rams or boars intended for breeding.

Avoid use in very severely dehydrated, hypovolaemic or hypotensive animals which require parenteral rehydration, as there may be a potential risk of increased renal toxicity.

Use of anti-inflammatories in very young or debilitated animals may involve additional risk.

The safety of meloxicam has not been evaluated in lambs less than 14 days of age.

The safety of meloxicam in breeding and pregnant sows has not been fully evaluated.

Available data suggest that meloxicam has no harmful effects in the second and third trimester of pregnancy. However, the potential effects of meloxicam on imminent parturition have not been evaluated. This product can be used in lactating sows.

Treatment of cows with meloxicam before abdominal surgery reduces post-operative pain. An anti-inflammatory alone will not provide adequate pain relief during the surgical procedure. To obtain adequate pain relief during surgery co-medication with an appropriate analgesic is recommended.

Warnings:

- Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 20 days for cattle, 5 days for swine, and 11 days for sheep after the latest treatment with this drug.

- Milk taken from treated cows during treatment and within 96 hours after the latest treatment with this drug must not be used in food.

- Do not use in lactating ewes or pregnant ewes within 11 days of lambing where milk may be used or processed for human consumption.

- Do not use in calves to be processed for veal as a withdrawal period has not been established for pre-ruminating calves.

- People with known hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) should not handle this product.

- Caution should be taken to avoid accidental self-injection, ingestion and contact with eyes.

- This product can cause eye irritation. In case of contact with the eyes, immediately rinse thoroughly with water.

- Keep out of the reach of children.

Adverse Reactions: Transient, slight injection site swellings may occasionally be seen following subcutaneous injection and intravenous injection.

In very rare cases, anaphylactoid reactions may occur and should be treated symptomatically.

Pharmacology: Meloxicam is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxamic class which acts by inhibition of prostaglandin synthesis, thereby exerting anti-inflammatory, analgesic and anti-pyretic properties. Meloxicam also has anti-endotoxic properties because it has been shown to inhibit production of thromboxane B₂ induced by *E. coli* endotoxin administration in calves.

Toxicology: The acute oral toxicity (LD₅₀) of meloxicam assessed in rats, mini-pigs, mice and rabbits was >80 mg/kg, 1600 mg/kg, 470 mg/kg and 320 mg/kg, respectively. Repeated dose toxicity studies in rats, mice and mini-pigs demonstrated that the primary target organs for toxicity were the gastrointestinal tract (pyloric, duodenal and small intestine ulceration) and kidneys (scarring, necrosis and pyelonephritis).

Storage: Store between 15°C to 25°C. Keep from freezing. Discard 28 days from first opening.

Presentation: Bovicam 20 is available in 50 mL and 100 mL multi-dose vials.

Manufactured for:

Modern Veterinary Therapeutics, LLC
Miami, Florida 33186- USA
info@modernveterinarytherapeutics.com
www.modernveterinarytherapeutics.com

Imported by:

Modern Veterinary Therapeutics Inc
261065 Wagon Wheel Way, Bay 3
Balzac (Rocky View County), AB
T4A 0T5

Modern
Veterinary
Therapeutics

Revision Date: 05/22

Pr

Bovicam 20

Méloxicam Injectable

Méloxicam à 20 mg/mL

Stérile


Usage vétérinaire seulement

DIN XXXXXXXX

Chaque mL contient 20 mg de méloxicam et 150 mg d'éthanol comme agent de conservation.

Description : 4-hydroxy-2-méthyl-N-(5-méthyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxyde, formule empirique : $C_{14}H_{13}N_3O_4S_2$.

Masse moléculaire : 351,40 g/mol. Structure chimique :



Classification thérapeutique : Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS).

Indications:

Bovins : Comme auxiliaire, en association avec une fluidothérapie par voie orale, pour augmenter l'appétit et le gain de poids à l'apparition de diarrhée chez les veaux âgés de plus d'une semaine.

Pour le soulagement de la douleur suivant l'ablation des bourgeons de corne chez les veaux âgés de moins de 3 mois.

Pour le traitement symptomatique de l'inflammation et de la douleur associées à la mammite clinique aiguë. Pour la réduction de la douleur associée à une chirurgie abdominale, telle que césarienne.

Moutons : Pour le soulagement de la douleur et de l'inflammation chez les moutons et les agneaux âgés de 14 jours ou plus sous forme d'une dose unique.

Porcs : Pour le traitement symptomatique des troubles locomoteurs non infectieux afin de réduire la boiterie et l'inflammation.

Posologie et administration :

Bovins : Injection sous-cutanée ou intraveineuse unique de 0,5 mg de méloxicam/kg de poids corporel (2,5 mL/100 kg). Pour la réduction de la douleur associée à une chirurgie abdominale, administrer 10 à 20 minutes avant la procédure douloureuse.

Moutons : Injection sous-cutanée unique administrée 15 à 30 minutes avant une intervention douloureuse. Injecter le produit dans la partie haute du cou derrière l'oreille à raison de 1,0 mg de méloxicam/kg de poids corporel (1,0 mL/20 kg).

Porcs : Injection intramusculaire unique de 0,4 mg de méloxicam/kg de poids corporel (2,0 mL/100 kg). Si nécessaire, une seconde injection de méloxicam peut être administrée après 24 heures.

Un système d'injection multi-dosage devrait être utilisé si plus de 10 perforations sont prévues.

Contre-indications :

Ne pas administrer aux animaux souffrant de troubles gastro-intestinaux, tels que l'irritation et l'hémorragie, d'insuffisance hépatique, cardiaque ou rénale, de troubles hémorragiques ou en cas d'hypersensibilité au produit.

Ne pas administrer en association avec des médicaments stéroïdiens, d'autres agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des anticoagulants.

L'administration concomitante d'AINS et d'antimicrobiens aminosides chez des animaux très jeunes peut entraîner une toxicité rénale.

Précautions : Ne pas administrer aux taureaux, boucs ou verrats reproducteurs.

Il ne faut pas administrer ce produit aux animaux très déshydratés, hypovolémiques ou hypotendus qui nécessitent une réhydratation parentérale en raison du risque plus élevé de toxicité rénale.

L'administration d'anti-inflammatoires à des animaux très jeunes ou affaiblis peut comporter d'autres risques.

L'innocuité du méloxicam chez les agneaux âgés de moins de 14 jours n'a pas été évaluée. L'innocuité du méloxicam chez les truies reproductrices ou gestantes n'a pas été entièrement évaluée. Les données disponibles suggèrent que le méloxicam n'a pas d'effets nuisibles au cours des deuxième et troisième trimestres de gestation.

Toutefois, les effets possibles du méloxicam sur la parturition imminente n'ont pas été étudiés. Ce produit peut être utilisé chez les truies allaitantes.

Le traitement des vaches avec du méloxicam avant une chirurgie abdominale réduit la douleur postopératoire. Un anti-inflammatoire seul ne procurera pas une analgésie adéquate pendant la chirurgie. Afin d'obtenir une analgésie adéquate pendant la chirurgie, l'utilisation simultanée d'un agent analgésique approprié est recommandée.

Mises en garde :

- Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires pendant au moins 20 jours pour les bovins, 5 jours pour les porcs et 11 jours pour les moutons après le plus récent traitement avec ce médicament.

- Le lait provenant des vaches traitées qui est extrait pendant le traitement et dans les 96 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment.

- Ne pas administrer aux brebis gravides ou en lactation dans les 11 jours suivant la mise bas lorsque le lait peut être utilisé ou traité à des fins de consommation par les humains.

- Ne pas administrer aux veaux destinés à la production de viande de veau étant donné qu'un délai d'attente n'a pas été établi pour ces préruminants.

- Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ne doivent pas manipuler ce produit.

- La prudence est de mise afin d'éviter l'auto-injection accidentelle, l'ingestion et le contact avec les yeux.

- Ce produit peut provoquer une irritation des yeux. En cas de contact avec les yeux, bien rincer immédiatement les yeux avec de l'eau.

- Garder hors de la portée des enfants.

Réactions indésirables : Un œdème léger et transitoire peut survenir à la suite d'une injection sous-cutanée ou intraveineuse. De très rares cas de réactions anaphylactoides peuvent survenir et les symptômes devraient être traités.

Pharmacologie : Le méloxicam est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) du groupe oxicam qui inhibe la synthèse des prostaglandines et possède des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et antipyrétiques. Le méloxicam possède également des propriétés antiendotoxiques.

Il a été démontré que le méloxicam inhibe la production de la thromboxane B2 provoquée par l'administration de l'endotoxine E. coli chez les veaux.

Toxicité : La toxicité orale aiguë (DL50) du méloxicam évaluée chez des rats, des pourceaux miniatures, des souris et des lapins était supérieure à 80 mg/kg, 1 600 mg/kg, 470 mg/kg et 320 mg/kg, respectivement. Des études sur l'administration de doses répétées et la

toxicité menées auprès de rats, de souris et de pourceaux miniatures ont démontré que les organes cibles primaires pour la toxicité étaient les voies gastro-intestinales (ulcération pylorique, duodénale et intestinale) et les reins (lésion cicatricielle, nécrose épyélonéphrite).

Entreposage : Conserver entre 15°C et 25°C. Protégez-vous du gel. Jeter 28 jours après la première ouverture.

Présentation : Bovicam 20 est disponible en flacons multidoses de 50 mL et 100 mL.

Fabriqué pour :


Modern Veterinary Therapeutics, LLC
Miami, Florida 33186- USA
info@modernveterinarytherapeutics.com
www.modernveterinarytherapeutics.com

Importé par :


Modern Veterinary Therapeutics Inc
261065 Wagon Wheel Way, Bay 3
Balzac (Rocky View County), AB
T4A 0T5

**Modern
Veterinary
Therapeutics**

Date de révision: 05/22




datum-tijd date-heure	02-May-16 - 11:27:42
onze ref. notre ref.	190170100
contactpersoon resp. à contacter	Katleen
emailadres adresse email	kfs@reynders.com
klannr. n° du client	P08973
klant client	PRODULAB PHARMA
LABELS AND PACKAGING	
Tax à l'act. de	
net. tell.	
faxnr. fax	
uur oeffent. vertr. n° du client omschrijving description	E-MAIL 07/03/2016
template met ruimte voor datamatrix	
aantal etiketten nombre d'étiq. dragen/etiket étiquette de base	MC Primecoat FSC C2075N BG40Br NI
leveringsadres adr. de livraison	PRODULAB PHARMA FORELLENWEG 16 NL 4941 SJ RAAMSDONKSVEER
formaat (mm) format (mm)	48,00 X 137,00
hoogte-hauteur	48,00
breedte-largeur	137,00
rolbreedte largeur du rouleau	51 mm
mandin kern	45 mm
Ø rol Ø rouleau	250 mm
etiketten per rol étiq. sur rouleau	2306
tussenafstand etiket espace inter-étiquette	2.70 mm
speciaal spéciale	
lichaemr. n° du client	19017010001.pdf
Operator	kfs
kleuren couleurs	1 <input checked="" type="checkbox"/> K
2 <input checked="" type="checkbox"/> Stans-Decoupe-Diecut	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
verniss verniss	Ja <input checked="" type="checkbox"/> X oui neen <input type="checkbox"/>
pos. op rol pos. sur rouleau	S7



**AKKOORD VOOR DRUK EN UITVOERING
ACCORD POUR IMPRESSION ET EXECUTION**

Gelieve bovenstaande gegevens goed te controleren en ontbrekende informatie te vervolledigen.
Nous vous prions de bien contrôler l'information ci-dessus et de la compléter si nécessaire.
handtekening + datum
signature + date

1.8.1 Box Label 50 mL



1.8.2 Box Label 100 mL

<p>Net: 100 mL DIN XXXXXXXX</p> <p>Pr Bovicam 20 Meloxicam Injection 20 mg/mL</p> <p>Veterinary use only Sterile Warning: Withdrawal periods: Cattle: Meat: 20 days - Milk: 96 hours Sheep: Meat: 11 days. Swine: 5 days. Do not use in calves to be processed for veal as a withdrawal period has not been established for pre-ruminating calves.</p> <p>For complete Warnings, see side panel.</p> <p>Modern Veterinary Therapeutics</p>	<p>Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) pour bovins, moutons, et porcs. Chaque mL contient 20 mg de méloxicam comme actif ingédient et 150 mg d'éthanol, comme conservateur. Posologie : Bovins: Injection sous-cutanée ou intraveineuse unique de 0,5 mg de méloxicam/kg de poids vif (soit 2,5 mL pour 100 kg). Moutons: Injection sous-cutanée unique administrée 15 à 30 minutes avant une intervention douloureuse Injecter le produit dans la partie haute du cou derrière l'oreille à raison de 1,0 mg de méloxicam/kg de poids corporel (1,0 mL/20 kg). Porcs: Injection intramusculaire unique de 0,4 mg de méloxicam/kg de poids corporel (2,0 mL/100 kg). Si nécessaire, une seconde injection de méloxicam peut être administrée après 24 heures. Un système d'injection multi-dosage devrait être utilisé si plus de 10 perforations sont prévues MISES EN GARDE: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires pendant au moins 20 jours pour les bovins, 5 jours pour les porcs et 11 jours pour les moutons après le plus récent traitement avec ce médicament. Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant le traitement et dans un délai de 96 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment. Ne pas administrer aux brebis gravides ou en lactation dans les 11 jours suivant la mise bas lorsque le lait peut être utilisé ou traité à des fins de consommation par les humains Ne pas administrer aux veaux destinés à la production de viande de veau étant donné qu'un délai d'attente n'a pas été établi pour ces préruminants. Garder hors de la portée des enfants. Voir le dépliant pour les mises en garde et l'information complète Un système d'injection multi-dosage devrait être utilisé si plus de 10 perforations sont prévues. Entreposage: Garder entre 15° - 25°C. Protéger du gel. Jeter 28 jours après la première ouverture.</p>	<p>Net: 100 mL DIN XXXXXXXX</p> <p>Pr Bovicam 20 Méloxicam Injectable 20 mg/mL</p> <p>Usage vétérinaire seulement Stérile</p> <p>MISES EN GARDE: Périodes de retrait: Bovins: Viande: 20 jours - Lait: 96 heures Moutons: Viande: 11 jours. Porcins: 5 jours. Ne pas utiliser aux veaux destinés à la production de viande de veau étant donné qu'un délai d'attente n'a pas été établi pour ces préruminants.</p> <p>Voir le panneau latéral pour les mises en garde complètes.</p> <p>Modern Veterinary Therapeutics</p>	<p>Méloxicam Injectable 20 mg/mL</p> <p>Bovicam 20</p> <p>Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) for cattle, sheep, and swine. Each mL contains 20 mg meloxicam as active ingredient, and 150 mg ethanol, as preservative. Dosage: Cattle: Single subcutaneous or intravenous injection of 0.5 mg meloxicam/kg body weight (2.5 mL/100 kg). Sheep: Single subcutaneous injection administered 15-30 minutes prior to painful procedure. Inject the product high on the neck behind the ear at a dose of 1.0 mg meloxicam/kg body weight (1.0 mL/20 kg). Swine: Single intramuscular injection at a dosage of 0.4 mg meloxicam/kg body weight (2.0 mL/100 kg). If required, a second administration of meloxicam can be given after 24 hours. A multi-dosing injection system should be used if more than 10 punctures are anticipated. Warnings: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 20 days for cattle, 5 days for swine, and 11 days for sheep after the latest treatment with this drug. Milk taken from treated cows during treatment and within 96 hours after the latest treatment with this drug must not be used in food. Do not use in lactating ewes or pregnant ewes within 11 days of lambing where milk may be used or processed for human consumption. Do not use in calves to be processed for veal as a withdrawal period has not been established for pre-ruminating calves. Keep out of reach of children. See package for complete information. A multi-dosing injection system should be used if more than 10 punctures are anticipated. Storage: Store between 15° - 25 °C. Keep from freezing. Discard 28 days from first opening.</p> <p>Manufactured for / Fabriqué pour: Modern Veterinary Therapeutics, LLC Miami, FL 33186 Imported by / Importé par: Modern Veterinary Therapeutics Inc 261065 Wagon Wheel Way, Bay 3 Balzac (Rocky View County), AB T4A 0T5</p>
<p>05/22</p> <p>LOT: EXP:</p>			

1.8.3 Vial Label 50 mL

NSAID for cattle, sheep, and swine	NET: 50 mL	DIN XXXXXXXX	AINS pour bovins, moutons, et porcs. Bovins: Injection s.c. ou i.v. unique. Moutons: Injection s.c unique. Porcs: Injection i.m. unique.
Cattle – Single SC or IV injection Sheep – Single SC injection Swine – Single IM injection	Pr Bovicam 20	Meloxicam Injection Méloxicom Injectable 20 mg/mL	Mises en garde: Périodes de retrait: Bovins: Viande: 20 jours - Lait: 96 heures Moutons: Viande: 11 jours Porcs: 5 jours. Ne pas administrer aux veaux destinés à la production de viande de veau. Garder hors de la portée des enfants.
Warning: Withdrawal periods: Cattle: Meat: 20 days - Milk: 96 hours. Sheep: Meat: 11 days Swine: 5 days. Do not use in calves to be processed for veal. Keep out of reach of children. See package insert for complete warnings and information.	Veterinary use only Usage vétérinaire seulement	For Cattle, Sheep, and Swine Pour bovins, moutons, et porcs Sterile/Stérile Lot : Exp:	Voir le dépliant pour les mises en garde et l'information complète. Entreposage: Garder entre 15° - 25°C. Protéger du gel. Jeter 28 jours après la première ouverture.
Storage: Store between 15° - 25° C. Keep from freezing. Discard 28 days from first opening.			Imported by / importé par: Modern Veterinary Therapeutics Inc 261065 Wagon Wheel Way, Bay 3 Balzac (Rocky View County), AB T4A 0T5
Manufactured for / Fabriqué pour: Modern Veterinary Therapeutics, LLC Miami, FL 33186 USA / États-Unis Rev 04/22			

1.8.4 Vial Label 100 mL

NSAID for cattle, sheep, and swine	NET: 100 mL	DIN XXXXXXXX	AINS pour bovins, moutons, et porcs. Bovins: Injection s.c. ou i.v. unique. Moutons: Injection s.c unique. Porcs: Injection i.m. unique. Mises en garde: Périodes de retrait: Bovins: Viande: 20 jours - Lait: 96 heures Moutons: Viande: 11 jours Porcs: 5 jours. Ne pas administrer aux veaux destinés à la production de viande de veau. Garder hors de la portée des enfants.
Cattle – Single SC or IV injection Sheep – Single SC injection Swine – Single IM injection	Pr Bovicam 20		
Warning: Withdrawal periods: Cattle: Meat: 20 days - Milk: 96 hours. Sheep: Meat: 11 days Swine: 5 days. Do not use in calves to be processed for veal. Keep out of reach of children. See package insert for complete warnings and information.	Meloxicam Injection Méloxicam Injectable 20 mg/mL	Veterinary use only Usage vétérinaire seulement	Voir le dépliant pour les mises en garde et l'information complète.
Storage: Store between 15° - 25° C. Keep from freezing. Discard 28 days from first opening.	For Cattle, Sheep, and Swine Pour bovins, moutons, et porcs Sterile/Stérile Lot : Exp:		Entreposage: Garder entre 15° - 25°C. Protéger du gel. Jeter 28 jours après la première ouverture.
Manufactured for / Fabriqué pour: Modern Veterinary Therapeutics, LLC Miami, FL 33186 USA / États-Unis			Imported by / importé par: Modern Veterinary Therapeutics Inc 261065 Wagon Wheel Way, Bay 3 Balzac (Rocky View County), AB T 4 0 T 0



Bovicam 20

Meloxicam Injection

Meloxicam 20 mg/mL


Sterile

Veterinary Use Only

DIN XXXXXXXX

Each mL contains 20 mg meloxicam and 150 mg ethanol, as preservative.

Description: 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine -3- carboxamide-1,1-dioxide, Empirical formula: C₁₄H₁₃N₃O₄S₂. Molecular weight: 351.40 g/mol. Chemical structure:



Therapeutic Classification: Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).

Indications:

Cattle: As an aid in improving appetite and weight gains when administered at the onset of diarrhea, in combination with oral rehydration therapy, in calves over one week of age. For relief of pain following de-budding of horn buds in calves less than 3 months of age. For the symptomatic treatment of inflammation and pain associated with acute clinical mastitis. For the reduction of pain associated with abdominal surgery such as caesarean section.

Sheep: For single dose use in sheep and lambs 14 days of age or older for the alleviation of pain and inflammation.

Swine: For use in non-infectious locomotor disorders to reduce the symptoms of lameness and inflammation.

Dosage and Administration:

Cattle: Single subcutaneous or intravenous injection of 0.5 mg meloxicam/kg body weight (2.5 mL/100 kg). For reduction in pain associated with abdominal surgery administer 10 to 20 minutes before the painful procedure.

Sheep: Single subcutaneous injection administered 15-30 minutes prior to painful procedure. Inject the product high on the neck behind the ear at a dose of 1.0 mg meloxicam/kg body weight (1.0 mL/20 kg).

Swine: Single intramuscular injection at a dosage of 0.4 mg meloxicam/kg body weight (2.0 mL/100 kg). If required, a second administration of meloxicam can be given after 24 hours.

A multi-dosing injection system should be used if more than 10 punctures are anticipated.

Contraindications:

Do not use in animals suffering from gastrointestinal disorders such as irritation and hemorrhage, impaired hepatic, cardiac or renal function and hemorrhagic disorders or where there is individual hypersensitivity to the product.

Do not administer concurrently with steroidal, other nonsteroidal anti-inflammatory drugs or with anti-coagulant agents.

Concomitant use of NSAIDs with aminoglycoside antimicrobials in very young animals may result in renal toxicity.

Cautions: Do not use in bulls, rams or boars intended for breeding.

Avoid use in very severely dehydrated, hypovolaemic or hypotensive animals which require parenteral rehydration, as there may be a potential risk of increased renal toxicity.

Use of anti-inflammatories in very young or debilitated animals may involve additional risk.

The safety of meloxicam has not been evaluated in lambs less than 14 days of age.

The safety of meloxicam in breeding and pregnant sows has not been fully evaluated.

Available data suggest that meloxicam has no harmful effects in the second and third trimester of pregnancy. However, the potential effects of meloxicam on imminent parturition have not been evaluated. This product can be used in lactating sows.

Treatment of cows with meloxicam before abdominal surgery reduces post-operative pain. An anti-inflammatory alone will not provide adequate pain relief during the surgical procedure. To obtain adequate pain relief during surgery co-medication with an appropriate analgesic is recommended.

Warnings:

- Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 20 days for cattle, 5 days for swine, and 11 days for sheep after the latest treatment with this drug.

- Milk taken from treated cows during treatment and within 96 hours after the latest treatment with this drug must not be used in food.
- Do not use in lactating ewes or pregnant ewes within 11 days of lambing where milk may be used or processed for human consumption.
- Do not use in calves to be processed for veal as a withdrawal period has not been established for pre-ruminating calves.
- People with known hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) should not handle this product.
- Caution should be taken to avoid accidental self-injection, ingestion and contact with eyes.
- This product can cause eye irritation. In case of contact with the eyes, immediately rinse thoroughly with water.
- Keep out of the reach of children.

Adverse Reactions: Transient, slight injection site swellings may occasionally be seen following subcutaneous injection and intravenous injection.

In very rare cases, anaphylactoid reactions may occur and should be treated symptomatically.

Pharmacology: Meloxicam is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam class which acts by inhibition of prostaglandin synthesis, thereby exerting anti-inflammatory, analgesic and anti-pyretic properties. Meloxicam also has anti-endotoxic properties because it has been shown to inhibit production of thromboxane B2 induced by *E. coli* endotoxin administration in calves.

Toxicology: The acute oral toxicity (LD₅₀) of meloxicam assessed in rats, mini-pigs, mice and rabbits was >80 mg/kg, 1600 mg/kg, 470 mg/kg and 320 mg/kg, respectively. Repeated dose toxicity studies in rats, mice and mini-pigs demonstrated that the primary target organs for toxicity were the gastrointestinal tract (pyloric, duodenal and small intestine ulceration) and kidneys (scarring, necrosis and pyelonephritis).

Storage: Store between 15°C to 25°C. Keep from freezing. Discard 28 days from first opening.

Presentation: Bovicom 20 is available in 50 mL and 100 mL multi-dose vials.

Manufactured for:

Modern Veterinary Therapeutics, LLC
Miami, Florida 33186- USA
info@modernveterinarytherapeutics.com
www.modernveterinarytherapeutics.com

Imported by:

Modern Veterinary Therapeutics Inc
261065 Wagon Wheel Way, Bay 3
Balzac (Rocky View County), AB
T4A 0T5

Revision Date: 05/22



This page was intentionally left blank



Bovicam 20

Méloxicam Injectable

Méloxicam à 20 mg/mL


Stérile

Usage vétérinaire seulement

DIN XXXXXXXX

Chaque mL contient 20 mg de méloxicam et 150 mg d'éthanol comme agent de conservation.

Description : 4-hydroxy-2-méthyl-N-(5-méthyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine -3- carboxamide-1,1-dioxyde, formule empirique : C₁₄H₁₃N₃O₄S₂. Masse moléculaire : 351,40 g/mol. Structure chimique :



Classification thérapeutique : Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS).

Indications:

Bovins : Comme auxiliaire, en association avec une fluidothérapie par voie orale, pour augmenter l'appétit et le gain de poids à

l'apparition de diarrhée chez les veaux âgés de plus d'une semaine.

Pour le soulagement de la douleur suivant l'ablation des bourgeons de corne chez les veaux âgés de moins de 3 mois.

Pour le traitement symptomatique de l'inflammation et de la douleur associées à la mammite clinique aiguë. Pour la réduction de la douleur associée à une chirurgie abdominale, telle une césarienne.

Moutons : Pour le soulagement de la douleur et de l'inflammation chez les moutons et les agneaux âgés de 14 jours ou plus sous forme d'une dose unique.

Porcs : Pour le traitement symptomatique des troubles locomoteurs non infectieux afin de réduire la boiterie et l'inflammation.

Posologie et administration :

Bovins : Injection sous-cutanée ou intraveineuse unique de 0,5 mg de méloxicam/kg de poids corporel (2,5 mL/100 kg). Pour la réduction de la douleur associée à une chirurgie abdominale, administrer 10 à 20 minutes avant la procédure douloureuse.

Moutons : Injection sous-cutanée unique administrée 15 à 30 minutes avant une intervention douloureuse. Injecter le produit dans la partie haute du cou derrière l'oreille à raison de 1,0 mg de méloxicam/kg de poids corporel (1,0 mL/20 kg).

Porcs : Injection intramusculaire unique de 0,4 mg de méloxicam/kg de poids corporel (2,0 mL/100 kg). Si nécessaire, une seconde injection de méloxicam peut être administrée après 24 heures.

Un système d'injection multi-dosage devrait être utilisé si plus de 10 perforations sont prévues.

Contre-indications :

Ne pas administrer aux animaux souffrant de troubles gastro-intestinaux, tels que l'irritation et l'hémorragie, d'insuffisance hépatique, cardiaque ou rénale, de troubles hémorragiques ou en cas d'hypersensibilité au produit.

Ne pas administrer en association avec des médicaments stéroïdiens, d'autres agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des anticoagulants.

L'administration concomitante d'AINS et d'antimicrobiens aminosides chez des animaux très jeunes peut entraîner une toxicité rénale.

Précautions : Ne pas administrer aux taureaux, boucs ou verrats reproducteurs.

Il ne faut pas administrer ce produit aux animaux très déshydratés, hypovolémiques ou hypotendus qui nécessitent une réhydratation parentérale en raison du risque plus élevé de toxicité rénale.

L'administration d'anti-inflammatoires à des animaux très jeunes ou affaiblis peut comporter d'autres risques.

L'innocuité du méloxicam chez les agneaux âgés de moins de 14 jours n'a pas été évaluée. L'innocuité du méloxicam chez les truies reproductrices ou gestantes n'a pas été entièrement évaluée. Les données disponibles suggèrent que le méloxicam n'a pas d'effets nuisibles au cours des deuxième et troisième trimestres de gestation. Toutefois, les effets possibles du méloxicam sur la parturition imminente n'ont pas été étudiés. Ce produit peut être utilisé chez les truies allaitantes.

Le traitement des vaches avec du méloxicam avant une chirurgie abdominale réduit la douleur postopératoire. Un anti-inflammatoire seul ne procurera pas une analgésie adéquate pendant la chirurgie. Afin d'obtenir une analgésie adéquate pendant la chirurgie, l'utilisation simultanée d'un agent analgésique approprié est recommandée.

Mises en garde :

- Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires pendant au moins 20 jours pour les bovins, 5 jours pour les porcs et 11 jours pour les moutons après le plus récent traitement avec ce médicament.
- Le lait provenant des vaches traitées qui est extrait pendant le traitement et dans les 96 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment.
- Ne pas administrer aux brebis gravides ou en lactation dans les 11 jours suivant la mise bas lorsque le lait peut être utilisé ou traité à des fins de consommation par les humains.
- Ne pas administrer aux veaux destinés à la production de viande de veau étant donné qu'un délai d'attente n'a pas été établi pour ces préruminants.
- Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ne doivent pas manipuler ce produit.
- La prudence est de mise afin d'éviter l'auto-injection accidentelle, l'ingestion et le contact avec les yeux.
- Ce produit peut provoquer une irritation des yeux. En cas de contact avec les yeux, bien rincer immédiatement les yeux avec de l'eau.
- Garder hors de la portée des enfants.

Réactions indésirables : Un oedème léger et transitoire peut survenir à la suite d'une injection sous-cutanée ou intraveineuse. De très rares cas de réactions anaphylactoïdes peuvent survenir et les symptômes devraient être traités.

Pharmacologie : Le méloxicam est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) du groupe oxicam qui inhibe la synthèse des prostaglandines et possède des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et antipyrétiques. Le méloxicam possède également des propriétés antiendotoxiques.

Il a été démontré que le méloxicam inhibe la production de la thromboxane B2 provoquée par l'administration de l'endotoxine E. coli chez les veaux.

Toxicité : La toxicité orale aiguë (DL50) du méloxicam évaluée chez des rats, des pourceaux miniatures, des souris et des lapins était supérieure à 80 mg/kg, 1 600 mg/kg, 470 mg/kg et 320 mg/kg, respectivement. Des études sur l'administration de doses répétées et la toxicité menées auprès de rats, de souris et de pourceaux miniatures ont démontré que les organes cibles primaires pour la toxicité étaient les voies gastro-intestinales (ulcération pylorique, duodénale et intestinale) et les reins (lésion cicatricielle, nécrose et pyélonéphrite).

Entreposage: Conserver entre 15°C et 25°C. Protégez-vous du gel. Jeter 28 jours après la première ouverture.

Présentation : Bovicam 20 est disponible en flacons multidoses de 50 mL et 100 mL.

Fabriqué pour:

Modern Veterinary Therapeutics, LLC
Miami, Florida 33186- USA
info@modernveterinarytherapeutics.com
www.modernveterinarytherapeutics.com

Importé par:

Modern Veterinary Therapeutics Inc
261065 Wagon Wheel Way, Bay 3
Balzac (Rocky View County), AB
T4A 0T5

Revision Date: 05/22

