

Mock-up Label

Net Contents/Contenu Net: XX L = 3.8 L, 4 x 3.8L, 18.9L, 56.8 L, 208 L, 1040 L

DIN 02522411

For veterinary use only / Pour usage vétérinaire seulement

GLADIATOR

LACTIC ACID TEAT SOLUTION

SOLUTION POUR TRAYONS À BASE D'ACIDE LACTIQUE

GLADIATOR ACTIVATOR for use only with GLADIATOR BASE

GLADIATOR ACTIVATOR à utiliser seulement avec GLADIATOR BASE

Pre- and Post-Milking Antiseptic Teat Solution

Solution antiseptique pour trayons à utiliser avant et après la traite

INDICATIONS: GLADIATOR is a pre- and post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

ACTIVE INGREDIENTS: Lactic Acid 2.64% w/w

EMOLLIENTS: Glycerin 10% w/w

DIRECTIONS FOR USE:

Measure equal volumes of GLADIATOR ACTIVATOR and GLADIATOR BASE into a clean container and mix until the colour is uniform throughout. Do not dilute. Mix only enough product for one milking of the herd. Always use freshly mixed, full-strength GLADIATOR.

PRE-MILKING: Use at full strength. Do not dilute. Before milking, apply GLADIATOR to each teat, ensuring complete coverage of all teats with the solution. After 15 to 30 seconds, dry each teat thoroughly. If the udder and teats are heavily soiled, clean with an antiseptic udder wash and dry thoroughly before application of GLADIATOR.

POST MILKING: Use at full strength. Do not dilute. Apply GLADIATOR to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0°C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. When a cow is being dried off, continue the application of GLADIATOR to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of GLADIATOR to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving. A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

WARNINGS: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

PRECAUTIONS: For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

STORAGE CONDITIONS: Store between 2°C and 30°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

Mock-up Label

Distributed by/Distribué par: Agrisan Specialty Chemical & Pharmaceutical (A Division of Agrisan Inc), 451 Smith Street P.O. Box 69, Arthur, Ontario, N0G 1A0 **1-877-731-7194**

Manufactured by/Fabriqué par: Boumatic LLC, P.O. Box 8050, 1919 S. Stoughton Road, Madison, WI 53716 USA

INDICATIONS: GLADIATOR est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons avant et après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches laitières.

INGRÉDIENTS ACTIFS: Acide Lactique 2,64% p/p

ÉMOLLIENTS : Glycérine 10% p/p

MODE D'EMPLOI:

Mesurer des quantités égales de GLADIATOR ACTIVATOR et GLADIATOR BASE dans un contenant propre et mélanger jusqu'à la couleur soit uniforme. Ne pas diluer. Mélanger seulement la quantité nécessaire pour un traitement de tous les animaux. Toujours utiliser une solution de GLADIATOR fraîchement mélangée et non diluée.

AVANT LA TRAITE : Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer GLADIATOR sur chaque trayon de manière que la solution couvre toute la surface des trayons. Laisser agir de 15 à 30 secondes, puis bien sécher les trayons. Si le pis et les trayons sont très sales, les nettoyer avec une solution antiseptique de lavage de pis, puis bien les sécher avant d'appliquer GLADIATOR.

APRÈS LA TRAITE : Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer GLADIATOR sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0°C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel. Quand une vache est tarie, continuer l'application de GLADIATOR sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de GLADIATOR sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage. Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rincé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.

MISES EN GARDE: Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS: Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE : Conserver entre 2 ° C et 30 ° C. Éviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la détérioration. Garder le contenant bien fermé.

LOT : XXXXXX

EXP : XX/XX

Mock-up Label

Net Contents/Contenu Net: XX L = 3.8 L, 4 x 3.8L, 18.9L, 56.8 L, 208 L, 1040 L

DIN 02522411

For veterinary use only / Pour usage vétérinaire seulement

GLADIATOR

SODIUM CHLORITE TEAT SOLUTION

SOLUTION POUR TRAYONS À BASE D'CHORITE DE SODIUM

GLADIATOR BASE for use only with GLADIATOR ACTIVATOR

GLADIATOR BASE à utiliser seulement avec GLADIATOR ACTIVATOR

Pre- and Post-Milking Antiseptic Teat Solution

Solution antiseptique pour trayons à utiliser avant et après la traite

INDICATIONS: GLADIATOR is a pre- and post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

ACTIVE INGREDIENTS: Sodium Chlorite 0.64% w/w

DIRECTIONS FOR USE:

Measure equal volumes of GLADIATOR ACTIVATOR and GLADIATOR BASE into a clean container and mix until the colour is uniform throughout. Do not dilute. Mix only enough product for one milking of the herd. Always use freshly mixed, full-strength GLADIATOR.

PRE-MILKING: Use at full strength. Do not dilute. Before milking, apply GLADIATOR to each teat, ensuring complete coverage of all teats with the solution. After 15 to 30 seconds, dry each teat thoroughly. If the udder and teats are heavily soiled, clean with an antiseptic udder wash and dry thoroughly before application of GLADIATOR.

POST MILKING: Use at full strength. Do not dilute. Apply GLADIATOR to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0°C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. When a cow is being dried off, continue the application of GLADIATOR to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of GLADIATOR to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving. A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

WARNINGS: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

PRECAUTIONS: For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

STORAGE CONDITIONS: Store between 2°C and 30°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

Distributed by/Distribué par: Agrisan Specialty Chemical & Pharmaceutical (A Division of Agrisan Inc), 451 Smith Street P.O. Box 69, Arthur, Ontario, N0G 1A0 1-877-731-7194

Mock-up Label

**Manufactured by/Fabriqué par: Boumatic LLC, P.O. Box 8050, 1919 S. Stoughton Road,
Madison, WI 53716 USA**

INDICATIONS: GLADIATOR est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons avant et après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches laitières.

INGRÉDIENTS ACTIFS: Chlorite de Sodium 0,64% p/p

MODE D'EMPLOI:

Mesurer des quantités égales de GLADIATOR ACTIVATOR et GLADIATOR BASE dans un contenant propre et mélanger jusqu'à la couleur soit uniforme. Ne pas diluer. Mélanger seulement la quantité nécessaire pour un traitement de tous les animaux. Toujours utiliser une solution de GLADIATOR fraîchement mélangée et non diluée.

AVANT LA TRAITE : Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer GLADIATOR sur chaque trayon de manière que la solution couvre toute la surface des trayons. Laisser agir de 15 à 30 secondes, puis bien sécher les trayons. Si le pis et les trayons sont très sales, les nettoyer avec une solution antiseptique de lavage de pis, puis bien les sécher avant d'appliquer GLADIATOR.

APRÈS LA TRAITE : Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer GLADIATOR sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0°C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel. Quand une vache est tarie, continuer l'application de GLADIATOR sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de GLADIATOR sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage. Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rincé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.

MISES EN GARDE: Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS: Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE : Conserver entre 2 ° C et 30 ° C. Éviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la détérioration. Garder le contenant bien fermé.

LOT : XXXXXX

EXP : XX/XX

For Veterinary Use Only Pour Usage Vétérinaire Seulement

Gladiator Activator Lactic Acid Teat Solution Pour Trays à base d'acide lactique

**GLADIATOR ACTIVATOR for use only with GLADIATOR BASE
GLADIATOR à utiliser seulement avec GLADIATOR BASE**

DIN 025222411

PRE- AND POST-MILKING ANTISEPTIC TEAT SOLUTION

INDICATIONS: GLADIATOR is a pre- and post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

WARNINGS: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after teat exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapors. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

PRECAUTIONS: For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

SOLUTION ANTISEPTIQUE POUR TRAYONS À UTILISER AVANT ET APRÈS LA TRAITE

INDICATIONS: GLADIATOR est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons avant et après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mastite chez les vaches laitières.

MESSES EN GARDE: Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec accidentellement avec une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS: Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer

LOT:

SOLUTION ANTISEPTIQUE POUR TRAYONS À UTILISER AVANT ET APRÈS LA TRAITE

INDICATIONS: GLADIATOR est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons avant et après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes

qui peuvent causer la mastite chez les vaches laitières.

MESSES EN GARDE: Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette.

Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec accidentellement avec une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS: Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer

MODE D'EMPLOI Mesurer des quantités égales de GLADIATOR ACTIVATOR et GLADIATOR BASE dans un contenant propre et mélanger jusqu'à la couleur sol uniforme. Ne manger seulement la quantité nécessaire pour un traitement de tous les animaux. Toujours utiliser une solution antiseptique de lavage de pieu et non diluée.	AVANT LA TRAITE : Utilisez le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer GLADIATOR sur chaque trayon de manière que la solution couvre toute la surface des trayons. Laisser agir de 15 à 30 secondes, puis bien sécher les trayons. Si le pieu et les trayons sont très sales, les nettoyer avec une solution antiseptique de lavage de pieu puis bien les sécher avant d'appliquer GLADIATOR.	APRÈS LA TRAITE : Utilisez le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer GLADIATOR sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Si la température extérieure est inférieure à 0°C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour envoyer le gel. Quand une vache est traitée, continuer l'application de GLADIATOR sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite.
REVERSEMENT: Use at full strength. Do not dilute. Before milking, apply GLADIATOR to each teat, ensuring complete coverage of all teats with the solution. After 15 to 30 seconds, dry each teat thoroughly. If the udder and teats are heavily soiled, wash and dry thoroughly before application GLADIATOR.		
POST MILKING: Use at full strength. Do not dilute. Apply GLADIATOR to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0°C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. When a cow is being milked off, continue the application of GLADIATOR to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With finishing cows, resume application of GLADIATOR to all teats twice daily for 1 to 10 days before calving. A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.		
ACTIVE INGREDIENTS: Lactic Acid 2.64% w/w EMOLIENTS: Glycerine 10% w/w Storage Conditions: Store between 2° C and 30° C. Keep from freezing. Store in a cool, dry area, away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.		
Conditions D'ENTREPOSAGE: Conserver entre 2 ° C et 30 ° C. Eviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur pour éviter la déterioration. Garder le contenant bien fermé.		
Distributed By Distributor Bar Aglian Specialty Chemical and Pharmaceutical Inc.) P.O. Box 68, 161 Smith Street, Arthur, ON N0G 1A0 Manufactured By : Fabrication Par : Baumatic LLC P.O. Box 3050, 1919 S. Brugh Road, Madison, WI 53716 USA Revision / Révision 16-05-2022 ■ LN #####■		

Gladiator Base

For Veterinary Use Only
Pour Usage Vétérinaire Seulement

Sodium Chlorite Teat Solution Solution Pour Trays à base de chlorite de sodium

GLADIATOR BASE for use only with GLADIATOR ACTIVATOR
GLADIATOR OR BASE à utiliser uniquement avec GLADIATOR ACTIVATOR

DIN 025222411

PRE- AND POST-MILKING ANTISEPTIC TEAT SOLUTION

INDICATIONS: GLADIATOR is a pail and post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

WARNINGS: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

PRECAUTIONS: For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antisepic teat solution.

SOLUTION ANTISEPTIQUE POUR TRAYONS À UTILISER AVANT ET APRÈS LA TRAITE

INDICATIONS: GLADIATOR est un solution antiseptique à utiliser sur les trayons avant et après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mastite chez les vaches laitières.

MISES EN GARDE: Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette.

Éviter tout contact avec le nourriture. Ne pas avaler. En cas d'exposition accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel rincer la grande eau. Recevoir des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS: Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

Gladiator

DIRECTIONS FOR USE: Measure equal volumes of GLADIATOR ACTIVATOR and GLADIATOR BASE into a clean container and mix until the colour is uniform throughout. Always use a freshly mixed, full-strength GLADIATOR.

PRE-MILKING: Use at full strength. Do not dilute. Before milking, apply GLADIATOR to each teat, ensuring complete coverage of all teats with the solution. After 15 to 30 seconds, dry each teat thoroughly. If the udder and teats are heavily soiled, clean with an antiseptic udder wash and dry thoroughly before application of GLADIATOR.

POST-MILKING: Use at full strength. Do not dilute.

After milking, apply GLADIATOR to each teat immediately after milking. Ensure all the solution has been absorbed before applying the next teat. Allow teats to dry on a clean cloth if needed. If a teat is below 0°C, allow to dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. When a cow is being dried off, continue the application of GLADIATOR to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of GLADIATOR to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving. A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should always be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original product. Keep container closed to prevent contamination of the product.

Storage Conditions: Store between 2°C and 30°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area kept away from direct sunlight and heat. To avoid deterioration, keep container tightly closed.

Active Ingredients: Sodium Chlorite 0.64% w/v

Storage Conditions: Store between 2°C and 30°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area kept away from direct sunlight and heat. To avoid deterioration, keep container tightly closed.

Conditions D'Entreposage: Conserver entre 2 °C et 30 °C. Eviter le gel. En reposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la dégradation.

Ingrédients Actifs: Chlorite de Sodium 0.64% p/p

Conditions D'Entreposage: Conserver entre 2 °C et 30 °C. Eviter le gel. En reposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la dégradation.

MODE D'EMPLOI: Mesurer des quantités égales de GLADIATOR ACTIVATOR et GLADIATOR BASE dans un contenant propre et mélanger jusqu'à la couleur soit uniforme. Ne pas diluer. Manger seulement la quantité nécessaire pour un traitement de tous les animaux. Toujours utiliser une solution de GLADIATOR fraîchement mélangée et non diluée.

AVANT LA TRAITE: Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer GLADIATOR sur chaque trayon de manière à recouvrir toute la surface des trayons. Laisser agir de 15 à 30 secondes, puis bien sécher les trayons. Si le produit reste sur les trayons, les nettoyer avec une solution antiseptique de lavage de pâs, puis bien sècher avant de l'appliquer GLADIATOR.

APRÈS LA TRAITE: Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer GLADIATOR sur le trayon de manière à recouvrir toute la surface des trayons. Laisser agir de 15 à 30 secondes, puis bien sécher les trayons. Si le produit reste sur les trayons, les nettoyer avec une solution antiseptique de lavage de pâs, puis bien sècher avant de l'appliquer GLADIATOR.

Assurer une bonne hygiène de travail. Si la solution de GLADIATOR est renversée sur la peau ou les vêtements, laver immédiatement avec de l'eau froide et du savon. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.

Conditions D'Entreposage: Conserver entre 2 °C et 30 °C. Eviter le gel. En reposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la dégradation.

Ingrédients Actifs: Chlorite de Sodium 0.64% p/p

Conditions D'Entreposage: Conserver entre 2 °C et 30 °C. Eviter le gel. En reposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la dégradation.

Garder à température bien ferme.

Distributed By: Deltek Bar Aglian Specialty Chemical and Pharmaceutical (A Division of Agrian Inc)
P.O. Box 68, 1451 South Street, Elkhorn, WI 54120 USA
Manufactured By: Fabrique Par Bournaire LLC
P.O. Box 3050, 1919 S. Stoughton Road, Madison, WI 53716 USA
Revision/Révision 16-08-2022 ■ LN #####