

## **RENSEIGNEMENTS THÉRAPEUTIQUES**

### **ANUSOL-HC<sup>MC</sup> ONGUENT**

**(Acétate d'hydrocortisone et sulfate de zinc monohydraté Onguent)**

**(Acétate d'hydrocortisone 0.5% et sulfate de zinc monohydraté 0.5%)**

Church & Dwight Canada Corp  
Mississauga, ON L5S 0A5

Date de révision :  
28 septembre, 2022

Numéro de contrôle de la présentation : 253708

Anusol-HC est une marque de commerce de Church & Dwight Co, utilisée sous licence et distribuée par Church & Dwight Canada Corp.

## **RENSEIGNEMENTS THÉRAPEUTIQUES**

### **ANUSOL-HC<sup>MC</sup> ONGUENT**

**(acétate d'hydrocortisone et sulfate de zinc monohydraté)**

#### **CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE**

Traitement anorectal

#### **INDICATION ET USAGE CLINIQUE**

ANUSOL-HC<sup>MC</sup> ONGUENT (acétate d'hydrocortisone et sulfate de zinc monohydraté) est indiqué pour le soulagement de la douleur et du malaise consécutifs à la chirurgie anorectale ou associés à la phase aiguë d'affections anorectales courantes, telles que : hémorroïdes externes et internes (y compris les hémorroïdes de grossesse) compliquées ou non par une thrombose et un prolapsus, prurit anal, proctite, cryptite, fissure, fistule incomplète et autres affections inflammatoires ou allergiques congestives.

#### **CONTRE-INDICATIONS**

ANUSOL-HC<sup>MC</sup> ONGUENT (acétate d'hydrocortisone et sulfate de zinc monohydraté) est contre-indiqué chez les patients présentant des antécédents d'hypersensibilité à l'un des ingrédients. Il ne faut pas l'utiliser en présence de lésions cutanées d'origine tuberculeuse, fongique ou virale.

#### **PRECAUTIONS**

On ne doit pas utiliser ANUSOL-HC<sup>MC</sup> ONGUENT (acétate d'hydrocortisone et sulfate de zinc monohydraté) ni aucune autre préparation contenant de l'hydrocortisone tant qu'un examen proctologique adéquat n'a pas été effectué et le diagnostic, confirmé. En outre, des mesures nécessaires doivent être prises à l'égard des infections, des allergies et d'autres facteurs causals. L'utilisation prolongée de ce médicament risque de provoquer des effets généraux associés aux corticostéroïdes, bien qu'aucun cas n'ait été signalé à ce jour. Comme avec tout autre

médicament destiné à l'application locale, la manifestation de réactions idiosyncrasiques commande l'arrêt du traitement.

### **Grossesse et allaitement:**

L'innocuité des corticostéroïdes topiques pendant la grossesse et l'allaitement n'est pas établie. Par conséquent, ANUSOL-HC<sup>MC</sup> ONGUENT (acétate d'hydrocortisone et sulfate de zinc monohydraté) ne doit pas être utilisé sans raison valable sur de grandes surfaces, en grande quantité ou pendant de longues périodes chez les femmes enceintes.

### **EFFETS INDÉSIRABLES**

Une sensation de brûlure peut être ressentie par certains patients lors de l'administration de ANUSOL-HC<sup>MC</sup> ONGUENT (acétate d'hydrocortisone et sulfate de zinc monohydraté), surtout en présence de lésions dermiques à l'anus. Les réactions locales d'hypersensibilité ont été rares à ce jour.

### **SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE**

Le risque de surdosage est très faible, et aucun effet indésirable ni réaction de toxicité n'a été associé à ANUSOL-HC<sup>MC</sup> ONGUENT (acétate d'hydrocortisone et sulfate de zinc monohydraté).

**Traitement :** En cas d'ingestion accidentelle, effectuer un lavage gastrique et administrer une dose de sulfate de magnésium à titre de purgatif.

### **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

Appliquer l'onguent à l'intérieur et à l'extérieur de l'anus le matin et au coucher, et après chaque selle, ou selon les indications du médecin. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Conserver entre 15 et 30°C. Renseignements thérapeutiques fournis sur demande aux professionnels de la santé.

### **Composition de l'onguent**

Chaque tube d'ONGUENT ANUSOL-HC<sup>MC</sup> (Acétate d'hydrocortisone - Sulfate de zinc monohydraté) contient : monohydrate de sulfate de zinc monohydraté 0,5 % et acétate

d'hydrocortisone 0,5 % dans un onguent à base de pétrolatum. Ingrédients non médicinaux : phosphate de calcium dibasique, huile minérale, petrolatum blanc, polyoxyéthylène (2) oléyl-éther.

### **Stabilité et conditions de conservation**

Conserver ANUSOL-HC<sup>MC</sup> ONGUENT (acétate d'hydrocortisone et sulfate de zinc monohydraté) dans un endroit frais, entre 15°C et 30°C.

### **PRÉSENTATIONS**

ANUSOL-HC<sup>MC</sup> ONGUENT (acétate d'hydrocortisone et sulfate de zinc monohydraté) est disponible en tube de 30g avec un applicateur en plastique.

## RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

### Substance médicamenteuse

Dénomination  
commune :

Acétate de l'hydrocortisone et Sulfate de zinc monohydraté

Dénomination  
chimique :

Acétate de l'hydrocortisone : acétate de 11 $\beta$ ,17-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-én-21-yle

Sulfate de zinc : sulfate de zinc monohydraté


Formule brute :

Acétate de l'hydrocortisone - C<sub>23</sub>H<sub>32</sub>O<sub>6</sub>  
Sulfate de zinc monohydraté - ZnSO<sub>4</sub>•H<sub>2</sub>O

Poids moléculaire:

Acétate de l'hydrocortisone - 404.50  
Sulfate de zinc monohydraté - 179.4

Formule développée de l'acétate de l'hydrocortisone :



Description :

L'acétate de l'hydrocortisone : Poudre cristalline blanche à pratiquement blanche, inodore. Légèrement soluble dans l'alcool et dans le chloroforme; insoluble dans l'eau.

Le sulfate de zinc monohydraté : Prismes incolores et transparents, ou petites aiguilles. Le monohydrate est pratiquement insoluble dans l'alcool.