

# Table of Contents

Pristine PM - French.....	1
PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.....	4
PARTIE II : INFORMATION SCIENTIFIQUE.....	28
RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT.....	51

MONOGRAPHIE DE PRODUIT  
INCLUANT LES RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

Pr **AURO-LOSARTAN**

Comprimés de losartan potassique

25 mg, 50 mg et 100 mg

Norme d'Aurobindo

Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II

Auro Pharma Inc.  
3700 Steeles Avenue West, Suite # 402  
Woodbridge, ON, L4L 8K8,  
Canada

Date d'approbation initiale :  
15 mars 2013

Date de révision :  
17 février 2023

Numéro de contrôle de la présentation : 267555

## RÉCENTES MODIFICATIONS IMPORTANTES DE L'ÉTIQUETTE

Aucune	
--------	--

### TABLE DES MATIÈRES

Les sections ou sous-sections qui ne sont pas pertinentes au moment de l'autorisation ne sont pas énumérées.

<b>RÉCENTES MODIFICATIONS IMPORTANTES DE L'ÉTIQUETTE</b> .....	<b>2</b>
<b>TABLE DES MATIÈRES</b> .....	<b>2</b>
<b>PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ</b> .....	<b>4</b>
<b>1 INDICATIONS</b> .....	<b>4</b>
1.1 Enfants .....	4
1.2 Personnes âgées .....	4
<b>2 CONTRE-INDICATIONS</b> .....	<b>4</b>
<b>3 ENCADRÉ « MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES »</b> .....	<b>5</b>
<b>4 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION</b> .....	<b>5</b>
4.1 Considérations posologiques .....	5
4.2 Dose recommandée et modification posologique .....	5
4.4 Administration .....	7
4.5 Dose omise.....	7
<b>5 SURDOSAGE</b> .....	<b>7</b>
<b>6 FORMES GALÉNIQUES, DOSAGES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT</b> .....	<b>8</b>
<b>7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS</b> .....	<b>8</b>
7.1 Populations particulières .....	11
7.1.1 Femmes enceintes .....	11
7.1.2 Allaitement.....	12
7.1.3 Enfants (6 à 16 ans) : .....	12
7.1.4 Personnes âgées (≥ 65 ans) .....	13
<b>8 EFFETS INDÉSIRABLES</b> .....	<b>13</b>
8.1 Aperçu des effets indésirables.....	13
8.2 Effets indésirables observés dans les essais cliniques.....	14
8.3 Effets indésirables peu courants observés au cours des essais cliniques .....	15
8.4 Résultats de laboratoire anormaux : hématologique, chimie clinique et autres données quantitatives .....	16
8.5 Effets indésirables observés après la mise en marché .....	17
<b>9 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES</b> .....	<b>17</b>
9.1 Interactions médicamenteuses graves .....	17
9.4 Interactions médicament-médicament .....	17
9.5 Interactions médicament-aliment .....	22
9.6 Interactions médicament-plante médicinale .....	23
9.7 Interactions médicament-tests de laboratoire.....	23

<b>10</b>	<b>PHARMACOLOGIE CLINIQUE.....</b>	<b>23</b>
10.1	Mode d'action.....	23
10.2	Pharmacodynamie.....	23
10.3	Pharmacocinétique.....	24
<b>11</b>	<b>STOCKAGE, STABILITÉ ET ÉLIMINATION .....</b>	<b>27</b>
<b>12</b>	<b>INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES DE MANIPULATION .....</b>	<b>27</b>
<b>PARTIE II : INFORMATION SCIENTIFIQUE.....</b>		<b>28</b>
<b>13</b>	<b>INFORMATION PHARMACEUTIQUE .....</b>	<b>28</b>
<b>14</b>	<b>ESSAIS CLINIQUES.....</b>	<b>28</b>
14.1	Essais cliniques par indication .....	28
14.2	Études comparatives de biodisponibilité.....	40
<b>15</b>	<b>MICROBIOLOGIE.....</b>	<b>41</b>
<b>16</b>	<b>TOXICOLOGIE NON CLINIQUE .....</b>	<b>41</b>
<b>17</b>	<b>MONOGRAPHIES DE PRODUIT À L'APPUI .....</b>	<b>50</b>
<b>RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT.....</b>		<b>51</b>

## PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

### 1 INDICATIONS

#### Hypertension :

AURO-LOSARTAN (losartan potassique) est indiqué :

- pour le traitement de l'hypertension essentielle;
- chez les patients présentant une hypertension essentielle et une hypertrophie ventriculaire gauche (voir [14 ESSAIS CLINIQUES](#)).

AURO-LOSARTAN peut être administré seul ou conjointement avec des diurétiques thiazidiques.

Dans les études cliniques contrôlées, une vaste majorité de patients atteints d'hypertension grave ont nécessité un traitement au moyen d'une association médicamenteuse. Losartan potassique a été utilisé conjointement avec des bêta-bloquants et des bloqueurs des canaux calciques, mais les données sur ce type d'association médicamenteuse sont limitées.

#### Diabète de type 2 lié à une protéinurie et à une hypertension :

AURO-LOSARTAN est indiqué :

- pour ralentir l'évolution de la néphropathie, évaluée par la survenue d'une augmentation du simple au double de la concentration de créatinine sérique et d'une insuffisance rénale au stade terminal, et pour réduire la protéinurie (voir [14 ESSAIS CLINIQUES](#)).

#### 1.1 Enfants

**Enfants (6 à 16 ans) :** Les effets anti hypertensifs de losartan potassique ont été démontrés chez des enfants hypertendus âgés de 6 à 16 ans. L'utilisation de losartan potassique dans ces groupes d'âge repose sur des données probantes issues d'études adéquates et bien contrôlées portant sur l'administration de losartan potassique chez les enfants (voir [2 CONTRE-INDICATIONS](#), [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS](#), [10 PHARMACOLOGIE CLINIQUE](#) et [14 ESSAIS CLINIQUES](#)).

#### 1.2 Personnes âgées

**Personnes âgées (≥ 65 ans) :** Dans les études cliniques, on n'a observé aucune différence liée à l'âge quant à l'efficacité et à l'innocuité du losartan (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS](#)).

### 2 CONTRE-INDICATIONS

- Les patients qui présentent une hypersensibilité au produit ou à un ingrédient de la formulation. Pour obtenir la liste complète des ingrédients, veuillez consulter la section [6 FORMES POSOLOGIQUES, CONCENTRATIONS, COMPOSITION ET EMBALLAGE](#).
- Chez les patients atteints de diabète de type 1 ou de type 2 ainsi que chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée ou grave (débit de filtration glomérulaire [DFG] 60 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>), l'utilisation concomitante d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine (ARA), dont AURO-LOSARTAN, ou d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA) avec un médicament contenant de l'aliskiren est contre-indiquée (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Double inhibition du système rénine angiotensine](#) et [Rénal](#), et [9 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Double inhibition du système rénine-angiotensine au moyen d'IECA, d'ARA ou de médicaments contenant de l'alaskien](#)).

### 3 ENCADRÉ « MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES »

#### Mises en garde et précautions importantes

Administrés pendant la grossesse, les antagonistes des récepteurs (AT1) de l'angiotensine (ARA) peuvent comporter un risque de morbidité et de mortalité fœtale. Le traitement au moyen d'AURO-LOSARTAN devrait être interrompu le plus tôt possible après un diagnostic de grossesse (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Populations particulières](#)).

### 4 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

#### 4.1 Considérations posologiques

Avant d'amorcer le traitement, il faut tenir compte du traitement anti hypertensif antérieur, du degré d'hypertension, de la restriction sodée et d'autres facteurs pertinents sur le plan clinique. Il peut s'avérer nécessaire d'ajuster la posologie des autres antihypertenseurs administrés conjointement avec AURO-LOSARTAN.

#### 4.2 Dose recommandée et modification posologique

**Hypertension** : La posologie d'AURO-LOSARTAN doit être ajustée en fonction des besoins de chaque patient.

**Monothérapie** : La dose initiale habituelle d'AURO-LOSARTAN est de 50 mg, une fois par jour.

La posologie devrait être ajustée en fonction de la réponse de la tension artérielle. L'effet antihypertensif maximal est atteint 3 à 6 semaines après le début du traitement.

La posologie habituelle d'AURO-LOSARTAN varie de 50 à 100 mg par jour, administrés en une seule dose. La dose monoquotidienne maximale ne devrait pas dépasser 100 mg, car on n'obtient aucun effet antihypertensif additionnel avec des doses plus élevées.

L'effet antihypertensif se maintient chez la plupart des patients traités avec AURO-LOSARTAN à raison d'une dose de 50 mg, une fois par jour. Chez certains patients qui reçoivent une dose par jour, l'effet antihypertensif peut diminuer vers la fin de la période entre les doses. Cette diminution peut être évaluée en mesurant la tension artérielle avant l'administration du médicament pour vérifier si des chiffres tensionnels satisfaisants se maintiennent durant 24 heures. Si ce n'est pas le cas, il faut envisager soit de diviser la dose monoquotidienne en deux doses, soit d'augmenter la dose. Si la tension artérielle n'est pas maîtrisée de façon adéquate avec AURO-LOSARTAN seul, on peut ajouter un diurétique (autre qu'un diurétique d'épargne potassique).

Chez les patients qui présentent une hypovolémie, il est recommandé d'utiliser une dose de départ de 25 mg, une fois par jour (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire, Hypotension](#) et [9 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES](#)).

**Traitement diurétique concomitant** : Chez les patients qui reçoivent des diurétiques, le traitement avec AURO-LOSARTAN devrait être amorcé avec prudence, car ces patients peuvent présenter une hypovolémie et, par conséquent, être plus susceptibles de souffrir d'hypotension après l'administration de la dose initiale d'un antihypertenseur administré simultanément. La prise du diurétique devrait, si cela est possible, être interrompue deux ou trois jours avant d'entreprendre un traitement avec AURO-LOSARTAN afin de réduire les risques d'hypotension (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire, Hypotension](#) et [9 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES](#)). Si l'état du patient ne permet pas d'interrompre le traitement diurétique, on doit alors administrer AURO-LOSARTAN avec prudence et surveiller de près la tension artérielle. Il faudra ensuite ajuster la posologie en fonction de la réponse du patient.

**Diabète de type 2 lié à une protéinurie et à une hypertension** : La dose initiale habituelle est de 50 mg, une fois par jour. Cette dose peut être augmentée à 100 mg, une fois par jour, en fonction de la réponse de la tension artérielle. AURO-LOSARTAN peut être administré conjointement avec d'autres antihypertenseurs (diurétiques, bloqueurs des canaux calciques, alpha-bloquants, bêta-bloquants ou médicaments à action centrale) de même qu'avec de l'insuline ou d'autres hypoglycémifiants courants (sulfonylurées, glitazones et inhibiteurs de l'alpha-glucosidase).

**Personnes âgées (≥ 65 ans)** : Aucun ajustement de la posologie initiale n'est nécessaire chez la plupart des patients âgés. Il est cependant recommandé de surveiller adéquatement ces patients.

**Enfants (6 à 16 ans)** : Patients capables d'avaler des comprimés – La dose recommandée est de 25 mg une fois par jour chez les sujets dont le poids se situe entre  $\geq 20$  et  $< 50$  kg; cette dose

peut être augmentée jusqu'à un maximum de 50 mg une fois par jour. Chez les enfants dont le poids est > 50 kg, la dose de départ est de 50 mg une fois par jour; cette dose peut être augmentée jusqu'à un maximum de 100 mg une fois par jour.

La posologie doit être ajustée en fonction de la réponse de la tension artérielle.

Chez les enfants qui présentent une hypovolémie intravasculaire, il faut corriger cet état avant d'administrer AURO-LOSARTAN.

AURO-LOSARTAN n'est pas recommandé chez les enfants qui ont un taux de filtration glomérulaire < 30 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>, chez ceux qui présentent une insuffisance hépatique et chez les nouveau-nés, car nous ne disposons d'aucune donnée relative à ces populations.

**Insuffisance rénale :** En général, il n'est pas nécessaire d'ajuster la posologie initiale chez les patients qui présentent une insuffisance rénale, y compris ceux qui sont soumis à une hémodialyse. Il est cependant recommandé de surveiller adéquatement ces patients.

**Insuffisance hépatique :** Une dose initiale de 25 mg devrait être envisagée chez les patients qui présentent une insuffisance hépatique ou des antécédents d'insuffisance hépatique (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hépatique/biliaire/pancréatique, Insuffisance hépatique](#) et [10 PHARMACOLOGIE CLINIQUE](#)).

#### 4.4 Administration

Le comprimé AURO-LOSARTAN est destiné à l'administration par voie orale.

AURO-LOSARTAN peut être pris avec ou sans aliments, mais de préférence toujours dans les mêmes conditions par rapport à la prise d'aliments, à peu près à la même heure tous les jours.

#### 4.5 Dose omise

Si une dose est oubliée, il ne faut pas prendre une dose supplémentaire par la suite. Seule la dose habituelle doit être prise.

### 5 SURDOSAGE

On ne possède que peu de données sur losartan potassique concernant le surdosage chez l'humain. Les manifestations les plus probables de surdosage seraient l'hypotension ou la tachycardie, voire ces deux troubles à la fois. Dans les cas d'hypotension symptomatique, il faut instaurer un traitement d'appoint.

Ni le losartan ni le métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

Pour traiter une surdose présumée, communiquez avec le centre antipoison de votre région.

## 6 FORMES GALÉNIQUES, DOSAGES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

Tableau 1 - Formes posologiques, dosages, composition et conditionnement

Voie d'administration	Forme posologique / Dosage/Composition	Ingrédients non-médicinaux
Oral	Comprimés / 25 mg, 50 mg, 100 mg	Cellulose microcristalline, Lactose monohydraté, Hydroxypropylcellulose faiblement substituée, Stéarate de magnésium, Opadry blanc 20A58900, Amidon prégélatinisé.

Les comprimés AURO-LOSARTAN 25 mg sont des comprimés pelliculés blancs à blanc cassé, de forme ovale, biconvexes, portant l'inscription "E" sur une face et "45" sur l'autre. Disponible en emballage blister de 2X14 et 10X10 et en conteneur PEHD de 90, 100, 500 & 1000.

Les comprimés AURO-LOSARTAN 50 mg sont des comprimés pelliculés blancs à blanc cassé, de forme ovale, biconvexes, portant l'inscription "E" sur une face et "4" et "6" séparés par une ligne de séparation sur l'autre face. Disponible en emballage blister de 2X14 et 10X10 et en conteneur PEHD de 30, 100, 500 & 1000.

Les comprimés d'AURO-LOSARTAN 100 mg sont des comprimés pelliculés blancs à blanc cassé, de forme ovale, biconvexes, portant l'inscription "E" sur une face et "47" sur l'autre. Disponible en blister de 2X14 et 10X10 et en conteneur PEHD de 30, 100, 500 & 1000.

## 7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Veillez consulter l'[ENCADRÉ « MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES » de la section 3.](#)

### Généralités

Race: Dans l'étude LIFE, les patients noirs afro-américains traités avec de l'aténolol étaient moins à risque de subir le principal critère d'évaluation composite et d'accident vasculaire cérébral que les patients noirs afro-américains traités avec de losartan potassique. Basé sur l'étude de LA VIE, les avantages de losartan potassique sur le critère d'évaluation composite primaire et l'AVC par rapport à l'aténolol ne s'appliquent pas aux patients noirs afro-américains présentant l'hypertension et l'hypertrophie ventriculaire gauche bien que les deux régimes de

traitement effectivement abaissé la tension artérielle dans ces patients (voir [14 ESSAIS CLINIQUES](#)).

### **Cancérogenèse et mutagenèse**

On n'a pas observé d'effet carcinogène ou mutagène associé au losartan (voir [16 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE](#)).

### **Cardiovasculaire**

Hypotension: Une hypotension symptomatique est parfois survenue après l'administration du losartan, dans certains cas après la première dose. Ce trouble est plus susceptible de se manifester chez les patients qui présentent une hypovolémie due à la prise de diurétiques, à un régime hyposodé, à une dialyse, à une diarrhée ou à des vomissements. Chez ces patients, à cause d'un risque de chute de la tension artérielle, on doit entreprendre le traitement sous étroite surveillance médicale. Ces recommandations s'appliquent également aux patients atteints de cardiopathie ischémique ou de troubles vasculaires cérébraux de nature ischémique, chez qui une baisse excessive de la tension artérielle pourrait provoquer un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral (AVC).

Sténose valvulaire: Certaines données théoriques laissent supposer que les patients souffrant de sténose aortique pourraient présenter un risque particulier de réduction de la perfusion coronarienne lors du traitement avec des vasodilatateurs, étant donné que chez ces patients, la diminution de la postcharge est moins prononcée.

Double inhibition du système rénine-angiotensine: Il existe des données indiquant que l'administration d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (ARA), tels que losartan potassique, ou d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA) en association avec l'aliskiren augmente le risque d'hypotension, de syncope, d'AVC, d'hyperkaliémie et de détérioration de la fonction rénale, y compris d'insuffisance rénale, chez les patients atteints de diabète de type 1 ou de type 2 ainsi que chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée ou grave ( $DFG < 60 \text{ mL/min/1,73 m}^2$ ). En conséquence, l'utilisation d'AURO-LOSARTAN en association avec des médicaments contenant de l'aliskiren est déconseillée chez ces patients. L'administration concomitante d'un ARA (notamment AURO-LOSARTAN) avec d'autres inhibiteurs du système rénine-angiotensine, comme les IECA ou les médicaments contenant de l'aliskiren, n'est recommandée chez aucun type de patient, car on ne peut exclure la survenue d'effets indésirables.

### **Hépatique/biliaire/pancréatique**

Insuffisance hépatique: Comme les données pharmacocinétiques mettent en relief une élévation significative des concentrations plasmatiques du losartan et de son métabolite actif après l'administration de losartan potassique chez les patients atteints de cirrhose hépatique, il est

recommandé d'administrer une dose plus faible aux patients atteints d'insuffisance hépatique ou présentant des antécédents de cette maladie (voir [4 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION](#) et [10 PHARMACOLOGIE CLINIQUE](#)).

### **Immunitaire**

Hypersensibilité: Des réactions anaphylactiques et un angioœdème (comportant un gonflement du larynx et de la glotte causant une obstruction des voies aériennes ou un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et du pharynx, exigeant dans certains cas de recourir à une intubation ou à une trachéotomie) ont été rarement rapportés chez les patients traités avec le losartan. Certains de ces patients avaient déjà présenté un angioœdème avec des inhibiteurs de l'ECA. Des cas de vascularite, y compris un purpura de Schönlein-Henoch, ont rarement été rapportés.

### **Rénal**

Insuffisance rénale: Des modifications de la fonction rénale ont été rapportées chez les personnes vulnérables à la suite de l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. Chez les patients dont la fonction rénale peut dépendre de l'activité du système rénine - angiotensine-aldostérone, comme les patients qui présentent une sténose bilatérale de l'artère rénale, une sténose de l'artère rénale sur rein unique ou une insuffisance cardiaque grave, le traitement avec des médicaments qui inhibent ce système a été relié à de l'oligurie, à une azotémie évolutive et, quoique rarement, à une insuffisance rénale aiguë ou à la mort. Chez les patients vulnérables, l'administration concomitante de diurétiques peut augmenter ce risque.

L'utilisation d'ARA (y compris AURO-LOSARTAN) ou d'IECA en association avec des médicaments contenant de l'aliskiren est contre-indiquée chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée ou grave ( $DFG < 60 \text{ mL/min/1,73 m}^2$ ) (voir [2 CONTRE-INDICATIONS](#) et [9 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Double inhibition du système rénine-angiotensine au moyen d'IECA, d'ARA ou de médicaments contenant de l'aliskiren](#)).

Le traitement avec le losartan devrait comprendre une évaluation adéquate de la fonction rénale.

Hyperkaliémie: Dans une étude clinique menée auprès de patients diabétiques (type 2) atteints de protéinurie et d'hypertension, la fréquence d'hyperkaliémie a été plus élevée chez les patients traités avec losartan potassique (9,9 %) que chez les patients recevant le placebo (3,4 %). Toutefois, seul un petit nombre de patients a dû interrompre le traitement en raison d'une hyperkaliémie. Il est recommandé de surveiller étroitement le taux de potassium sérique (voir [8 EFFETS INDÉSIRABLES, Résultats de laboratoire anormaux : hématologique, chimie clinique et autres données quantitatives](#) et [14 ESSAIS CLINIQUES](#)).

L'utilisation concomitante d'autres médicaments susceptibles d'augmenter le taux de potassium sérique peut entraîner une hyperkaliémie (voir [9 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES](#)).

## 7.1 Populations particulières

### 7.1.1 Femmes enceintes

Les médicaments qui agissent directement sur le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) comportent des risques de morbidité et de mortalité fœtale et néonatale lorsqu'ils sont administrés aux femmes enceintes. Le traitement au moyen d'AURO-LOSARTAN devrait être interrompu le plus tôt possible après un diagnostic de grossesse.

La prise d'ARA n'est pas recommandée durant la grossesse. Les données épidémiologiques portant sur le risque d'effets tératogènes après une exposition aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (une autre classe de médicaments agissant sur le système SRAA) au cours du premier trimestre de la grossesse n'ont pas été concluantes. Cependant, on ne peut exclure une légère augmentation du risque. Étant donné les preuves actuelles sur le risque relié aux ARA, cette classe thérapeutique pourrait comporter des risques similaires. Les patientes qui prévoient être enceintes devraient recevoir un autre antihypertenseur pour lequel l'innocuité durant la grossesse a été établie. Le traitement au moyen d'un antagoniste de l'angiotensine II devrait être interrompu le plus tôt possible après un diagnostic de grossesse et, au besoin, un traitement de remplacement devrait être amorcé.

On sait que l'utilisation d'un ARA pendant les deuxième et troisième trimestres entraîne chez l'humain une toxicité fœtale (diminution de la fonction rénale du fœtus, oligoamnios, retard dans l'ossification du crâne) et une toxicité néonatale (insuffisance rénale, hypotension, hyperkaliémie).

On doit surveiller étroitement l'état des nouveau-nés qui ont été exposés *in utero* à un ARA afin de déceler tout signe d'hypotension, d'oligurie et d'hyperkaliémie. En cas d'oligurie, il faut veiller à maintenir une tension artérielle et une perfusion rénale adéquates. On peut avoir recours à l'exsanguinotransfusion ou à la dialyse pour remédier à l'hypotension ou à l'insuffisance rénale, ou aux deux à la fois; cependant, l'expérience limitée avec ces procédés n'a pas été reliée à des bienfaits cliniques significatifs. Ni le losartan ni le métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

#### Données chez l'animal

Des études chez le rat ont mis en évidence des effets secondaires attribuables au losartan potassique chez le fœtus et le nouveau-né, par exemple une réduction du poids ainsi que des cas de mortalité et de toxicité rénale. On a décelé des concentrations importantes de losartan et de son métabolite actif dans le lait des rates. D'après les évaluations pharmacocinétiques,

ces observations seraient reliées à une exposition au médicament à la fin de la gestation ou au cours de la période de lactation.

### **7.1.2 Allaitement**

On ne sait pas si le losartan et son métabolite actif sont excrétés dans le lait maternel humain, mais des concentrations élevées de ces deux composants ont été retrouvées dans le lait maternel de rates en lactation. Comme de nombreux médicaments sont excrétés dans le lait maternel humain et qu'il peut y avoir un risque pour le nourrisson, il faut cesser soit l'allaitement, soit la prise du médicament, en tenant compte de l'importance du traitement pour la mère.

### **7.1.3 Enfants (6 à 16 ans) :**

L'effet antihypertensif a été démontré dans une étude sur la réponse en fonction de la dose d'une durée limitée de trois semaines, après quoi la moitié des patients ont poursuivi leur traitement selon la posologie désignée pour une période allant jusqu'à six semaines. Les réductions de la tension artérielle ont été maintenues chez les deux groupes de patients recevant les deux doses les plus élevées.

#### Insuffisance rénale

On ne dispose d'aucune donnée relative à l'effet de losartan potassique sur la tension artérielle des enfants de moins de six ans et les nouveau-nés ou chez les enfants présentant un taux de filtration glomérulaire < 30 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>.

Des modifications de la fonction rénale ont été rapportées chez les personnes vulnérables à la suite de l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. Chez les patients dont la fonction rénale peut dépendre de l'activité du système rénine-angiotensine-aldostérone, comme les patients qui présentent une sténose bilatérale de l'artère rénale, une sténose de l'artère rénale sur rein unique ou une insuffisance cardiaque congestive grave, le traitement avec des agents qui inhibent ce système a été relié

à de l'oligurie, à une azotémie évolutive et, quoique rarement, à une insuffisance rénale aiguë, à la mort ou les deux. Chez les patients vulnérables, l'administration concomitante de diurétiques peut augmenter davantage ce risque.

Le traitement avec le losartan devrait comprendre une évaluation adéquate de la fonction rénale.

#### Insuffisance hépatique

On ne dispose d'aucune donnée sur l'effet de losartan potassique chez les enfants présentant une insuffisance hépatique.

L'innocuité à long terme a été évaluée chez les enfants dans le cadre d'une phase de prolongation de six mois de l'étude mentionnée ci-dessus portant sur la réponse en fonction de la dose.

La pharmacocinétique du losartan a été évaluée à la suite de l'administration d'une dose monoquotidienne orale d'environ 0,54 à 0,77 mg/kg de losartan (doses moyennes) chez 50 enfants hypertendus âgés de > 1 mois à < 16 ans. Le métabolite actif est formé à partir du losartan chez tous les groupes d'âge. Les paramètres pharmacocinétiques du losartan et de son métabolite actif sont généralement similaires dans tous les groupes d'âge étudiés et concordent avec les données pharmacocinétiques historiques chez les adultes (voir [8 EFFETS INDÉSIRABLES](#) et [14 ESSAIS CLINIQUES](#)).

#### **7.1.4 Personnes âgées (≥ 65 ans)**

Aucune différence quant à l'innocuité du losartan n'a été mise en évidence entre les patients âgés et les patients plus jeunes; on recommande toutefois d'user de prudence en prescrivant le médicament aux patients âgés en raison de la plus grande vulnérabilité de cette population aux effets des médicaments. Cette conclusion est fondée sur les résultats observés chez 391 des 2 085 (19 %) patients de 65 ans et plus qui ont reçu le losartan en monothérapie dans des études contrôlées sur l'hypertension. Les mêmes observations ont été rapportées dans une étude clinique contrôlée menée auprès de patients atteints de diabète de type 2 et présentant une protéinurie et une hypertension, dont 248 (33 %) étaient âgés de 65 ans ou plus, ainsi que dans une étude clinique contrôlée menée auprès de patients hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche, dont 2 857 (62 %) étaient âgés de 65 ans ou plus (voir [14 ESSAIS CLINIQUES](#)).

## **8 EFFETS INDÉSIRABLES**

### **8.1 Aperçu des effets indésirables**

L'innocuité de losartan potassique a été évaluée chez plus de 3 300 patients présentant une hypertension essentielle. De ces patients, 2 085 ont été traités avec du losartan en monothérapie dans les études cliniques contrôlées.

Dans des études cliniques menées au su, plus de 1 200 patients ont été traités avec le losartan pendant plus de six mois et plus de 800 patients ont été traités pendant plus de un an.

Dans les études cliniques contrôlées, 2,3 % des patients traités avec losartan potassique et 3,7 % des sujets qui ont reçu le placebo ont dû cesser le traitement en raison d'effets indésirables sur le plan clinique.

Les effets indésirables suivants, susceptibles d'entraîner de graves conséquences, ont rarement été rapportés avec le losartan dans les études cliniques contrôlées : syncope et hypotension.

On n'a pas décelé de différence pertinente entre le profil des effets indésirables chez les enfants et celui rapporté antérieurement chez les adultes.

## 8.2 Effets indésirables observés dans les essais cliniques

Les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières. Les taux d'effets indésirables qui y sont observés ne reflètent pas nécessairement les taux observés en pratique, et ces taux ne doivent pas être comparés aux taux observés dans le cadre d'essais cliniques portant sur un autre médicament. Les informations sur les effets indésirables provenant d'essais cliniques peuvent être utiles pour déterminer et estimer les taux de réactions indésirables aux médicaments lors d'une utilisation réelle.

Dans les études cliniques contrôlées menées à double insu, les effets indésirables qui sont survenus chez  $\geq 1$  % des patients traités avec losartan potassique, indépendamment de la relation avec le médicament, ont été les suivants :

**Tableau 2 – Effets indésirables signalés chez au moins 1 % des patients qui ont reçu losartan potassique**

	losartan potassique n = 2 085 (%)	Placebo n = 535 (%)
<b>Organisme entier</b>		
Asthénie/fatigue	3,8	3,9
Œdème/enflure	1,7	1,9
Douleur abdominale	1,7	1,7
Douleur thoracique	1,1	2,6
<b>Affections cardiaques</b>		
Palpitations	1,0	0,4
Tachycardie	1,0	1,7
<b>Affections gastro-intestinales</b>		
Diarrhée	1,9	1,9
Dyspepsie	1,1	1,5
Nausées	1,8	2,8
<b>Affections musculosquelettiques</b>		
Douleur dorsale	1,6	1,1
Crampes musculaires	1,0	1,1
<b>Affections du système nerveux/psychiatriques</b>		
Étourdissements	4,1	2,4

Céphalées	14,1	17,2
Insomnie	1,1	0,7
<b>Affections respiratoires</b>		
Toux	3,1	2,6
Congestion nasale	1,3	1,1
Pharyngite	1,5	2,6
Troubles des sinus	1,0	1,3
Infection des voies respiratoires supérieures	6,5	5,6

Dans les études cliniques contrôlées sur l'hypertension essentielle, les étourdissements ont constitué le seul effet indésirable attribuable au médicament noté dans plus de 1 % des cas qui a été rapporté à une fréquence plus grande chez les patients traités avec le losartan (2,4 %) que chez les patients ayant reçu un placebo (1,3 %).

Dans une étude clinique contrôlée menée auprès de patients diabétiques (type 2) atteints de protéinurie et d'hypertension, losartan potassique a été généralement bien toléré. Les effets indésirables reliés au médicament les plus fréquemment signalés ont été les suivants : asthénie/fatigue, étourdissements, hypotension et hyperkaliémie (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS](#)). Chez les patients hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche, les effets indésirables reliés au médicament les plus fréquemment signalés ont été les suivants : étourdissements, asthénie/fatigue et vertiges.

Patients hypertendus présentant des antécédents de toux: Dans une étude contrôlée de huit semaines regroupant des patients hypertendus qui avaient été traités au moyen d'un inhibiteur de l'ECA et qui avaient présenté de la toux, la fréquence de cet effet secondaire chez les patients traités avec losartan potassique a été semblable à celle observée chez les sujets qui avaient reçu de l'hydrochlorothiazide, et significativement plus faible que celle signalée chez les patients qui avaient repris un inhibiteur de l'ECA. En outre, les résultats d'une analyse globale de plusieurs études cliniques menées à double insu auprès de 4 131 patients ont révélé que la fréquence de la toux signalée spontanément par les patients traités avec losartan potassique seul (n = 2 085; 3,1 %) ou avec losartan potassique plus de l'hydrochlorothiazide (n = 858; 2,6 %) a été semblable à celle des patients recevant un placebo (n = 535; 2,6 %) ou de l'hydrochlorothiazide seul (n = 271; 4,1 %), alors que la fréquence observée chez les patients qui ont pris un inhibiteur de l'ECA (n = 239) a été de 8,8 %.

### 8.3 Effets indésirables peu courants observés au cours des essais cliniques

Dans les études cliniques contrôlées sur l'hypertension essentielle menées à double insu, les effets indésirables survenus avec losartan potassique à une fréquence inférieure à 1 % indépendamment de la relation avec le médicament ont été les suivants :

Affections cardiaques : troubles orthostatiques

Affections de l'oreille, du nez et de la gorge : épistaxis, acouphène

Affections de la peau : éruptions cutanées  
Affections du système nerveux : somnolence, vertiges  
Affections gastro-intestinales : constipation  
Troubles généraux : malaise

#### **8.4 Résultats de laboratoire anormaux : hématologique, chimie clinique et autres données quantitatives**

##### **Conclusions de l'essai clinique**

Dans les études cliniques contrôlées portant sur l'hypertension essentielle, des anomalies importantes sur le plan clinique concernant les paramètres physiologiques courants ont rarement été associées à l'administration de losartan potassique.

Épreuves de la fonction hépatique: Dans des études cliniques à double insu menées auprès de patients hypertendus, on a constaté des élévations de l'ASAT et de l'ALAT chez 1,1 % et 1,9 %, respectivement, des patients traités avec le losartan en monothérapie et chez 0,8 % et 1,3 %, respectivement, des patients ayant reçu un placebo. Par ailleurs, avec des élévations de l'ASAT et de l'ALAT  $\geq 2$  fois la limite supérieure de la normale, la fréquence s'est révélée semblable à celle observée avec le placebo.

Hyperkaliémie: Dans des études cliniques contrôlées sur l'hypertension essentielle, une hyperkaliémie (taux de potassium sérique  $> 5,5$  mEq/L) a été observée chez 1,5 % des patients traités avec losartan potassique.

Dans une étude clinique menée auprès de patients diabétiques (type 2) atteints de protéinurie et d'hypertension, 9,9 % des patients traités avec losartan potassique et 3,4 % des patients ayant reçu le placebo ont présenté une hyperkaliémie (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Rénal, Hyperkaliémie](#)).

Créatinine, azote uréique sanguin (BUN): On a observé une faible augmentation des taux d'azote uréique sanguin ou de créatinine sérique chez moins de 0,1 % des patients atteints d'hypertension essentielle et traités avec losartan potassique seul. Aucun patient n'a dû interrompre la monothérapie avec losartan potassique en raison d'une élévation des taux d'azote uréique sanguin ou de créatinine sérique.

Hémoglobine et hématocrite: On a noté fréquemment une faible diminution de l'hémoglobine et de l'hématocrite (baisse moyenne d'environ 0,11 g/100 mL et de 0,09 vol/100 mL, respectivement) chez des patients traités avec losartan potassique seul, bien qu'elle ait eu rarement une importance clinique. Dans les études cliniques contrôlées, aucun patient n'a dû interrompre le traitement en raison d'une anémie. L'interruption du traitement avec le losartan à cause d'une anémie a été rapportée après la commercialisation du produit.

Dans les études cliniques, les effets indésirables suivants se sont manifestés à une fréquence < 1 %, indépendamment de la relation avec le médicament : thrombopénie, éosinophilie.

### **8.5 Effets indésirables observés après la mise en marché**

D'autres effets indésirables ont été rapportés rarement au cours d'études au su ou après la commercialisation du produit chez des patients atteints d'hypertension essentielle, indépendamment de la relation avec le médicament, y compris : anémie, thrombopénie (rarement), hépatite, résultats anormaux des tests de la fonction hépatique, vomissements, toux d'origine médicamenteuse, asthénie, diarrhée, migraine, dysgueusie, arthralgie, prurit, érythrodermie, troubles du goût, urticaire, malaise, dysfonction érectile/impuissance et photosensibilité. Des cas de douleur et de faiblesse musculaires, de myosite et de rhabdomyolyse ont été rapportés chez des patients qui avaient reçu des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II.

Des réactions anaphylactiques et un angioœdème (comportant un gonflement du larynx et de la glotte causant une obstruction des voies aériennes ou un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et du pharynx, exigeant dans certains cas de recourir à une intubation ou à une trachéotomie) ont été rarement rapportés chez les patients traités avec le losartan. Certains de ces patients avaient déjà présenté un angioœdème avec des inhibiteurs de l'ECA. Des cas de vascularite, y compris un purpura de Schönlein-Henoch, ont rarement été rapportés.

## **9 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

### **9.1 Interactions médicamenteuses graves**

Chez les patients atteints de diabète de type 1 ou de type 2 ainsi que chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée ou grave (débit de filtration glomérulaire [DFG] < 60 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>), l'utilisation concomitante d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine (ARA), dont AURO-LOSARTAN, ou d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA) avec un médicament contenant de l'alisier est contre-indiquée (voir [Z MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS](#), [Double inhibition du système rénine-angiotensine](#) et [Rénal](#))

### **9.4 Interactions médicament-médicament**

Les médicaments apparaissant dans ce tableau sont fondés sur des exposés de cas ou des études sur les interactions médicamenteuses, ou encore sur les interactions potentielles en raison de l'ampleur ou de la gravité anticipée de l'interaction (ceux qui ont été identifiés comme contre-indiqués).

### **Tableau 3 – Interactions médicament-médicament établies ou potentielles**

Nom propre/nom usuel	Source de preuve	Effet	Commentaire clinique
Agents qui augmentent le taux de potassium sérique <ul style="list-style-type: none"> <li>• diurétiques d'épargne potassique (p. ex., la spironolactone, le triamtérène et l'amiloride)</li> <li>• suppléments potassiques</li> <li>• succédanés du sel contenant du potassium</li> <li>• Autres médicaments susceptibles d'augmenter le taux de potassium sérique (p. ex., des produits qui contiennent du triméthoprim)</li> </ul>	T	Augmentation du taux de potassium sérique	Comme losartan potassique diminue la production d'aldostérone, les diurétiques d'épargne potassique ou les suppléments potassiques ne devraient être administrés qu'en cas d'hypokaliémie avérée et en procédant à de fréquentes évaluations du taux de potassium sérique. Les succédanés du sel contenant du potassium devraient être également utilisés avec précaution.
Dérivés digitaliques	EC	L'effet du losartan sur les paramètres Pharmacocinétiques des glucosides cardiotoniques à l'état d'équilibre n'est pas connu	Dans une étude auprès de 9 volontaires en bonne santé, lorsqu'on a administré par voie orale une dose unique de 0,5 mg de digoxine aux sujets ayant reçu du losartan pendant 11 jours, on a constaté que l'aire sous la courbe et la Cmax de la digoxine, comparativement à celles du placebo, étaient de 1,06 (intervalle de confiance [IC] à 90 %, 0,98-1,14) et de 1,12 (IC à 90 %, 0,97-1,28), respectivement.
Diurétiques	T	Baisse excessive de la tension artérielle après l'initiation	Les patients qui prennent des diurétiques, en particulier ceux qui en prennent depuis peu, peuvent présenter, à l'occasion, une baisse excessive de la tension artérielle après l'administration de la dose initiale d'AURO-LOSARTAN. On

Nom propre/nom usuel	Source de preuve	Effet	Commentaire clinique
			<p>peut réduire les risques d'hypotension symptomatique avec AURO-LOSARTAN si l'on interrompt la prise du diurétique avant le début du traitement ou si l'on diminue la dose initiale de losartan, ou si l'on applique ces deux mesures simultanément (voir <a href="#">4 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION</a> et <a href="#">7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire, Hypotension</a>).</p> <p>Aucune interaction médicamenteuse importante sur le plan clinique n'a été observée avec les diurétiques thiazidiques.</p>
<p>Médicaments qui influent sur le système cytochrome P450</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rifampine</li> <li>• kétoconazole</li> <li>• fluconazole</li> </ul>	EC	<p>Pharmacodynamique les conséquences de utilisation concomitante de losartan et les inhibiteurs de P450 2C9 n'ont pas été examinés</p>	<p>La rifampine, un inducteur du métabolisme des médicaments, diminue les concentrations du métabolite actif du losartan. Deux inhibiteurs de l'iso enzyme 3A4 du cytochrome P450 ont été étudiés chez l'homme. Le kétoconazole n'a pas affecté la conversion du losartan en son métabolite actif après l'administration intraveineuse de losartan, et l'érythromycine n'a pas exercé d'effet significatif sur le plan clinique après l'administration orale de losartan. Le fluconazole, un inhibiteur de l'iso enzyme 2C9 du cytochrome P450, a réduit la concentration du métabolite actif.</p> <p>On n'a pas évalué les conséquences pharmacodynamiques de l'administration</p>

Nom propre/nom usuel	Source de preuve	Effet	Commentaire clinique
			<p>concomitante du losartan et des inhibiteurs de l'iso enzyme 2C9 du cytochrome P450.</p> <p>Lorsqu'on a administré une dose unique de losartan à 10 volontaires masculins en bonne santé recevant en même temps du phénobarbital, un inducteur du cytochrome P450 dont les concentrations se situaient à l'état d'équilibre, l'aire sous la courbe du losartan a été de 0,80 (IC à 90 %, 0,72-0,88) par rapport aux valeurs de départ, et l'aire sous la courbe du métabolite actif, E-3174, a été de 0,80 (IC à 90 %, 0,78-0,82).</p> <p>Lorsqu'on a administré une dose unique de losartan à 8 volontaires masculins en bonne santé recevant en même temps de la cimétidine, un inhibiteur du cytochrome P450 dont les concentrations se situaient à l'état d'équilibre, l'aire sous la courbe du losartan a été de 1,18 (IC à 90 %, 1,10-1,27) par rapport aux valeurs de départ, et l'aire sous la courbe du métabolite actif, E-3174, a été de 1,00 (IC à 90 %, 0,92-1,08).</p>
Double inhibition du système rénine-angiotensine au moyen d'IECA, d'ARA ou de médicaments contenant de l'aliskiren	T	Survenue d'effets indésirables	La double inhibition du système rénine-angiotensine au moyen d'ARA, d'IECA ou de médicaments contenant de l'aliskiren est contre-indiquée chez les patients présentant un diabète ou une insuffisance

Nom propre/nom usuel	Source de preuve	Effet	Commentaire clinique
			<p>rénale et n'est recommandée chez aucun autre type de patients, car il est impossible d'exclure la survenue d'effets indésirables (voir <a href="#">2 CONTREINDICATIONS</a> et <a href="#">7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Double inhibition du système rénine-angiotensine</a>).</p>
Sels de lithium	T	Possible réduction de l'excrétion du lithium	<p>Comme c'est le cas avec d'autres médicaments qui affectent l'excrétion du sodium, il se peut que l'excrétion du lithium soit réduite.</p> <p>Par conséquent, on doit surveiller avec beaucoup d'attention le taux sérique de lithium si l'on administre des sels de lithium et des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II de façon concomitante.</p>
Anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris les inhibiteurs de la cyclo-oxygénase-2	EC	Atténuation de l'effet des diurétiques et des autres antihypertenseurs	<p>Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'indométhacine et les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (inhibiteurs de la COX-2), peuvent atténuer l'effet des diurétiques et des autres antihypertenseurs. Par conséquent, l'effet antihypertensif des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ou des inhibiteurs de l'ECA peut être atténué par les AINS, y compris les inhibiteurs sélectifs de la COX-2.</p> <p>Chez certains patients qui présentent une atteinte de la fonction rénale (p. ex., patients</p>

Nom propre/nom usuel	Source de preuve	Effet	Commentaire clinique
			âgés ou présentant une hypovolémie, y compris ceux qui prennent des diurétiques) et qui suivent un traitement avec un AINS, y compris un inhibiteur sélectif de la COX-2, l'administration concomitante d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II ou d'un inhibiteur de l'ECA peut entraîner une détérioration plus marquée de la fonction rénale. Des cas d'insuffisance rénale aiguë, généralement réversibles, ont été rapportés. Par conséquent, on doit user de prudence lorsqu'on administre conjointement de tels médicaments dans cette population de patients.
Warfarine	EC	L'effet du losartan sur les paramètres pharmacocinétiques de la warfarine à l'état d'équilibre n'est pas connu	Administré sur une période de 7 jours, le losartan n'a pas affecté la pharmacocinétique ni la pharmacodynamie de la warfarine administrée en dose unique.

Légende : EC = essai clinique;

T = théorique

### 9.5 Interactions médicament-aliment

AURO-LOSARTAN peut être administré avec ou sans aliments.

Le jus de pamplemousse contient une substance qui inhibe le cytochrome P450 et qui peut entraîner une réduction des concentrations du métabolite actif d'AURO-LOSARTAN et ainsi réduire son effet thérapeutique. Il faut éviter de consommer du jus de pamplemousse pendant le traitement avec AURO-LOSARTAN.

## 9.6 Interactions médicament-plante médicinale

Aucune interaction avec des produits à base de plantes médicinales n'a été établie.

## 9.7 Interactions médicament-tests de laboratoire

Aucune preuve selon laquelle le médicament nuirait aux épreuves de laboratoire n'a été établie.

# 10 PHARMACOLOGIE CLINIQUE

## 10.1 Mode d'action

Losartan potassique s'oppose aux effets de l'angiotensine II en bloquant les récepteurs de type 1 (AT1) de l'angiotensine.

L'angiotensine II est la principale hormone vasoactive du système rénine-angiotensine. Elle produit une vasoconstriction et stimule la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien.

Le losartan et son métabolite actif, E-3174, bloquent l'effet vasoconstricteur de l'angiotensine II et la libération d'aldostérone régie par cette hormone en inhibant de façon sélective la fixation de l'angiotensine II aux récepteurs AT1 présents dans de nombreux tissus, y compris le muscle lisse vasculaire. Un autre récepteur de l'angiotensine II, le sous-type AT2, a été mis en évidence, mais, selon les connaissances actuelles, ne semble pas intervenir dans l'homéostasie cardiovasculaire. Tant le losartan que son métabolite actif sont dépourvus d'activité agoniste au site du récepteur AT1, et ils possèdent une affinité beaucoup plus grande (environ 1 000 fois) pour le récepteur AT1 que pour le récepteur AT2. Les résultats d'études *in vitro* portant sur la liaison aux récepteurs indiquent que le losartan lui-même exerce un antagonisme compétitif réversible au site du récepteur AT1, alors que le métabolite actif, qui est 10 à 40 fois plus puissant que le losartan, exerce un effet antagoniste non compétitif et réversible au site du récepteur AT1.

Ni le losartan ni son métabolite actif n'inhibent l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA), également connue sous le nom de kininase II, l'enzyme responsable de la conversion de l'angiotensine I en angiotensine II et de la dégradation de la bradykinine. Ils ne se lient pas non plus à d'autres récepteurs hormonaux ou aux canaux ioniques, ni ne bloquent ces structures qui jouent un rôle important dans la régulation cardiovasculaire.

## 10.2 Pharmacodynamie

Le losartan inhibe l'effet vasopresseur de l'angiotensine II. À une dose de 100 mg, l'inhibition maximale est d'environ 85 %, et l'effet inhibiteur persiste pendant 24 heures à un taux de 25 % à 40 %. La suppression de la rétroaction négative de l'angiotensine II entraîne une

hausse de l'activité rénine plasmatique (2 à 3 fois les valeurs de départ) et une hausse consécutive de la concentration plasmatique d'angiotensine II chez les patients hypertendus.

Après administration orale d'une dose unique de losartan, la réduction maximale de la tension artérielle est atteinte en 6 heures environ chez les patients hypertendus.

Dans les études cliniques contrôlées, on n'a constaté aucune modification significative de la fréquence cardiaque chez les patients traités avec le losartan.

On n'a pas observé d'effet rebond lorsqu'on a interrompu brusquement un traitement avec le losartan.

La réponse de la tension artérielle à la suite d'une monothérapie avec le losartan est plus faible en moyenne chez les patients hypertendus de race noire que chez les autres patients hypertendus.

### 10.3 Pharmacocinétique

**Tableau 4 – Résumé des paramètres pharmacocinétiques du losartan à la suite de l'administration de doses multiples chez des adultes hypertendus ayant reçu 50 mg une fois par jour pendant 7 jours (n = 12)**

	$C_{\max}$ (ng/mL) <sup>a</sup>	$T_{\max}$ <sup>c</sup>	$t_{1/2}$ (h) <sup>b</sup>	$ASC_{0-24}$ h <sup>a</sup> (ng•h/mL)	$Cl_{\text{rénale}}$ (mL/min) <sup>a</sup>
Molécule mère	224 ± 82	0,9	2,1 ± 0,70	442 ± 173	56±23
Métabolite actif	212 ± 73	3,5	7,4 ± 2,4	1 685 ± 452	20±3

<sup>a</sup> Moyenne ± écart type

<sup>b</sup> Moyenne harmonique ± écart type

<sup>c</sup> Valeur médiane

#### **Absorption:**

Après une administration orale, le losartan est bien absorbé et sa biodisponibilité dans la circulation générale est d'environ 33 %. Environ 14 % d'une dose de losartan administrée par voie orale est convertie sous forme de métabolite actif bien que, chez environ 1 % des sujets, cette conversion ne se soit pas effectuée de façon efficace.

La concentration maximale moyenne du losartan est atteinte en 1 heure environ et celle de son métabolite actif, en 3 à 4 heures approximativement. Les concentrations plasmatiques maximales du losartan et de son métabolite actif sont à peu près équivalentes, mais l'aire sous la courbe du métabolite est environ 4 fois plus grande que celle du losartan.

**Distribution:**

Le losartan et son métabolite actif se lient tous deux fortement aux protéines plasmatiques, principalement à l'albumine; les fractions plasmatiques libres sont de 1,3 % et 0,2 %, respectivement. La liaison aux protéines plasmatiques est constante dans l'intervalle des concentrations atteintes avec les doses recommandées. Selon des études menées chez le rat, le losartan ne traverse pratiquement pas, ou pas du tout, la barrière hémato-encéphalique.

Le volume de distribution du losartan est d'environ 34 litres et celui de son métabolite actif, d'environ 12 litres.

**Métabolisme:**

Le losartan est une substance active, administrée par voie orale, qui subit un métabolisme de premier passage important au niveau du système enzymatique du cytochrome P450. Il est converti, en partie, en un acide carboxylique (E-3174), qui est le métabolite actif en majorité responsable de l'antagonisme au niveau du récepteur de l'angiotensine II après l'administration orale du losartan.

Plusieurs métabolites du losartan ont été décelés dans le plasma et dans l'urine chez l'humain. En plus du métabolite actif sous forme d'acide carboxylique (E-3174), il existe plusieurs métabolites inactifs. Des études *in vitro* indiquent que les iso enzymes 2C9 et 3A4 du cytochrome P450 participent à la biotransformation du losartan en ses métabolites.

**Élimination:**

La demi-vie terminale du losartan est d'environ 2 heures et celle de son métabolite actif se situe entre 6 et 9 heures. La pharmacocinétique du losartan et celle de son métabolite actif sont linéaires pour des doses orales de losartan pouvant atteindre 200 mg et demeurent inchangées avec le temps. On n'observe pas d'accumulation du losartan ni de son métabolite dans le plasma à la suite de l'administration répétée de doses mono quotidiennes.

La clairance plasmatique totale du losartan est d'environ 600 mL/min, dont environ 75 mL/min correspondent à la clairance rénale. La clairance plasmatique totale du métabolite actif est d'environ 50 mL/min, dont environ 25 mL/min correspondent à la clairance rénale. L'élimination du losartan et de ses métabolites se fait en grande partie à la fois par la bile et par l'urine.

À la suite de l'administration orale d'une dose de losartan marqué au <sup>14</sup>C, environ 35 % de la radioactivité a été retrouvée dans l'urine et environ 60 % dans les fèces. À la suite de l'administration intraveineuse d'une dose de losartan marqué au <sup>14</sup>C, environ 45 % de la radioactivité a été retrouvée dans l'urine et 50 % dans les fèces.

## Populations et états pathologiques particuliers

- **Enfants :**

Les paramètres pharmacocinétiques du losartan et de son métabolite actif ont été généralement similaires dans tous les groupes d'âge étudiés et concordent avec les données pharmacocinétiques historiques chez les adultes.

**Tableau 5 – Résumé des paramètres pharmacocinétiques du losartan à la suite de l'administration de doses multiples chez des sujets hypertendus regroupant nourrissons et jeunes enfants (groupe I : 3 à 23 mois), enfants d'âge préscolaire (groupe II : 2 à 5 ans), enfants d'âge scolaire (groupe III : 6 à 11 ans) et adolescents (groupe IV : 12 à 15 ans)**

	Molécule mère	Métabolite actif
<b>ASC<sub>0-24 h</sub> observée (ng•h/mL)<sup>a</sup></b>		
Groupe I (n = 9)	244,5 ± 175,7	1456,5 ± 1 422,7
Groupe II (n = 12) <sup>†</sup>	314,5 ± 177,8	950,9 ± 498,0
Groupe III (n = 11)	251,0 ± 265,6	1 163,6 ± 1 017,5
Groupe IV (n = 14)	303,1 ± 123,6	1 589,9 ± 996,2
<b>ASC<sub>0-24 h</sub> par 0,7 mg/kg<sup>a</sup></b>		
Groupe I (n = 9)	246,1 ± 154,0	1 466,3 ± 1 498,8
Groupe II (n = 13)	305,2 ± 164,9	933,2 ± 510,5
Groupe III (n = 11)	232,6 ± 199,4	1 078,0 ± 783,4
Groupe IV (n = 14)	405,4 ± 120,3	2 126,8 ± 1 082,4
<b>C<sub>max</sub> observée (ng/mL)<sup>a</sup></b>		
Groupe I (n = 9)	66,6 ± 103,6	146,9 ± 179,5
Groupe II (n = 12) <sup>†</sup>	89,8 ± 96,5	91,5 ± 75,2
Groupe III (n = 11)	98,7 ± 94,5	139,1 ± 148,1
Groupe IV (n = 14)	105,1 ± 112,3	188,2 ± 91,2
<b>C<sub>max</sub> par 0,7 mg/kg<sup>a</sup></b>		
Groupe I (n = 9)	67,0 ± 92,8	147,9 ± 190,6
Groupe II (n = 13)	89,5 ± 88,3	92,0 ± 77,6
Groupe III (n = 11)	91,4 ± 81,7	128,8 ± 112,1
Groupe IV (n = 14)	140,6 ± 90,5	251,7 ± 118,2
<b>T<sub>max</sub> (h)<sup>c</sup></b>		
Groupe I (n = 9)	1,05 ± 1,38	5,53 ± 2,0
Groupe II (n = 13)	1,07 ± 1,43	6,01 ± 1,5
Groupe III (n = 11)	2,03 ± 1,79	4,46 ± 2,1
Groupe IV (n = 14)	1,54 ± 1,27	5,00 ± 1,0
<b>Demi-vie (h)<sup>b</sup></b>		
Groupe I (n = 9)	1,93 ± 0,44	4,83 ± 1,1
Groupe II (n = 13)	2,37 ± 1,24	5,59 ± 1,1
Groupe III (n = 11)	2,18 ± 1,50	5,37 ± 1,4
Groupe IV (n = 14)	2,41 ± 1,84	5,72 ± 1,0

<sup>a</sup> Moyenne géométrique ± écart type

<sup>b</sup> Moyenne harmonique ± écart type

<sup>c</sup> Valeur médiane ± écart type

<sup>†</sup> n = 12 : exclut AN 4051 qui a reçu une dose correspondant à 2,5 fois la dose prévue

Une étude pharmacocinétique a été menée en vue d'estimer les paramètres pharmacocinétiques plasmatiques et urinaires du losartan et de son métabolite actif, E-3174, chez les nourrissons et les jeunes enfants, les enfants d'âge préscolaire, les enfants d'âge scolaire et les adolescents.

Dans cette étude, les paramètres pharmacocinétiques du losartan et de son métabolite actif, E-3174, étaient comparables dans tous les groupes d'âge étudiés. On a observé des différences significatives du point de vue statistique pour certains paramètres, en particulier ceux du métabolite actif, E-3174, lorsque les données des enfants d'âge préscolaire ont été comparées à celles des adolescents. Il est important de noter que les données des patients les plus jeunes étaient comparables à celles des enfants plus âgés et que le métabolite actif, E-3174, a été formé à partir du losartan dans tous les groupes d'âge étudiés.

Santé Canada n'a pas autorisé d'indication d'utilisation chez les enfants âgés de moins de 6 ans.

- **Patients présentant une cirrhose alcoolique légère ou modérée**

la suite de l'administration orale de losartan potassique chez des patients présentant une cirrhose alcoolique légère ou modérée, l'aire sous la courbe du losartan et celle de son métabolite actif E-3174 ont été environ 5 fois et 1,7 fois, respectivement, plus grandes que celles observées chez des jeunes volontaires masculins en bonne santé. Chez des patients atteints d'insuffisance hépatique, la clairance plasmatique totale du losartan a été environ 50 % plus faible que chez les hommes jeunes en bonne santé, et la biodisponibilité du médicament après l'administration orale a été environ deux fois plus élevée.

## **11 STOCKAGE, STABILITÉ ET ÉLIMINATION**

Conserver à température ambiante entre 15 et 30 °C.

## **12 INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES DE MANIPULATION**

Il n'y a pas d'exigences particulières à respecter en ce qui a trait à l'utilisation ou à la manipulation de ce produit.

## PARTIE II : INFORMATION SCIENTIFIQUE

### 13 INFORMATION PHARMACEUTIQUE

#### Substance pharmaceutique

Nom propre : losartan potassique

Nom chimique : 1H-imidazole-5-méthanol, 2-Butyl-4-Chloro-1-[[2'-(1H-Tétrazol-5-yl)][1,1'-biphényl-4-yl]Methyl]-, sel monopotassique.


OU

2-Butyl-4-chloro-1[p-(o-1H-tétrazol-5-ylphényl) benzyl] imidazole-5-méthanol potassique.

Formule moléculaire :  $C_{22}H_{22}ClN_6OK$

Masse moléculaire : 461,00

Formule structurale :



Propriétés physico-chimiques : Le losartan potassique est une poudre cristalline blanche. Il est librement soluble dans l'eau, soluble dans les alcools et légèrement soluble dans les solvants organiques courants, tels que l'acétonitrile et la méthyléthylcétone.

### 14 ESSAIS CLINIQUES

#### 14.1 Essais cliniques par indication

##### Hypertension chez les adultes

Tableau 6 – Résumé des caractéristiques démographiques des adultes hypertendus dans les études cliniques à double insu et contrôlées par placebo

N <sup>o</sup> de l'étude	Protocole	Posologie, voie d'administration et durée	Sujets (n = nombre)	Âge moyen (limites)	Sexe (%)
011	Étude à double insu, avec répartition	Administration orale, 1 f.p.j. Groupes de traitement : Losartan 10, 25, 50, 100, 150	576	53,1 ans (22 à 88 ans)	Hommes : 66 Femmes :

N <sup>o</sup> de l'étude	Protocole	Posologie, voie d'administration et durée	Sujets (n = nombre)	Âge moyen (limites)	Sexe (%)
	aléatoire, en mode parallèle, contrôlée par placebo	mg Énalapril 20 mg et placebo du losartan Durée : 8 semaines de traitement à double insu			34
<b>021</b>	Étude à double insu, avec répartition aléatoire, en mode parallèle, contrôlée par placebo	Administration orale, 1 ou 2 f.p.j. Groupes de traitement : U Losartan 50 mg 1 f.p.j. \] Losartan 100 mg 1 f.p.j. U Losartan 50 mg 2 f.p.j. U Placebo du losartan UDurée : 4 semaines de monothérapie à double insu	122	53,5 ans (28 à 76 ans)	Hommes : 68 Femmes : 32
<b>050</b>	Étude à double insu, avec répartition aléatoire, en mode parallèle, contrôlée par placebo	Administration orale, 1 f.p.j. UGroupes de traitement : Placebo Losartan 50 mg/placebo Losartan 50 mg/losartan 100 mg (possibilité d'augmenter la dose du losartan à 100 mg après 6 semaines) UDurée : 12 semaines de traitement à double insu	366	54 ans (26 à 78 ans)	Hommes : 64 Femmes : 36
<b>054</b>	Étude à double insu, avec répartition aléatoire, en mode parallèle, contrôlée par placebo	Administration orale, 1 f.p.j. Groupes de traitement : Placebo Losartan 50 mg HCTZ 12,5 mg Losartan 50 mg/HCTZ 6,25 mg Losartan 50 mg/HCTZ 12,5 mg UDurée : 12 semaines de traitement à double insu	703	52,8 ans (21 à 79 ans)	Hommes : 60 Femmes : 40
<b>065</b>	Étude à double insu, avec répartition aléatoire, en mode parallèle, contrôlée par placebo	Administration orale, 1 ou 2 f.p.j. Placebo Losartan 25 mg 1 f.p.j. Losartan 50 mg 1 f.p.j. Losartan 25 mg 2 f.p.j. UDurée: 12 semaines de traitement à double insu	428	54 ans (24 à 79 ans)	Hommes : 65 Femmes : 35

f.p.j. = fois par jour;  
HCTZ = hydrochlorothiazide

Les effets antihypertensifs de losartan potassique ont été démontrés principalement dans cinq études contrôlées par placebo d'une durée de 6 à 12 semaines (études 011, 021, 050, 054 et 065) utilisant des posologies de 10 à 150 mg par jour administrées à des patients dont la tension artérielle diastolique de départ se situait entre 95 et 115 mmHg. Ces études ont permis de comparer deux posologies (50-100 mg/jour) à raison d'une ou deux fois par jour, l'effet maximal et l'effet minimal et la réponse en fonction du sexe, de l'âge et de la race.

L'analyse des sous groupes de patients selon l'âge, le sexe et la race a montré que les hommes et les femmes ainsi que les patients de 65 ans et plus et ceux de moins de 65 ans ont généralement des réponses similaires. L'effet de losartan potassique a été légèrement moins prononcé chez les patients de race noire (une population qui présente généralement un faible taux de rénine).

L'effet du losartan est substantiel dès la première semaine du traitement, mais dans certaines études, l'effet maximal n'a été observé qu'après 3 à 6 semaines.

**Tableau 7 – Résultats relatifs à l'efficacité du losartan par rapport au placebo dans des études contrôlées menées à double insu auprès de patients ambulatoires adultes hypertendus**

N <sup>o</sup> de l'étude	Traitement (posologie en mg)	TAD moyenne initiale (É.T.) mmHg	Variation moyenne ajustée de la TAD	vs placebo	Paramètre d'efficacité (durée)
<b>011</b>	Placebo	103,3 (3,8)	- 5,3	-	TADdéc. (8 semaines)
	Losartan 25 mg 1 f.p.j.	103,3 (3,7)	- 6,4	NS	
	Losartan 50 mg 1 f.p.j.	104,1 (3,7)	-10,1	**	
	Losartan 100 mg 1 f.p.j.	104,1 (4,3)	- 9,9	**	
<b>021</b>	Placebo	100,3 (3,6)	- 2,1	-	TADass. (4 semaines)
	Losartan 50 mg 1 f.p.j.	100,0 (4,6)	- 6,7	*	
	Losartan 100 mg 1 f.p.j.	101,1 (4,8)	- 9,7	**	
	Losartan 50 mg 2 f.p.j.	101,4 (4,7)	- 8,6	**	
<b>021</b>	Placebo	94,8 (5,9)	- 0,8	-	SATA 24 h TAD moyenne (4
	Losartan 50 mg 1 f.p.j.	94,0 (6,9)	-	**	

			5,6		semaines)
	Losartan 100 mg 1 f.p.j.	93,8 (6,0)	-	**	
	Losartan 50 mg 2 f.p.j.	94,4 (6,9)	7,1	**	
			-		
			9,0		
<b>050</b>	Placebo	101,3 (4,9)	-	-	TADass. (12 semaines)
			4,5		
	Losartan 50 mg 1 f.p.j.	102,1 (5,1)	-	**	
			7,9		
	Losartan 50/100 mg 2 f.p.j.	102,2 (5,0)	-8,6	**	
<b>054</b>	Placebo	101,3 (5,3)	-	-	TADass. (12 semaines)
			4,0		
	Losartan 50 mg 1 f.p.j.	100,9 (5,0)	-	**	
			9,0		
<b>065</b>	Placebo	101,3 (5,1)	-	-	TADass. (12 semaines)
			2,1		
	Losartan 25 mg 1 f.p.j.	101,8 (5,5)	-	**	
			5,9		
	Losartan 50 mg 1 f.p.j.	102,3 (6,3)	-	**	
			6,6		

NS Différence non significative sur le plan statistique

\* Différence significative sur le plan statistique,  $p \leq 0,05$

\*\* Différence significative sur le plan statistique,  $p \leq 0,01$

TADass. : tension artérielle diastolique en position assise

TADdéc. : tension artérielle diastolique en décubitus

SATA : Surveillance ambulatoire de la tension artérielle

f.p.j. : fois par jour

### Patients atteints de diabète de type 2 et présentant une protéinurie et une hypertension (étude RENAAL)

**Tableau 8 – Résumé des caractéristiques démographiques des patients hypertendus présentant un diabète de type 2 et une protéinurie dans les études cliniques menées à double insu et contrôlées par placebo**

No de l'étude	Protocole	Posologie, voie d'administration et durée	Sujets (n = nombre)	Âge moyen (limites)	Sexe
<b>147 RENAAL</b>	Étude multinationale, à double insu, avec	Administration orale	1 513	60 ans (31 à 74 ans)	Hommes : 956 (31 à 74 ans)

	répartition aléatoire, contrôlée par placebo (traitement anti hyper tensif traditionnel excluant les inhibiteurs de l'ECA et les antagonistes de l'All)	Losartan 50 mg, 1 fois par jour et augmentation de la dose du losartan jusqu'à 100 mg  Placebo correspondant  Durée : Suivi moyen de 3,4 ans			Femmes : 557 (34 à 73 ans)
--	---	--	--	--	----------------------------

L'étude RENAAL (Reduction of Endpoints in Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus [NIDDM] with the Angiotensin II Receptor Antagonist Losartan) était une vaste étude multicentrique, menée à l'échelle internationale, à double insu, avec répartition aléatoire et contrôlée par placebo, auprès de 1 513 patients hypertendus présentant un diabète de type 2 et une protéinurie (751 ont reçu losartan potassique). Le but de l'étude était de démontrer les effets protecteurs de losartan potassique sur la fonction rénale indépendamment des bienfaits du médicament sur la maîtrise de la tension artérielle. En vue d'atteindre cet objectif, l'étude avait été conçue de façon à obtenir une maîtrise équivalente de la tension artérielle dans les deux groupes. Les patients présentant une protéinurie et un taux de créatinine sérique compris entre 1,3 et 3,0 mg/dL ont été répartis au hasard et ont reçu soit losartan potassique à la dose de 50 mg, une fois par jour, augmentée en fonction de la réponse de la tension artérielle, soit un placebo, en plus d'un traitement antihypertensif traditionnel excluant les inhibiteurs de l'ECA et les antagonistes de l'angiotensine II. Les investigateurs ont été informés d'augmenter la dose du médicament à l'étude à 100 mg, une fois par jour, dans les cas appropriés; 72 % des patients ont pris la dose quotidienne de 100 mg pendant la plus grande partie du traitement avec le médicament à l'étude. D'autres antihypertenseurs (diurétiques, bloqueurs des canaux calciques, alpha-bloquants et bêta-bloquants ou médicaments à action centrale) pouvaient être ajoutés au traitement dans les deux groupes selon les besoins. Les patients ont été suivis pendant environ 5 ans (moyenne de 3,4 ans).

Les principaux critères d'admission de l'étude RENAAL étaient les suivants : diabète de type 2 défini comme : 1) un diabète diagnostiqué après l'âge de 30 ans, 2) pas de prise d'insuline durant les 6 mois suivant le diagnostic et 3) pas d'antécédents d'acidocétose. Les patients devaient être âgés de 31 à 70 ans, devaient présenter un taux de créatinine sérique entre 1,3 mg/dL (1,5 pour les hommes de plus de 60 kg) et 3,0 mg/dL, ainsi qu'un rapport albumine:créatinine des premières urines du matin  $\geq$  300 mg/g (ou une protéinurie > 500 mg/24 h). Les patients pouvaient être normotendus ou hypertendus.

Les principaux critères d'exclusion de l'étude RENAAL comprenaient le diabète de type 1, des antécédents d'insuffisance cardiaque, des antécédents d'infarctus du myocarde ou un pontage aortocoronarien au cours du dernier mois précédant l'étude, un accident vasculaire cérébral ou

une angioplastie coronarienne transluminale percutanée dans les 6 mois précédant l'étude ou un accident ischémique transitoire au cours de l'année précédant l'étude, des antécédents connus ou un diagnostic récent de néphropathie non diabétique comme une glomérulonéphrite chronique ou une polykystose rénale, et un diabète non maîtrisé ( $HbA_{1c} > 12\%$ ).

**Tableau 9 – Résultats de l'étude RENAAL contrôlée par placebo et menée à double insu chez des patients hypertendus présentant un diabète de type 2 et une protéinurie exposés au losartan, un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II**

Paramètre	Groupe losartan (n = 751)		Groupe placebo (n = 762)		p	Réduction du risque % (IC à 95 %)
	Nbre	%	Nbre	%		
<b>Paramètre principal composé*</b>	327	(43,5)	359	(47,1)	0,022	16,1 (2 à 28)
<b>Augmentation du simple au double de la concentration de créatinine sérique</b>	162	(21,6)	198	(26,0)	0,006	25,3 (8 à 39)
<b>Insuffisance rénale au stade terminal</b>	147	(19,6)	194	(25,5)	0,002	28,6 (11 à 42)
<b>Décès</b>	158	(21,0)	155	(20,3)	0,884	-1,7 (-27 à 19)

\* Le paramètre principal correspondait au temps écoulé avant la survenue du premier événement parmi les suivants : augmentation du simple au double de la concentration de créatinine sérique, insuffisance rénale au stade terminal (nécessitant une dialyse ou une transplantation rénale) ou décès.

Le paramètre principal de l'étude regroupait les éléments suivants : augmentation du simple au double de la concentration de créatinine sérique, insuffisance rénale au stade terminal (nécessitant le recours à une hémodialyse ou à une transplantation rénale) ou décès. Les résultats de l'étude ont montré que le traitement avec losartan potassique (327 événements, 43,5 %) comparativement au placebo (359 événements, 47,1 %) a entraîné une réduction de 16,1 % du risque de survenue des événements composant le paramètre principal ( $p = 0,022$ ). Pour ce qui est des composantes individuelles du paramètre principal, les résultats ont également montré une réduction significative du risque chez les patients traités avec losartan potassique comparativement au placebo, soit de 25,3 % pour l'augmentation du simple au double de la concentration de créatinine sérique (21,6 % vs 26,0 %,  $p = 0,006$ ) et de 28,6 % pour l'insuffisance rénale au stade terminal (19,6 % vs 25,5 %,  $p = 0,002$ ). Aucune différence significative n'a été observée entre le groupe losartan et le groupe placebo (21,0 % et 20,3 %, respectivement) quant à la mortalité toutes causes.

Les paramètres secondaires de l'étude étaient les suivants : variation de la protéinurie, évolution de la néphropathie et événements regroupés de morbidité et de mortalité cardiovasculaires (hospitalisation pour insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, revascularisation, accident vasculaire cérébral, hospitalisation pour angor instable ou décès d'origine cardiovasculaire). Pour ce qui est de la variation de la protéinurie, les résultats ont montré une réduction moyenne de 34,3 % dans le groupe de patients traités avec losartan potassique ( $p < 0,001$ ) au cours d'une période moyenne de 3,4 ans. En ce qui concerne l'évolution de la néphropathie, le traitement avec losartan potassique a entraîné une réduction de 13,9 % de la détérioration de la fonction rénale ( $p = 0,01$ ) durant la phase de traitement, calculée d'après la valeur inverse de la créatinine sérique.

Dans cette étude, losartan potassique a été généralement bien toléré, comme en témoigne le taux d'abandon du traitement en raison d'événements indésirables qui est semblable à celui observé avec le placebo. L'étude comportait un paramètre tertiaire, soit l'évaluation de la qualité de vie. Les résultats de cette analyse permettent de supposer qu'il n'y a eu aucune différence entre les deux groupes quant à la qualité de vie.

Enfants atteints d'hypertension

**Tableau 10 – Résumé des caractéristiques démographiques des patients dans une étude à double insu évaluant la réponse en fonction de la dose du losartan chez des enfants présentant une hypertension diastolique**

No de l'étude	Protocole	Posologie, voie d'administration et durée	Sujets (n = nombre)	Âge moyen (limites)	Sexe
<b>227</b>	Étude à double insu, avec répartition aléatoire, évaluant la réponse en fonction de la dose du losartan chez des enfants présentant une hypertension diastolique	Administration orale, 1 fois par jour  Losartan 2,5 mg, 25 mg ou 50 mg pour les patients pesant < 50 kg  Losartan 5 mg, 50 mg ou 100 mg pour les patients pesant ≥ 50 kg  Durée : 3 semaines de traitement à double insu	177	12 ans  (6 à 16 ans)	Garçons : 99  Filles : 78

Dans une étude clinique auprès de 177 enfants hypertendus âgés de 6 à 16 ans, les sujets dont le poids se situait entre  $\geq 20$  kg et  $< 50$  kg ont reçu une dose quotidienne de losartan de 2,5, 25 ou 50 mg et ceux dont le poids était  $\geq 50$  kg ont reçu une dose quotidienne de losartan de 5, 50 ou 100 mg. L'administration monoquotidienne de losartan a entraîné une réduction de la

tension artérielle diastolique lors de l'effet minimal qui était proportionnelle à la dose. La réponse en fonction de la dose a été observée dans tous les sous-groupes (p. ex., âge, classification de Tanner, sexe et race). L'évaluation de la réponse en fonction de la dose moyenne ajustée en fonction du poids indique qu'une dose de départ de losartan de 0,75 mg/kg (jusqu'à 50 mg) une fois par jour est appropriée. Cependant, les doses évaluées les plus faibles, soit 2,5 mg et 5 mg, correspondant à une posologie quotidienne moyenne de 0,07 mg/kg, n'ont pas semblé procurer un effet antihypertensif cohérent. Dans cette étude, losartan potassique à des doses pouvant atteindre une posologie moyenne quotidienne de 1,44 mg/kg (maximum de 100 mg) une fois par jour a été généralement bien toléré chez les enfants hypertendus.

**Tableau 11 – Résultats de l'étude de la réponse en fonction de la dose de losartan chez des enfants : Résumé des réponses à la dose ajustée en fonction du poids (analyse selon l'intention de traiter)**

Dose	N	Jour 1	Jour 15	Jour 22	Variation moyenne (jour 15 – jour 1) [É.T.]	Variation moyenne (jour 22 – jour 1) [É.T.]	IC à 95 % pour la variation moyenne (jour 22 – jour 1)	
		(TAD en position assise en mmHg)	(TAD en position assise en mmHg)	(TAD en position assise en mmHg)				
Faible (2,5/5 mg)	70	87,92	80,80	81,91	-7,12 (6,47)	-6,01 (7,61)	-7,82,	4,19
Moyenne (25/50 mg)	40	89,38	78,40	77,73	-10,98 (8,66)	-11,65 (9,08)	-14,55,	-8,75
Élevée (50/100 mg)	64	88,80	78,56	76,59	-10,24 (9,14)	-12,21 (8,86)	-14,42,	-10,00

N = Patients pour lesquels on avait des mesures au départ (jour 1) et après l'instauration du traitement É.T. = Écart type

Variation moyenne = Mesure au jour 15 (ou 22) moins mesure au jour 1 IC = Intervalle de confiance

TAD = tension artérielle diastolique

Dans l'ensemble, on n'a pas décelé de différences significatives quant à l'effet antihypertensif du losartan lorsque les patients ont été évalués selon l'âge (< 12 ans et ≥ 12 ans) ou le sexe. Bien qu'on ait observé une réduction de la tension artérielle chez tous les groupes raciaux évalués, le nombre d'enfants de race autre que la race blanche inscrits à l'étude était trop faible pour qu'on puisse comparer la réponse en fonction de la dose dans les sous-groupes raciaux autres que la race blanche.

**Étude LIFE (*Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension*) menée chez des patients présentant une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) confirmée à l'ECG**

**Tableau 12 – Résumé des caractéristiques démographiques des patients dans une étude à double insu comparant le traitement à base de losartan potassique au traitement à base d'aténolol chez des patients hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) confirmée à l'ECG**

No d'étude	Conception de l'étude	Posologie, voie d'administration et durée	Nombre de sujets (n)	Âge moyen (Tranche)	Sexe
P925C1 (« LIFE »)	Étude à double insu comparant des traitements comportant la prise de losartan potassique à celle de l'aténolol chez des patients hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) confirmée à l'ECG	Administration Orale Patients répartis au hasard pour recevoir 1 f.p.j. soit losartan potassique à raison de 50 mg (n = 4 605), soit 50 mg d'aténolol (n = 4 588) Suivi moyen de 4,8 ans	9 193	67 ans (55 à 80 ans)	Hommes : 4 230 (46 %)  Femmes : 4 963 (54 %)

L'étude LIFE (*Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension*) est une étude multicentrique, à double insu et avec répartition aléatoire ayant comparé des traitements comportant la prise de losartan potassique à celle de l'aténolol chez 9 193 patients hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) confirmée à l'ECG. Le paramètre principal de l'étude regroupait les événements suivants : décès d'origine cardiovasculaire, AVC non fatal et infarctus du myocarde (IM) non fatal. Une différence relative de 15 % au niveau du paramètre principal a été retenue pour démontrer la supériorité entre les groupes de traitement, avec une puissance de 80 %. Un événement composant le paramètre principal s'est produit chez 11 % des patients du groupe recevant losartan potassique et chez 13 % des

patients du groupe recevant l'aténolol, entraînant une différence relative de 13 % (risque relatif ajusté de 0,87 [IC : 0,77-0,98] et  $p = 0,021$ ). Les composantes individuelles du paramètre principal n'ont pas uniformément confirmé le résultat global. La différence entre les groupes était principalement le résultat d'un effet du traitement sur l'AVC. Le traitement à base de losartan potassique a réduit de 25 % le risque d'AVC, comparativement au traitement à base d'aténolol ( $p = 0,001$ ) [voir la [figure 1](#) et le [tableau 13](#)]. Une tendance non significative en faveur du traitement à base de losartan potassique a été observée pour la composante « mortalité cardiovasculaire ». Quant à la composante « infarctus du myocarde », une différence non significative a été observée en faveur du traitement à base d'aténolol. Même si les résultats de l'étude LIFE se sont révélés favorables à losartan potassique par rapport à l'aténolol pour ce qui est des événements regroupés du paramètre principal, aucune étude de confirmation ne vient corroborer ces résultats. D'après l'analyse selon le protocole, qui excluait les patients ayant enfreint gravement le protocole et qui censurait les données des patients 14 jours après l'arrêt définitif du traitement à l'étude ou 14 jours après le début d'un traitement interdit, les résultats obtenus au regard du paramètre principal concordaient sans toutefois atteindre le seuil de signification statistique (risque relatif : 0,865; IC à 95 % : 0,748-1,002;  $p = 0,053$ ). La puissance statistique de l'analyse selon le protocole était inférieure à celle de l'analyse selon l'intention de traiter, car environ un tiers des événements avaient été exclus.

Des patients hypertendus de 55 à 80 ans ayant reçu ou non un traitement antérieur contre l'hypertension et présentant des signes d'HVG à l'ECG ont été inclus dans l'étude. Selon l'étude NHANES III, la prévalence de l'HVG confirmée à l'ECG chez les patients hypertendus dans la population générale, qui était semblable à celle observée chez les sujets de l'étude LIFE, est de 12,8 % chez les patients de race blanche et de 26,8 % chez les patients de race noire. Les patients suivants ont été exclus de l'étude : patients atteints d'hypertension secondaire; patients ayant subi un infarctus du myocarde ou un AVC au cours des six mois précédents; patients atteints d'angine de poitrine nécessitant un traitement au moyen d'un bêta-bloquant ou d'un bloqueur des canaux calciques; patients présentant une insuffisance cardiaque ou une fraction d'éjection du ventricule gauche de 40 % ou moins; patients présentant une affection qui, de l'avis du médecin traitant, nécessite un traitement au moyen du losartan ou d'un autre antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II de type I, de l'aténolol ou d'un autre bêta-bloquant, d'hydrochlorothiazide ou d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Les patients ont été répartis au hasard pour recevoir losartan potassique à 50 mg ( $n = 4\ 605$ ) ou de l'aténolol à 50 mg ( $n = 4\ 588$ ), une fois par jour. Dans les cas où les valeurs cibles de la tension artérielle ( $< 140/90$  mm Hg) n'étaient pas atteintes, on a d'abord ajouté de l'hydrochlorothiazide (12,5 mg) puis, au besoin, on a augmenté la dose de losartan potassique ou de l'aténolol à 100 mg une fois par jour. Si nécessaire, il était possible de recourir à d'autres traitements anti hypertensifs (p. ex., augmentation de la dose d'hydrochlorothiazide à 25 mg ou ajout d'un autre diurétique, de bloqueurs des canaux calciques, d'alpha-bloquants ou de médicaments à action centrale, mais non d'inhibiteurs de l'ECA, d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ou de bêta-bloquants) pour atteindre les valeurs cibles de la tension artérielle.

Parmi les 9 193 patients répartis au hasard, 54 % étaient des femmes et 6 % étaient de race noire. L'âge moyen était de 67 ans, 62 % des patients étant âgés de 65 ans ou plus. Au début de l'étude, 13 % des patients étaient diabétiques, 14 % étaient atteints d'hypertension systolique isolée, 16 %, d'une maladie coronarienne et 8 %, d'une maladie vasculaire cérébrale. On n'a observé aucune différence significative entre les deux groupes quant aux caractéristiques démographiques et cliniques et aux antécédents médicaux notés au début de l'étude. La tension artérielle moyenne initiale s'élevait à 174/98 mmHg dans les deux groupes de traitement. La durée moyenne du suivi a été de 4,8 ans. À la fin de l'étude ou à la dernière visite avant la survenue d'un événement composant le paramètre principal, 77 % des patients appartenant au groupe recevant losartan potassique et 73 % de ceux appartenant au groupe recevant l'aténolol continuaient de prendre le médicament à l'étude. Parmi les patients ayant continué de prendre le médicament à l'étude, les doses moyennes de losartan potassique et d'aténolol étaient toutes deux d'environ 80 mg/jour; 15 % des patients prenaient de l'aténolol ou du losartan en monothérapie et 77 % prenaient également de l'hydrochlorothiazide (à raison d'une dose moyenne de 20 mg/jour dans chaque groupe). La baisse de la tension artérielle mesurée lors de l'effet minimal du médicament était similaire dans les deux groupes de traitement; la tension artérielle n'a toutefois été mesurée à aucun autre moment de la journée. À la fin de l'étude ou à la dernière visite avant la survenue d'un événement composant le paramètre principal, la tension artérielle moyenne était de 144,1/81,3 mm Hg dans le groupe recevant le losartan et de 145,4/80,9 mm Hg dans celui recevant l'aténolol. La différence de 1,3 mm Hg quant à la tension artérielle systolique était significative ( $p < 0,001$ ) alors que celle de 0,4 mm Hg quant à la tension artérielle diastolique ne l'était pas ( $p = 0,098$ ).

**Tableau 13 – Résultats des composantes regroupées du paramètre principal et des composantes du paramètre principal et paramètres secondaires de l'étude LIFE**

	Traitement à base de losartan (n = 4 605)	Traitement à base d'aténolol (n = 4 588)	Réduction du risque relatif †	IC à 95 %	p
	Nombre d'événements (%)	Nombre d'événements (%)			
<b>Composantes regroupées du paramètre principal</b>	508 (11)	588 (13)	13 %	2 % à 23 %	0,021
<b>Composantes du paramètre principal (en tant que premier événement)</b>					
AVC (non fatal‡)	209 (4,5)	286 (6,2)			
Infarctus du myocarde (non fatal‡)	174 (3,8)	168 (3,7)			
Mortalité cardiovasculaire	125 (2,7)	134 (2,9)			
<b>Paramètres secondaires (en tout temps durant l'étude)</b>					
AVC (fatal/non fatal)	232 (5)	309 (7)	25 %	11 % à 37 %	0,001
Infarctus du myocarde	198 (4)	188 (4)	-7 %	-13 % à 12 %	0,491

	Traitement à base de losartan (n = 4 605)	Traitement à base d'aténolol (n = 4 588)	Réduction du risque relatif †	IC à 95 %	p
(fatal/non fatal)	Nombre d'événements (%)	Nombre d'événements (%)			
Mortalité cardiovasculaire	204 (4)	234 (5)	11 %	-7 % à 27 %	0,206
Causée par une maladie coronarienne	125 (3)	124 (3)	-3 %	-32 % à 20 %	0,839
Causée par un AVC	40 (1)	62 (1)	35 %	4 % à 67 %	0,032
Autre‡	39 (1)	48 (1)	16 %	-28 % à 45 %	0,411

† Ajusté en fonction de l'indice du risque de Framingham obtenu au début de l'étude et du degré d'hypertrophie ventriculaire gauche à l'ECG.

‡ Premier événement signalé; dans certains cas, le patient est décédé après le signalement de l'événement.

§ Décès causé par une insuffisance cardiaque, une maladie vasculaire non coronarienne ou une embolie pulmonaire, ou décès d'origine cardiovasculaire autre que l'AVC ou la maladie coronarienne.

Le tableau 13 illustre aussi les résultats obtenus pour les composantes regroupées du paramètre principal, les composantes du paramètre principal et celles des paramètres secondaires. On peut voir que les résultats des composantes regroupées du paramètre principal ont atteint le seuil de signification statistique, presque entièrement en raison de la composante « AVC ».

Les résultats obtenus pour les composantes regroupées du paramètre principal sont illustrés de manière graphique à la figure 1.

Figure 1 – Courbe de Kaplan-Meier (observation) — Composantes regroupées du paramètre




Figure 1. Estimations Kaplan-Meier des événements du paramètre principal quant au moment de la survenue d'un décès d'origine cardiovasculaire, d'un AVC non fatal ou d'un infarctus du myocarde non fatal, dans les groupes ayant reçu losartan potassique ou de l'aténolol. La réduction du risque a été ajustée en fonction de l'indice de risque de Framingham obtenu au début de l'étude et du degré d'hypertrophie ventriculaire gauche à l'ECG.

Bien que les résultats de l'étude LIFE se soient révélés en faveur du traitement à base de losartan potassique, par rapport au traitement à base d'aténolol, quant à l'AVC, il importe de rappeler que l'AVC était un paramètre secondaire dans l'étude LIFE. Une différence a été observée entre les groupes quant au nombre de patients ayant subi un AVC qui présentaient également une fibrillation auriculaire : 13,4 % dans le groupe ayant reçu losartan potassique et 20,5 % dans le groupe ayant reçu l'aténolol.

Les autres paramètres cliniques de l'étude LIFE étaient les suivants : mortalité totale, hospitalisation en raison d'une insuffisance cardiaque ou d'une angine de poitrine, interventions de revascularisation coronarienne ou périphérique et arrêt cardiaque avec réanimation. Aucune différence significative n'a été observée quant à la fréquence de ces événements entre le groupe losartan potassique et le groupe aténolol.

Dans l'étude LIFE, les patients de race noire afro-américains ayant reçu un traitement à base d'aténolol présentaient un risque plus faible de subir les événements composant le paramètre principal que les patients du même groupe ethnique ayant reçu un traitement à base de losartan. Dans le sous-groupe de patients de race noire afro-américains (n = 533), on a observé 29 événements du paramètre principal chez les 263 patients ayant reçu l'aténolol (11 %, soit 26 pour 1 000 patients-années) et 46 événements du paramètre principal chez les 270 patients ayant reçu losartan potassique (17 %, soit 42 pour 1 000 patients-années). Ces résultats n'ont pas pu être expliqués par des différences autres que la race ou par un quelconque déséquilibre entre les groupes de traitement. De plus, la baisse de la tension artérielle obtenue dans les deux groupes de traitement était similaire chez les patients de race noire afro-américains et les patients appartenant à une autre race. Les résultats relatifs à l'AVC étaient en faveur du traitement à base d'aténolol chez les patients de race noire afro-américains. L'étude LIFE ne fournit aucune donnée probante montrant que les effets bénéfiques du traitement à base de losartan sur la réduction du risque d'événements cardiovasculaires chez les patients hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche s'appliquent aux patients de race noire afro-américains.

#### **14.2 Études comparatives de biodisponibilité**

Une étude de bioéquivalence croisée à double insu, équilibrée, randomisée, deux traitements, deux séquences, deux périodes, dose orale unique, multiségment de bioéquivalence croisée de comprimés de losartan potassique 100 mg d'Auro Pharma Inc., Canada [Fab. par Aurobindo Pharma Limited, Inde] avec celle comprimés de COZAAR® 100 mg Merck Frosst Canada Ltd.,

Canada a été menée chez 60 sujets en bonne santé, adultes, mâles dans des conditions de jeûne.

#### TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES COMPARATIVES DE BIODISPONIBILITÉ

<b>Losartan (1 x 10 mg) À partir de données mesurées</b>				
<b>Moyenne géométrique Moyenne arithmétique (CV %) (CV %)</b>				
Paramètre	Test* (A)	Référence † (B)	% De ratio de moyenne Géométrique	Intervalle de confiance À 90 %
<b>ASC<sub>0-t</sub> (hr.ng/mL)</b>	1141,7 1230,6 (41,7)	1083,0 1170,2 (41,5)	105,4	99,8-111,3
<b>ASC<sub>0→∞</sub> (hr. ng/mL)</b>	1178,7 1267,3 (41,0)	1121,3 1208,1 (41,0)	105,1	99,7-110,8
<b>C<sub>max</sub> (ng/mL)</b>	717,3 845,2 (60,0)	699,6 777,7 (45,5)	102,5	89,4-117,6
<b>T<sub>max</sub> § (h)</b>	0,8 (0,3-4,5)	1,3 (0,5-4,0)		
<b>T<sub>½</sub> § (h)</b>	1,8 (39,2)	1,8 (54,7)		

« \* Comprimés d'AURO-LOSARTAN 100 mg , manufactured by Aurobindo Pharma Ltd., India for Auro Pharma Inc., Canada ».

† Comprimés de COZAAR® 100 mg de Merck Frosst Canada Ltd., au Canada, ont été achetés au Canada.

§ Exprimé comme la médiane (plage) seulement.

§ Exprimé en moyenne arithmétique (%CV) seulement.

#### 15 MICROBIOLOGIE

Aucune information microbiologique n'est requise pour ce produit pharmaceutique.

#### 16 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

##### Toxicologie générale :

##### Toxicité aiguë

La DL<sub>50</sub> orale du losartan potassique chez les souris mâles est de 2 248 mg/kg (6 744 mg/m<sup>2</sup>). Une mortalité importante a été observée chez les souris et les rats après l'administration par voie orale de 1 000 mg/kg (3 000 mg/m<sup>2</sup>) et de 2 000 mg/kg (11 800 mg/m<sup>2</sup>), respectivement (voir le [tableau 14](#)).

**Tableau 14 – Toxicité aiguë**

Voie d'administration	Espèce	Sexe	Valeurs de la DL <sub>50</sub>	Dose maximale tolérée
Intrapéritonéale	Souris	Femelle	–	> 160 mg/kg à < 400 mg/kg
		Mâle	–	
	Rat	Femelle	–	> 100 mg/kg à < 200 mg/kg
		Mâle	–	
Intrapéritonéale Étude avec le métabolite actif du losartan, E-3174 (L-158,641)	Souris	Femelle	441,3 mg/kg	–
Orale	Souris	Femelle	2 248 mg/kg	500 mg/kg à 1 000 mg/kg
		Mâle		
	Rat	Femelle	–	~ 1 000 mg/kg
	Mâle	–		
	Chien	Femelle	–	> 160 mg/kg à < 320 mg/kg
		Mâle	–	

### Toxicité chronique

La toxicité du losartan potassique a été évaluée dans une série d'études portant sur l'administration de doses multiples par voie orale pendant une période allant jusqu'à trois mois chez des singes et jusqu'à un an chez des rats et des chiens. Aucune observation ne laisse présumer que l'administration aux doses thérapeutiques devrait être évitée (voir le [tableau 15](#)).

**Tableau 15 – Toxicité chronique**

#### a) Administration orale

Espèce	Durée	Nombre d'animaux par groupe	Dose mg/kg/jour	Effets
Rat (Sprague-Dawley Crl:CD [SD] BR)	5 semaines	12 M + 12 F	0, 15, 45, 135	<b>Doses moyennes et doses élevées chez les mâles :</b> légère diminution du gain pondéral.  <b>Doses élevées chez les mâles :</b>

Espèce	Durée	Nombre d'animaux par groupe	Dose mg/kg/jour	Effets
				<p>légère diminution de la numération érythrocytaire.</p> <p><b>Toutes les doses chez les mâles :</b> réduction du poids cardiaque.</p> <p><b>Groupes à doses élevées :</b> légère augmentation de l'azote uréique sanguin; lésions gastriques en foyer.</p> <p><b>Groupes à doses moyennes et à doses élevées :</b> légère augmentation des chlorures sériques.</p> <p><b>Toutes les doses :</b> légère augmentation de la glycémie.</p>
Rat (Sprague-Dawley Crl:CD [SD] BR)	14 semaines	17 M + 17 F	0, 15, 45, 135	<p><b>Doses moyennes et doses élevées chez les mâles :</b> légère diminution du taux de gain pondéral; augmentation de l'azote uréique sanguin; nette évidence de lésions en foyer de la muqueuse gastrique.</p> <p><b>Doses élevées chez les mâles :</b> légère diminution des paramètres de la numération érythrocytaire; augmentation du taux de cholestérol; alcalinisation de l'urine.</p> <p><b>Toutes les doses chez les mâles :</b> réduction du poids cardiaque.</p> <p><b>Doses élevées chez les femelles :</b> augmentation de l'azote</p>

Espèce	Durée	Nombre d'animaux par groupe	Dose mg/kg/jour	Effets
				<p>urémique sanguin.</p> <p><b>Groupes à doses élevées :</b> hausse des taux sériques de sodium, de chlorures ou de potassium.</p>
<p>Rat (Sprague-Dawley Crl:CD [SD] BR)</p>	<p>53 semaines</p>	<p>30 M + 30 F</p>	<p>0, 15, 45, 135</p>	<p><b>Doses élevées chez les mâles :</b> légère diminution des paramètres de la numération érythrocytaire (25<sup>e</sup> semaine); légère hausse du taux sérique de phosphore (25<sup>e</sup> semaine); érosions en foyer de la muqueuse glandulaire de l'estomac (également observées chez un mâle ayant reçu une dose faible).</p> <p><b>Doses moyennes et doses élevées chez les mâles :</b> augmentation de l'azote urémique sanguin; diminution du poids cardiaque et du poids du cœur par rapport au poids du cerveau (à l'autopsie effectuée à la fin de l'étude), très légère hyperplasie des cellules juxtaglomérulaires (à l'autopsie effectuée au cours de l'étude).</p> <p><b>Doses élevées chez les femelles :</b> augmentation de l'azote urémique sanguin; diminution du poids cardiaque absolu et du poids du cœur par rapport au poids du cerveau (à l'autopsie effectuée au cours de l'étude).</p>

Espèce	Durée	Nombre d'animaux par groupe	Dose mg/kg/jour	Effets
				<p><b>Doses moyennes et doses élevées chez les femelles :</b> légère diminution de la consommation d'aliments; légère diminution des paramètres érythrocytaires (39<sup>e</sup> semaine pour les doses élevées, 39<sup>e</sup> et 51<sup>e</sup> semaines pour les doses moyennes).</p> <p><b>Toutes les femelles :</b> diminution des taux sériques de triglycérides.</p> <p><b>Tous les groupes :</b> réduction de la protéinurie; très légère hyperplasie des cellules juxtaglomérulaires; diminution de la fréquence et de la gravité des néphrites chroniques spontanées.</p> <p><b>Groupes à doses moyennes et à doses élevées :</b> salivation après l'administration de la dose (11<sup>e</sup> et 20<sup>e</sup> semaines).</p> <p><b>Groupes à doses élevées :</b> diminution du gain pondéral.</p>
Chien (Beagle)	5 semaines	4 M + 4 F	0, 15, 45, 135	<p><b>Tous les groupes :</b> troubles gastro-intestinaux (vomissements, selles anormales, recherche positive de sang occulte dans les fèces).</p> <p>Aucune mortalité, aucune modification dans le poids corporel, la consommation d'aliments, les analyses d'urine,</p>

Espèce	Durée	Nombre d'animaux par groupe	Dose mg/kg/jour	Effets
				la biochimie du sang ou les paramètres hématologiques n'ont été reliées au traitement. Aucune observation post-mortem n'a été reliée au traitement.
Chien (Beagle)	14 semaines	5 M + 5 F	0, 5, 25, 125	<p><b>Doses élevées chez les mâles :</b> légère diminution des paramètres érythrocytaires.</p> <p><b>Groupes à doses élevées :</b> signes de toxicité gastro-intestinale (vomissements, couleur et consistance anormales des selles, sang occulte dans les fèces); légère diminution du poids cardiaque.</p> <p><b>Groupes à doses moyennes :</b> ptyalisme et vomissements. Aucun effet relié au traitement sur le poids corporel, la consommation d'aliments, la pathologie clinique, l'électrocardiographie, les examens physiques, l'ophtalmoscopie, ou les résultats des examens macroscopique et microscopique post-mortem.</p>
Chien (Beagle)	53 semaines	8 M + 8 F	0, 5, 25, 125	<p><b>Groupes à doses élevées :</b> ptyalisme avant ou après l'administration de la dose; vomissements occasionnels et changements de couleur et de consistance des selles.</p> <p><b>Groupes à doses moyennes et à doses élevées :</b> augmentations</p>

Espèce	Durée	Nombre d'animaux par groupe	Dose mg/kg/jour	Effets
				sporadiques et isolées de l'ALAT sérique.  Aucune modification reliée au traitement dans le poids corporel ou la consommation d'aliments, les résultats ophtalmologiques ou les paramètres électrocardiographiques, hématologiques ou urinaires. Aucune mortalité n'a été reliée au traitement.
Singe (Rhésus [ <i>Macaca mulatta</i> ])	14 semaines	4 M + 4 F	0, 20, 100, 300	<b>Groupes à doses élevées :</b> légère diminution des paramètres érythrocytaires (8 <sup>e</sup> et 11 <sup>e</sup> semaines); légère baisse de l'azote uréique sanguin (11 <sup>e</sup> semaine); augmentation des taux d'angiotensine II (24 heures après l'administration de la dose); selles goudroneuses et petites lésions en foyer, déprimées et rouges, dans l'estomac ou l'intestin grêle (à l'autopsie).  Aucune modification reliée au traitement dans les signes physiques, la mortalité, la consommation d'aliments, le poids corporel, les résultats des examens ophtalmologiques ou des analyses d'urine. Aucun changement relié au traitement dans le poids des organes.

**b) Administration intraveineuse**

Espèce	Durée	Nombre d'animaux par groupe	Dose mg/kg/jour	Effets

Espèce	Durée	Nombre d'animaux par groupe	Dose mg/kg/jour	Effets
Rat (Sprague-Dawley Crl:CD [SD] BR)	16 jours	15 M + 15 F	0, 0,92, 4,59, 9,17	<p><b>Doses élevées chez les mâles :</b> légère diminution de la numération érythrocytaire et de l'hématocrite.</p> <p>Aucun décès ou signe clinique reliés au traitement; aucune modification reliée au traitement dans le gain pondéral, la consommation d'aliments, les résultats des examens ophtalmologiques, la biochimie du sang ou les analyses d'urine.</p>
Rat (Sprague-Dawley Crl:CD [SD] BR)	15 jours	15 M + 15 F	0, 1, 5, 10 <sup>†</sup>	<p><b>Doses moyennes et doses élevées chez les mâles :</b> légère diminution du poids corporel.</p> <p><b>Tous les groupes :</b> légère réduction du poids cardiaque; légère diminution du poids corporel moyen final.</p> <p>Aucun effet relié au traitement sur la consommation d'aliments, les résultats des examens ophtalmologiques et hématologiques, l'évaluation de la biochimie du sang ou les analyses d'urine.</p>
Chien (Beagle)	17 jours	4 M + 4 F	0, 0,92, 4,59, 9,17	Aucun décès, aucun signe clinique et aucun changement reliés au traitement dans le gain pondéral, la consommation d'aliments, les
Chien (Beagle)	15 jours	4 M + 4 F	0, 1, 5, 10 <sup>†</sup>	Aucun décès, aucun signe

Espèce	Durée	Nombre d'animaux par groupe	Dose mg/kg/jour	Effets
				clinique et aucun changement reliés au traitement dans le gain pondéral, la consommation d'aliments, les

†E-3174 (L-158,641) : Principal métabolite pharmacologiquement actif du losartan.

### **Cancérogénicité :**

Le losartan potassique ne s'est pas révélé cancérogène lorsqu'il a été administré aux posologies maximales tolérées chez des rats et des souris pendant 105 semaines (dose maximale de 270 mg/kg/jour) et 92 semaines (dose maximale de 200 mg/kg/jour), respectivement.

### **Génotoxicité :**

On n'a observé aucun effet mutagène du losartan potassique au cours des épreuves de mutagenèse microbienne et de mutagenèse sur des cellules de mammifères V-79. En outre, on n'a pas observé de signe de génotoxicité directe dans les épreuves par élution alcaline *in vitro* et la recherche d'aberrations chromosomiques *in vitro*. De même, aucune aberration chromosomique n'est apparue dans les cellules de la moelle osseuse chez des souris mâles ou femelles après l'administration par voie orale de doses toxiques pouvant atteindre 1 500 mg/kg (4 500 mg/m<sup>2</sup>). Par ailleurs, on n'a pas observé de signe de génotoxicité du métabolite actif dans les épreuves de mutagenèse microbienne, les épreuves par élution alcaline *in vitro* et la recherche d'aberrations chromosomiques *in vitro*.

### **Toxicologie pour la reproduction et le développement :**

La fertilité et la capacité reproductrice n'ont pas été affectées chez les rats mâles et femelles qui ont reçu par voie orale des doses de losartan potassique pouvant atteindre environ 150 et 300 mg/kg/jour, respectivement.

### Tératologie

Dans les études chez les rats, le losartan potassique a entraîné des réactions défavorables chez le fœtus et le nouveau-né. Ces réactions sont, entre autres, une réduction du poids corporel, la mort et une toxicité rénale. Une analyse pharmacocinétique portant sur du plasma fœtal a mis en évidence des concentrations significatives du losartan et de son métabolite actif E-3174 (L-158,641) au 20<sup>e</sup> jour de la gestation alors qu'elles étaient négligeables au 15<sup>e</sup> jour. En outre, des concentrations significatives du losartan et de son métabolite actif ont été décelées dans le lait maternel des rates. D'après ces observations, les effets du losartan potassique sur le fœtus et

les ratons nouveau-nés seraient attribuables à une exposition au médicament à la fin de la gestation et pendant la lactation.

## **17 MONOGRAPHIES DE PRODUIT À L'APPUI**

1 <sup>Pr</sup>COZAAR<sup>®</sup> (comprimés, 25, 50 et 100 mg), contrôle de présentation 260621, monographie de produit, Organon Canada Inc. (6 juillet 2022)

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

### LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

#### Pr AURO-LOSARTAN

#### Comprimés de losartan potassique

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre AURO-LOSARTAN et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet d'AURO-LOSARTAN.

#### Mises en garde et précautions importantes

AURO-LOSARTAN ne doit pas être pris pendant la grossesse. La prise d'AURO-LOSARTAN pendant la grossesse nuire à votre bébé ou même entraîner son décès. Si vous devenez enceinte alors que vous suivez un traitement avec AURO-LOSARTAN, cessez la prise du médicament et communiquez avec votre professionnel de la santé dès que possible.

#### Pourquoi AURO-LOSARTAN est-il utilisé?

AURO-LOSARTAN est utilisé chez des adultes pour :

- réduire la tension artérielle;
- procurer une protection rénale en retardant l'aggravation de la maladie rénale chez les patients atteints d'un diabète de type 2 présentant une protéinurie (présence de protéines dans l'urine) et une tension artérielle élevée.

AURO-LOSARTAN est utilisé chez les enfants (6 à 16 ans) pour :

- réduire la tension artérielle.

#### Comment AURO-LOSARTAN agit-il?

AURO-LOSARTAN est un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine (ARA). Il a pour effet d'abaisser la tension artérielle. Ce médicament ne guérit pas l'hypertension artérielle, mais il aide à la maîtriser. En conséquence, il est important de continuer à prendre AURO-LOSARTAN régulièrement, même si vous vous sentez bien.

#### Quels sont les ingrédients dans AURO-LOSARTAN?

Ingrédient médicamenteux : losartan potassique

Ingrédients non médicinaux Cellulose microcristalline, Lactose monohydraté, Hydroxypropylcellulose faiblement substituée, Stéarate de magnésium, Opadry White 20A58900, Amidon prégélatinisé.

Bien que les comprimés AURO-LOSARTAN contiennent du potassium, cette quantité est trop faible pour pouvoir remplacer des suppléments de potassium. Si votre médecin vous a prescrit des suppléments de potassium, continuez à les prendre selon ses directives.

**AURO-LOSARTAN est disponible sous les formes posologiques suivantes :**

Comprimés : 25 mg, 50 mg et 100 mg.

**Ne prenez pas AURO-LOSARTAN si :**

- vous êtes allergique au losartan potassique ou à l'un des ingrédients non médicinaux d'AURO-LOSARTAN ;
- vous prenez déjà un antihypertenseur contenant de l'aliskiren (comme Rasilez) et que vous êtes atteint de diabète ou d'une maladie rénale.

**Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre AURO-LOSARTAN, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si :**

- vous avez eu une réaction allergique à un médicament servant à abaisser la pression artérielle, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA);
- vous prenez un inhibiteur de l'ECA;
- vous présentez un rétrécissement d'une artère ou d'une valvule du cœur;
- vous avez subi une crise cardiaque ou un AVC;
- vous prenez un succédané du sel qui contient du potassium, des suppléments de potassium, un diurétique d'épargne potassique (un type particulier de médicament qui élimine l'eau et qui fait en sorte que votre organisme retient le potassium) ou d'autres médicaments susceptibles d'augmenter le taux de potassium (comme des produits qui contiennent du triméthoprim);
- vous suivez un régime à teneur réduite en sel;
- vous êtes sous dialyse;
- vous êtes déshydraté ou souffrez de transpiration, de diarrhée ou de vomissements abondants;
- vous avez de la difficulté à uriner ou ne produisez pas d'urine;
- vous êtes atteint d'insuffisance cardiaque;

- vous êtes atteint de diabète ou d'une maladie du foie ou des reins;
- vous êtes enceinte, prévoyez le devenir ou pensez l'être;
- vous allaitez ou prévoyez allaiter.

**Autres mises en garde à connaître :**

**Exposition au soleil :** Pendant votre traitement avec AURO-LOSARTAN, vous pouvez devenir sensible au soleil. Vous devez réduire au minimum votre exposition au soleil jusqu'à ce que vous connaissiez votre réaction au traitement.

**Anesthésie :** Si vous devez subir une intervention chirurgicale ou dentaire sous anesthésie, il faut informer votre professionnel de la santé que vous prenez AURO-LOSARTAN, car il y a un risque d'une baisse soudaine de la pression artérielle.

**Dépistage et bilans:** Pendant votre traitement avec AURO-LOSARTAN, il se peut que votre professionnel de la santé surveille :

- votre fonction rénale;
- votre pression artérielle;
- votre taux de potassium dans le sang;
- votre fonction hépatique.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines :** Évitez d'effectuer des tâches qui pourraient nécessiter une attention particulière avant de savoir comment vous réagissez à AURO-LOSARTAN. Des étourdissements, une sensation de tête légère et des évanouissements peuvent survenir, particulièrement après la première dose ou une augmentation de la dose.

**Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce.**

**Interactions médicamenteuses graves**

- Médicaments contenant de l'aliskiren si vous souffrez de diabète ou d'une maladie rénale.

**Les produits qui suivent pourraient aussi être associés à des interactions médicamenteuses avec AURO-LOSARTAN :**

- d'autres médicaments utilisés pour abaisser la pression artérielle, comme les diurétiques;
- la digoxine, un médicament pour le cœur;
- le lithium, utilisé pour le traitement d'un trouble bipolaire;

- des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), utilisés pour soulager la douleur et l'enflure, dont l'ibuprofène, le naproxène et le célécoxib;
- la warfarine, utilisée comme anticoagulant et pour prévenir les caillots sanguins;
- des antibiotiques, utilisés pour traiter les infections bactériennes, tels que la rifampine et l'érythromycine;
- le fluconazole, utilisé pour traiter les infections fongiques;
- le phénobarbital, utilisé pour traiter l'épilepsie;
- la cimétidine, utilisée pour traiter les brûlures d'estomac et les ulcères d'estomac;
- des agents qui augmentent le taux de potassium sérique, tels que des suppléments potassiques, des succédanés du sel contenant du potassium, un diurétique d'épargne potassique (un type particulier de médicament qui élimine l'eau) ou d'autres médicaments susceptibles d'augmenter le taux de potassium sérique (par exemple, un produit qui contient du triméthoprime);
- le jus de pamplemousse (qu'il faut éviter de consommer pendant le traitement avec AURO-LOSARTAN).

#### **Comment prendre AURO-LOSARTAN :**

- Prenez AURO-LOSARTAN tel qu'il vous a été prescrit.
- Il est recommandé de le prendre vers la même heure chaque jour.
- AURO-LOSARTAN peut être pris avec ou sans aliments, mais de préférence toujours dans les mêmes conditions tous les jours.

#### **Dose habituelle :**

##### Pression artérielle élevée

##### Adultes :

- La dose initiale habituelle est de 50 mg une fois par jour. La posologie habituelle varie de 50 à 100 mg par jour, administrés en une seule dose.

##### Enfants (de 6 à 16 ans) capables d'avaler des comprimés :

- Chez les patients dont le poids est de 20 à moins de 50 kg, la dose recommandée est de 25 mg une fois par jour; cette dose peut être augmentée par votre professionnel de la santé jusqu'à un maximum de 50 mg une fois par jour.
- Chez les patients dont le poids est supérieur ou égal à 50 kg, la dose de départ est de 50 mg une fois par jour; cette dose peut être augmentée par votre professionnel de la santé jusqu'à un maximum de 100 mg une fois par jour.

## Patients atteints de diabète de type 2 avec des protéines dans l'urine et une pression artérielle élevée

Adultes :

- La dose initiale habituelle est de 50 mg, une fois par jour. Votre professionnel de la santé peut augmenter la dose à 100 mg, une fois par jour.

### **Surdosage :**

Si vous pensez que vous ou qu'une personne dont vous vous occupez avez pris trop d'AURO-LOSARTAN, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

### **Dose oubliée :**

Si vous oubliez de prendre votre dose durant la journée, conformez-vous à votre horaire et prenez le comprimé suivant à l'heure habituelle. Ne prenez jamais deux doses de médicament à la fois.

### **Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à AURO-LOSARTAN?**

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez AURO-LOSARTAN. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires peuvent inclure les suivants :

- diarrhée
- vomissements
- fatigue
- douleurs au dos ou aux jambes
- crampes musculaires
- altération du goût
- étourdissements
- maux de tête
- éruptions cutanées

AURO-LOSARTAN peut modifier les résultats des tests sanguins de façon anormale. Votre médecin décidera du moment où effectuer les analyses sanguines et en interprétera les résultats.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
<b>COURANT</b>			
<b>Augmentation du taux de potassium dans le sang</b> : malaise général, pouls irrégulier et faiblesse musculaire.		✓	
Pression artérielle basse : étourdissements, évanouissement et sensation de tête légère (peut survenir en se levant d'une position couchée ou assise).	✓		
<b>PEU COURANT</b>			
<b>Réaction allergique</b> : difficulté à respirer ou à avaler, urticaire, éruption cutanée et gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue			✓
<b>Trouble rénal</b> : changement dans la fréquence d'urination, fatigue, nausées, enflure des extrémités et vomissements.		✓	
<b>Trouble du foie</b> : douleur abdominale, urine foncée, perte d'appétit, nausées, vomissements et jaunissement de la peau ou du blanc des yeux.		✓	
<b>RARE</b>			
<b>Rhabdomyolyse</b> : urine brun foncé, douleurs musculaires inexplicables et sensibilité ou faiblesse musculaire.		✓	
<b>TRÈS RARE</b>			
<b>Diminution du nombre de plaquettes: saignements</b> , ecchymoses, fatigue, apparition de petits points rouges ou violets sous la peau et faiblesse		✓	

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

## Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur; ou en
- Téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

**REMARQUE:** Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux

## Entreposage:

Conserver à température ambiante entre 15 et 30 °C.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

## Pour en savoir davantage au sujet d'AURO-LOSARTAN :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.

Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant <http://www.auropharma.ca>, ou peut être obtenu en téléphonant au 1-844-820-5468.

Le présent dépliant a été rédigé par Auro Pharma Inc.

Dernière révision : 17 février 2023