

Veterinary use only / Usage vétérinaire seulement

QUARESS PREMO 110

IODINE TEAT SOLUTION
SOLUTION POUR TRAYONS À BASE D'IODE

Post-Milking Antiseptic Teat Solution /
Solution antiseptique pour trayons à utiliser après la traite

WARNINGS: Withdrawal periods: Cattle: Meat: 0 days, Milk: 0 hours. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For complete warnings, see side panel.

MISES EN GARDE: Périodes de retrait: Bovins: Viande : 0 jours, Lait : 0 heures. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Pour les mises en garde complètes, voir le panneau latéral.

ACTIVE INGREDIENTS: Iodine 1% w/w
(from Alkyl Poly Ethoxy Ethanol - Iodine Complex)

EMOLLIENTS: Glycerin 7.5% w/w,
Propylene Glycol 2.8% w/w

INDICATIONS:

QUARESS PREMO 110 is a post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

INGRÉDIENTS ACTIFS : Iode 1 % p/p
(du complexe iodé d'alkyl poly éthoxy éthanol)

ÉMOLLIENTS : Glycérine 7,5 % p/p,
Propylène glycol 2,8 % p/p.

INDICATIONS :

QUARESS PREMO 110 est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches laitières.

Net: 56.8 L (15 US gallon) [or 208 L (55 US gallon), 1150 L (304 US gallon)]

Manufactured by | Fabriqué par:

Ecolab Co. • 5105 Tomken Road • Mississauga ON L4W 2X5 Canada • tel. 1 800 465 1914

LOT : XXXXXX

EXP : XX/XX

WARNINGS / MISES EN GARDE: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**/Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

DIRECTIONS FOR USE: Use at full strength. Do not dilute. Apply QUARESS PREMO 110 to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0°C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. When a cow is being dried off, continue the application of QUARESS PREMO 110 to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of QUARESS PREMO 110 to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving.

A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the

MODE D'EMPLOI : Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer QUARESS PREMO 110 sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0 °C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel. Quand une vache est tarie, continuer l'application de QUARESS PREMO 110 sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de QUARESS PREMO 110 sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage.

Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rincé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne

Proposed Panel 2

original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

CAUTIONS: For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

STORAGE CONDITIONS: Store between 4°C and 25°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.

PRÉCAUTIONS : Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

ENTREPOSAGE : Conserver entre 4 °C et 25 °C et à l'abri du gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter toute détérioration. Garder le contenant bien fermé.