

# MONOGRAPHIE DE PRODUIT

## **Pr Ganciclovir pour injection USP**

Ganciclovir (sous forme de ganciclovir sodique)

500 mg/fiole

Poudre lyophilisée stérile

Agent antiviral

### **Eugia Pharma Inc.**

3700, avenue Steeles Ouest, Suite 402  
Woodbridge, ON L4L 8K8  
CANADA

Date de préparation:  
Le 16 juin 2023

Numéro de contrôle de la présentation : 274347

## Table des matières

<b>PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.....</b>	<b>3</b>
RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT .....	3
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE.....	3
CONTRE-INDICATIONS .....	4
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS .....	4
RÉACTIONS INDÉSIRABLES.....	11
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES .....	23
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION.....	26
SURDOSAGE .....	29
ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE .....	30
STABILITÉ ET ENTREPOSAGE .....	31
DIRECTIVES PARTICULIÈRE POUR LA MANIPULATION .....	32
PRÉSENTATION, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT .....	32
<b>PARTIE II : RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES.....</b>	<b>33</b>
RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES .....	33
ESSAIS CLINIQUES .....	33
PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE .....	33
VIROLOGIE.....	35
TOXICOLOGIE .....	41
RÉFÉRENCES .....	51
<b>PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR .....</b>	<b>54</b>

## PrGanciclovir pour injection USP

Poudre lyophilisée stérile

Ganciclovir (sous forme de ganciclovir sodique)

500 mg/fiole

### PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

#### RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT

Voie d'administration	Présentation / concentration	Tous les ingrédients non médicinaux
Intraveineuse	Poudre lyophilisée stérile, ganciclovir à 500 mg/fiole, 50 mg/mL après reconstitution	<i>Pour obtenir la liste complète des ingrédients non médicinaux, voir <b>Présentation, composition et conditionnement.</b></i>

#### INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE

Le ganciclovir pour injection USP est indiqué pour le traitement de la rétinite à cytomégalovirus CMV chez les patients immunodéprimés, y compris ceux qui sont atteints du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), qui présentent une immunosuppression iatrogène secondaire à une transplantation d'organe ou qui ont subi une chimiothérapie antinéoplasique. Le ganciclovir pour injection USP est également indiqué pour la prévention des maladies à CMV chez les receveurs de greffe risquant d'avoir des maladies à CMV.

Le diagnostic de la rétinite à CMV relève d'abord de l'ophtalmologie et doit reposer sur une ophtalmoscopie indirecte. Parmi les autres affections à envisager dans le diagnostic différentiel de la rétinite à CMV, on trouve la candidose, la toxoplasmose, l'histoplasmose, les cicatrices rétiniennes et les exsudats blancs ressemblant à de petits flocons de coton. Comme toutes ces affections peuvent donner à la rétine une apparence similaire à celle qu'entraîne le CMV, il est essentiel que le diagnostic de rétinite à CMV soit confirmé par un ophtalmologiste habitué aux caractéristiques rétiniennes de ces maladies. Le diagnostic de la rétinite à CMV peut être facilité par la recherche de CMV dans des cultures d'urine, de sang, de prélèvements de gorge ou d'autres tissus ou liquides de l'organisme, mais une culture négative n'écarte pas automatiquement la rétinite à CMV.

**Personnes âgées (≥65 ans) :** Aucune étude n'a été menée sur l'efficacité et l'innocuité du ganciclovir chez les patients âgés. Puisque leur fonction rénale peut être réduite, on doit administrer le ganciclovir avec prudence aux sujets âgés et porter une attention particulière à leur fonction rénale (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Insuffisance rénale).

**Enfants (<18 ans) :** L'innocuité et l'efficacité du ganciclovir chez l'enfant n'ont pas été établies. L'usage du ganciclovir chez l'enfant commande la plus grande prudence en raison de la probabilité d'effets cancérogènes à long terme et d'effets toxiques sur la reproduction.

L'administration chez l'enfant n'est pas recommandée à moins que les bienfaits possibles du traitement l'emportent sur ces risques considérables, d'après une évaluation rigoureuse.

## CONTRE-INDICATIONS

Le ganciclovir pour injection USP est contre-indiqué chez les patients qui présentent une hypersensibilité au ganciclovir, au valganciclovir ou à l'un des excipients (voir FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT).

Étant donné que les structures chimiques du ganciclovir, de l'acyclovir et de son promédicament, le valacyclovir, se ressemblent, une réaction d'hypersensibilité croisée entre ces médicaments est possible.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

### Mises en garde et précautions importantes

- La toxicité clinique du ganciclovir pour injection comprend une leucopénie sévère, une neutropénie, une anémie, une thrombocytopénie, une pancytopénie, une insuffisance médullaire et une anémie aplasique.
- Dans les études menées chez l'animal et *in vitro*, le ganciclovir était mutagène, tératogène et cancérigène, et a entraîné une aspermie; il y a donc lieu de le considérer comme un agent tératogène et cancérigène possible chez l'humain.
- Ganciclovir pour injection USP est indiqué uniquement chez les patients immunodéprimés, lorsque les avantages possibles du traitement l'emportent sur les risques mentionnés dans le présent document.
- L'innocuité et l'efficacité du ganciclovir n'ont pas été évaluées pour le traitement des maladies à CMV congénitales ou néonatales, ni pour le traitement de l'infection à CMV chez les sujets non immunodéprimés (voir INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE).

### Généralités

Dans les études cliniques sur l'administration de ganciclovir pour injection, la dose unique maximale étudiée a été de 6 mg/kg en perfusion intraveineuse continue d'une heure. Il est probable que des doses plus élevées, ou des perfusions plus rapides, puissent accroître la toxicité.

Il convient d'assurer une hydratation adéquate lors de l'administration du ganciclovir pour injection USP. Le ganciclovir étant éliminé par les reins, sa clairance dépend du fonctionnement adéquat des reins. EN CAS D'INSUFFISANCE RÉNALE, DES AJUSTEMENTS POSOLOGIQUES SONT NÉCESSAIRES. Ces ajustements doivent être basés sur les valeurs mesurées ou estimées de la clairance de la créatinine (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Insuffisance rénale).

Chez les patients hémodialysés (CICr < 10 mL/min), il vaut mieux recourir à la forme intraveineuse de ganciclovir (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Insuffisance rénale).

L'hémodialyse réduit les concentrations plasmatiques de ganciclovir d'environ 50 % pendant une séance de 4 heures (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Hémodialyse).

### **Mutagenèse et carcinogénèse**

Le ganciclovir a causé des mutations ponctuelles et des lésions chromosomiques dans les cellules de mammifères *in vitro* et *in vivo*, mais n'a pas causé de mutations ponctuelles chez les levures ou les bactéries, ni de létalité dominante chez la souris, ni de transformations de la morphologie cellulaire *in vitro*.

Au cours d'une étude de 18 mois, le ganciclovir a eu des effets cancérogènes chez les souris ayant reçu des doses orales de 20 et de 1 000 mg/kg/jour (environ 0,1 et 1,4 fois respectivement la dose humaine d'après la comparaison de la surface sous la courbe de concentration plasmatique en fonction du temps [ASC]). Les principaux tissus lésés lors de l'administration de 1 000 mg/kg/jour ont été la glande préputiale chez les mâles, le préestomac (muqueuse non glandulaire) chez les mâles et les femelles, ainsi que le foie et les tissus reproducteurs chez les femelles. Lors de l'administration de 20 mg/kg/jour, on a observé une légère augmentation de l'incidence de tumeurs dans les glandes préputiales et les glandes de Harder chez les mâles, dans le préestomac chez les mâles et les femelles, et dans le foie chez les femelles. Toutes les tumeurs provoquées par le ganciclovir étaient d'origine épithéliale ou vasculaire, à l'exception de l'histiocytosarcome du foie. Aucun effet cancérogène ne s'est manifesté lors de l'administration de 1 mg/kg/jour (soit 0,01 fois la dose humaine d'après la comparaison des ASC). Les glandes préputiales et clitoridiennes, le préestomac et les glandes de Harder chez la souris n'ont aucun équivalent chez l'humain. Le ganciclovir doit être considéré comme un agent cancérogène possible chez l'humain.

### **Hématologie**

**Le ganciclovir pour injection USP ne doit pas être administré si le nombre absolu de neutrophiles (NAN) est inférieur à 500/ $\mu$ L, le nombre de plaquettes est inférieur à 25 000/ $\mu$ L ou le taux d'hémoglobine est inférieur à 80 g/L.** On a observé de graves cas de leucopénie, neutropénie, anémie, thrombopénie, pancytopénie, insuffisance médullaire osseuse et anémie aplasique chez des patients traités par l'une ou l'autre présentation de ganciclovir pour injection. La fréquence et la gravité de ces réactions indésirables varient grandement selon les populations de patients (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Surveillance et épreuves de laboratoire; POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Patients atteints d'une grave leucopénie, neutropénie, anémie, thrombopénie et/ou pancytopénie; RÉACTIONS INDÉSIRABLES). Le ganciclovir pour injection USP doit, par conséquent, être administré avec prudence chez les patients qui présentent déjà une cytopénie ou qui ont des antécédents de réactions cytopéniques à d'autres médicaments ou produits chimiques, ou consécutives à une irradiation.

Il est recommandé d'effectuer des hémogrammes de suivi, y compris la numération plaquettaire, pendant le traitement, particulièrement en présence d'une insuffisance rénale (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Surveillance et épreuves de laboratoire).

Dans les cas graves de leucopénie, de neutropénie, d'anémie ou de thrombopénie, on recommande l'administration de facteurs de croissance hématopoïétiques ou l'interruption du traitement (voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES, POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Surveillance des patients, Réduction de la dose).

**Neutropénie :** La neutropénie survient de façon typique pendant la première ou la deuxième semaine du traitement d'induction et avant l'administration d'une dose cumulative totale de 200 mg/kg de ganciclovir pour injection, mais elle peut aussi survenir à tout moment pendant le traitement avec l'une ou l'autre des présentations. Le nombre de cellules revient habituellement à la normale en 3 à 7 jours après l'arrêt du traitement. On a démontré que les facteurs de croissance hématopoïétique augmentaient le nombre de neutrophiles et de globules blancs chez les patients recevant du ganciclovir pour injection pour le traitement d'une rétinite à CMV.

**Thrombopénie :** Une thrombopénie (nombre de plaquettes inférieur à 50 000/ $\mu$ L) a été observée chez des patients traités par le ganciclovir pour injection. Les patients immunodéprimés qui n'étaient pas atteints du sida étaient plus susceptibles de subir une diminution du nombre de plaquettes que ceux qui étaient atteints du sida. Les patients dont le nombre de plaquettes initial était inférieur à 100 000/ $\mu$ L étaient également plus exposés à cet effet toxique du ganciclovir pour injection.

### **Fonction rénale**

Il est essentiel de surveiller la fonction rénale pendant un traitement par le ganciclovir for injection USP, en particulier chez les patients âgés et chez les patients qui reçoivent en concomitance des agents potentiellement néphrotoxiques.

Il est possible que le probénécide, de même que d'autres médicaments qui inhibent la sécrétion ou la résorption tubulaires rénales, puissent réduire la clairance rénale du ganciclovir et augmenter ainsi sa demi-vie plasmatique.

**Insuffisance rénale :** La prudence s'impose lorsqu'on administre le ganciclovir pour injection USP chez les insuffisants rénaux. La demi-vie plasmatique et les concentrations plasmatiques maximales du ganciclovir sont plus élevées chez les patients qui présentent de fortes concentrations sériques de créatinine.

**Hémodialyse :** Les concentrations plasmatiques de ganciclovir sont réduites d'environ 50 % pendant une séance d'hémodialyse de 4 heures (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Hémodialyse).

### ***Atteinte rénale aiguë***

Une atteinte rénale aiguë pourrait survenir chez :

- les patients âgés, que leur fonction rénale soit déjà altérée ou non. La prudence est de mise lors de l'administration de ganciclovir pour injection USP aux patients âgés et il est conseillé de réduire la dose en présence d'une atteinte rénale (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Populations particulières).
- les patients recevant des médicaments associés à un risque de néphrotoxicité. La prudence est de mise lors de l'administration du ganciclovir pour injection USP à ces patients.
- les patients ne consommant pas assez d'eau. Il convient d'assurer une hydratation adéquate chez tous les patients

## **Fonction sexuelle / reproduction**

### ***Mutagenèse et carcinogénèse***

Avant l'instauration du traitement par le ganciclovir pour injection USP, il faut signaler aux femmes que le ganciclovir pourrait avoir des effets mutagènes et tératogènes sur le fœtus. Il faut conseiller aux femmes en âge de procréer d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement par le ganciclovir pour injection USP et pendant au moins 30 jours après l'arrêt du traitement. Similairement, il est recommandé que les hommes utilisent des condoms lors des rapports sexuels avec leur partenaire de sexe féminin pendant le traitement par le ganciclovir pour injection USP et pendant au moins 90 jours après l'arrêt du traitement (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Carcinogénèse et mutagenèse). Advenant une grossesse pendant le traitement ou dans les 30 jours suivant l'arrêt du traitement, il faut signaler au patient le risque possible d'effets tératogènes du ganciclovir sur le fœtus.

Le ganciclovir pour injection USP est considéré comme un agent tératogène et cancérigène potentiel, susceptible de causer des anomalies congénitales et des cancers, chez l'humain (voir ENTREPOSAGE ET STABILITÉ, Directives particulières pour la manipulation).

### ***Altération de la fertilité***

Le ganciclovir inhibe la spermatogénèse chez l'humain d'après une étude clinique, et risque de causer la stérilité de la femme d'après des données d'études chez l'animal. Avertir les patients que l'utilisation du ganciclovir pour injection USP. Les données recueillies au cours d'études chez l'animal montrent que l'administration de ganciclovir a entraîné l'inhibition de la spermatogénèse et donc la stérilité, effets qui se sont révélés réversibles aux doses plus faibles et irréversibles aux doses élevées (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction sexuelle / reproduction)

Chez les souris femelles, on a constaté une diminution de la fertilité et de la propension à l'accouplement, ainsi qu'une augmentation de la létalité embryonnaire après l'administration quotidienne de 90 mg/kg par voie intraveineuse (environ 1,7 fois l'exposition moyenne chez les humains recevant la dose de 5 mg/kg, d'après la comparaison des ASC).

Chez les souris mâles, la fertilité a diminué après l'administration quotidienne de doses intraveineuses  $\geq 2$  mg/kg et de doses orales  $\geq 10$  mg/kg. Ces effets étaient réversibles après l'administration quotidienne de 2 mg/kg par voie intraveineuse ou de 10 mg/kg par voie orale, mais elles étaient irréversibles ou partiellement réversibles après des doses intraveineuses de 10 mg/kg/jour et des doses orales de 100 ou 1 000 mg/kg/jour. Le ganciclovir a aussi causé une hypospermatogénèse chez le rat après l'administration quotidienne de doses orales  $\geq 100$  mg/kg et, chez le chien, après l'administration quotidienne de doses intraveineuses  $\geq 0,4$  mg/kg et de doses orales de 0,2 mg/kg.

### ***Toxicité fœtale***

D'après les résultats d'études chez des animaux, le ganciclovir peut provoquer une toxicité fœtale s'il est administré aux femmes enceintes. Lors de son administration à des lapines gravides à des doses correspondant à 2 fois l'exposition humaine (d'après la comparaison des ASC), le ganciclovir a causé des malformations au niveau de plusieurs des organes des fœtus. On a aussi

observé des effets toxiques maternels et fœtaux chez des souris et des lapines gravides. L'utilisation de ganciclovir pour injection USP s'accompagne donc d'un risque de déficiences congénitales. Les femmes suivant un traitement par le ganciclovir pour injection USP et les femmes dont le partenaire suit un traitement par le ganciclovir pour injection USP doivent prendre des mesures pour éviter une grossesse.

Le ganciclovir s'est révélé embryotoxique chez le lapin et la souris après son administration intraveineuse, et tératogène chez le lapin. Des résorptions fœtales étaient présentes chez au moins 85 % des lapines et des souris ayant reçu 60 mg/kg/jour et 108 mg/kg/jour (2 fois l'exposition humaine d'après la comparaison des ASC) respectivement. Les effets observés chez les lapines comprenaient : retard de la croissance fœtale, létalité embryonnaire, effets tératogènes et (ou) toxicité maternelle. Parmi les changements tératogènes se trouvaient : fente palatine, anophtalmie ou microophtalmie, aplasie d'organes (rein et pancréas), hydrocéphalie et brachygnathie. Chez la souris, une létalité embryonnaire ainsi que des effets toxiques maternels et fœtaux ont été constatés.

Des doses intraveineuses quotidiennes de 90 mg/kg de ganciclovir administrées à des souris femelles avant l'accouplement et pendant la gestation et la lactation ont causé une hypoplasie des testicules et des vésicules séminales chez les petits âgés d'un mois, ainsi que des modifications pathologiques dans la zone non glandulaire de l'estomac. D'après l'ASC, l'exposition des souris équivalait à environ 1,7 fois celle de l'humain.

### **Peau et annexes cutanées**

Les solutions de ganciclovir pour injection USP ont un pH élevé (environ 11) et peuvent causer une phlébite ou une douleur au siège de la perfusion intraveineuse, malgré une dilution supplémentaire dans les liquides intraveineux. On doit donc prendre soin d'administrer les solutions de ganciclovir pour injection USP uniquement dans des veines à débit convenable afin de permettre la dilution et la diffusion rapides du médicament (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

### **Capacité de conduire des véhicules et d'utiliser des machines**

L'effet sur la capacité de conduire des véhicules et d'utiliser des machines n'a fait l'objet d'aucune étude. D'après le profil de réactions indésirables, le ganciclovir peut avoir un effet mineur sur la capacité de conduire des véhicules et d'utiliser des machines. Des réactions indésirables, par exemple des crises convulsives, des étourdissements et de la confusion, peuvent survenir chez des patients recevant du ganciclovir. Si elles surviennent, ces réactions peuvent nuire aux tâches qui exigent de la vigilance, y compris à la capacité d'un patient de conduire des véhicules et de faire fonctionner de la machinerie.

### **Populations particulières**

Le ganciclovir inhibe la spermatogenèse chez l'humain d'après une étude clinique, et risque de causer la stérilité chez la femme d'après des données d'études chez l'animal. Avertir les patients que l'utilisation du ganciclovir pour injection USP. Les données recueillies au cours d'études chez l'animal montrent que l'administration de ganciclovir a entraîné l'inhibition de la spermatogenèse et donc la stérilité, effets qui se sont révélés réversibles aux doses plus faibles et irréversibles aux doses élevées (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction sexuelle / reproduction).



En raison du pouvoir mutagène et tératogène du ganciclovir, il faut conseiller aux femmes fertiles d'utiliser une méthode de contraception efficace durant leur traitement par le ganciclovir pour injection USP et pendant au moins 30 jours après l'arrêt du traitement. De même, il faut conseiller aux hommes d'employer des préservatifs pendant leur traitement par le ganciclovir pour injection USP et au moins les 90 jours suivant la fin du traitement, à moins qu'ils soient certains que leur partenaire ne risque pas de devenir enceinte (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS : Fonction sexuelle / reproduction).

Le ganciclovir pour injection USP est considéré comme un agent tératogène et cancérigène potentiel, susceptible de causer des anomalies congénitales et des cancers, chez l'humain (voir ENTREPOSAGE ET STABILITÉ, Directives particulières pour la manipulation).

**Grossesse :** L'innocuité du ganciclovir chez les femmes enceintes n'a pas été établie. Toutefois, le ganciclovir traverse aisément le placenta par diffusion. L'administration de ganciclovir à une femme enceinte doit être évitée à moins que les avantages pour la mère ne l'emportent sur les risques pour le fœtus.

Des données obtenues avec un modèle de placenta humain *ex vivo* indiquent que le ganciclovir traverse le placenta, fort probablement par simple diffusion. Le passage n'était pas saturable entre les concentrations de 1 et 10 mg/mL et se produisait par diffusion passive.

**Allaitement :** Nous ne disposons pas de données portant sur le ganciclovir dans les cas d'allaitement chez l'humain, mais les données recueillies chez des animaux indiquent que le ganciclovir est excrété dans le lait des rats femelles. Puisque de nombreux médicaments le sont, et comme des effets cancérigènes et tératogènes ont été observés chez les animaux traités par le ganciclovir, la survenue de réactions indésirables graves chez le nourrisson est jugée probable lors de l'administration de ganciclovir. Le ganciclovir ne doit donc pas être administré aux mères qui allaitent. Les mères doivent donc mettre fin à leur traitement pour allaiter ou mettre fin à l'allaitement pour recevoir du ganciclovir.

**Enfants :** L'innocuité et l'efficacité du ganciclovir chez l'enfant n'ont pas été établies. L'usage de ganciclovir chez l'enfant commande la plus grande prudence en raison de la probabilité d'effets cancérigènes à long terme et d'effets toxiques sur la reproduction. L'administration chez l'enfant ne doit être amorcée qu'après une évaluation minutieuse et uniquement si les avantages possibles du traitement l'emportent sur ces risques considérables.

L'expérience clinique concernant l'administration de ganciclovir pour injection pour le traitement de la rétinite à CMV chez les patients de moins de 12 ans est très limitée.

L'innocuité et l'efficacité du ganciclovir n'ont pas été évaluées pour le traitement des maladies à CMV congénitales ou néonatales, ni pour le traitement de l'infection à CMV chez les sujets non immunodéprimés (voir INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE).

**Personnes âgées :** Aucune étude n'a été menée sur l'efficacité et l'innocuité du ganciclovir chez les patients âgés. Compte tenu du fait que la fonction rénale peut être réduite chez les patients âgés et de l'importante excrétion rénale connue du ganciclovir, le risque de réactions toxiques à ce

médicament est plus accru chez les patients présentant un dysfonctionnement rénal. On doit administrer le ganciclovir avec prudence aux sujets âgés et porter une attention particulière à leur fonction rénale. **Il faut surveiller la fonction rénale et ajuster la posologie en conséquence** (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Insuffisance rénale).

**Insuffisance rénale :** La prudence s'impose lorsqu'on administre du ganciclovir aux insuffisants rénaux. La demi-vie plasmatique et les concentrations plasmatiques maximales du ganciclovir sont plus élevées chez les patients qui présentent de fortes concentrations sériques de créatinine.

**Insuffisance hépatique :** L'innocuité et l'efficacité du ganciclovir pour injection n'ont pas été étudiées chez les patients atteints d'insuffisance hépatique.

**Hémodialyse :** L'hémodialyse réduit les concentrations plasmatiques de ganciclovir d'environ 50 % après son administration intraveineuse pendant une séance de 4 heures (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Hémodialyse).

**Patients atteints d'une infection au VIH et de rétinite à CMV :** Le ganciclovir ne guérit pas la rétinite à CMV, de sorte que chez les patients immunodéprimés atteints, la rétinite peut évoluer durant ou après le traitement. Il faut recommander aux patients de se soumettre à un suivi ophtalmologique au moins toutes les 4 à 6 semaines pendant un traitement par le ganciclovir. Un suivi à intervalles plus courts s'imposera chez certains patients.

Les patients atteints du sida sont susceptibles de prendre de la zidovudine (ZDV); il faut les prévenir que la zidovudine et le ganciclovir peuvent causer tous les deux une neutropénie et une anémie, et que certains patients ne tolèrent pas leur administration concomitante (voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES).

**Receveurs de greffe :** Il faut renseigner les receveurs de greffe sur la fréquence élevée d'insuffisance rénale observée chez les receveurs de greffe traités par le ganciclovir pour injection au cours d'essais cliniques contrôlés, en particulier chez ceux qui recevaient concurremment des agents néphrotoxiques comme la cyclosporine et l'amphotéricine B. Bien que le mécanisme spécifique de cet effet toxique, réversible dans la plupart des cas, n'ait pas encore été élucidé, la fréquence plus élevée d'insuffisance rénale chez les patients qui ont reçu du ganciclovir pour injection plutôt qu'un placebo au cours des mêmes essais cliniques peut indiquer que le ganciclovir pour injection a joué un rôle important.

### **Surveillance et épreuves de laboratoire**

Vu la fréquence de neutropénie, d'anémie ou de thrombopénie observée chez les patients recevant du ganciclovir (voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES), on recommande d'effectuer fréquemment des hémogrammes et des numérations des plaquettes, particulièrement dans les cas où le ganciclovir ou tout autre analogue nucléosidique ont déjà causé une leucopénie, ou lorsque le nombre de neutrophiles au début du traitement est inférieur à 1000/ $\mu$ L.

Puisque la présence d'insuffisance rénale commande une modification de la posologie basée sur la clairance de la créatinine estimée et que des hausses des taux de créatinine sérique ont été observées chez les receveurs de greffe traités par le ganciclovir, il y a lieu de surveiller de près les

taux de créatinine sérique ou la clairance de la créatinine estimée (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Insuffisance rénale, et POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Surveillance des patients).

## **RÉACTIONS INDÉSIRABLES**

### **Réactions indésirables du médicament observées au cours des essais cliniques**

*Puisque les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières, les taux des réactions indésirables qui sont observés peuvent ne pas refléter ceux observés en pratique et ne doivent pas être comparés aux taux observés dans le cadre des essais cliniques portant sur un autre médicament. Les renseignements sur les réactions indésirables d'un médicament qui sont tirés d'essais cliniques s'avèrent utiles pour la détection des réactions indésirables d'un médicament et pour l'approximation des taux.*

Étant donné que le valganciclovir est un promédicament du ganciclovir, on peut s'attendre à ce que les réactions indésirables qui y sont associées surviennent aussi avec le ganciclovir. Par conséquent, le Tableau 1 fait état des réactions indésirables signalées lors de l'utilisation du ganciclovir injectable ou oral (forme non commercialisée) ou du valganciclovir.

Les réactions indésirables les plus graves et survenues le plus fréquemment chez les patients traités avec le ganciclovir/valganciclovir ont été des réactions hématologiques, notamment la neutropénie, l'anémie et la thrombocytopénie.

### **SUJETS ATTEINTS D'UNE INFECTION AU VIH**

Les fréquences présentées dans le tableau de réactions indésirables ci-après ont été obtenues auprès d'une population de sujets regroupés atteints d'une infection au VIH (n = 1 704) et recevant le ganciclovir (GAN1697, GAN1653, GAN2304, GAN1774, GAN2226, AVI034, GAN041) ou le valganciclovir (WV15376, WV15705) comme traitement d'entretien. L'agranulocytose, la granulocytopénie et la réaction anaphylactique font exception; dans leur cas, les fréquences ont été tirées de l'expérience postcommercialisation.

Le profil d'innocuité global du ganciclovir/valganciclovir observé chez les sujets atteints d'une infection au VIH concorde avec celui observé chez les receveurs de greffe, sauf que des cas de décollement de la rétine ont seulement été signalés chez des patients atteints à la fois d'une infection au VIH et d'une rétinite à CMV. Il y a toutefois des différences dans la fréquence de certaines réactions. Le ganciclovir administré par voie intraveineuse est associé à un risque moins élevé de diarrhée que le valganciclovir administré par voie orale. La pyrexie, les candidoses, la dépression, une neutropénie grave (NAN < 500 µL) et les réactions cutanées sont signalées plus fréquemment chez les patients atteints d'une infection au VIH. Des cas de dysfonction rénale et de dysfonction hépatique sont signalés plus fréquemment chez les receveurs de greffe.

**Tableau 1 Fréquence des réactions indésirables signalées chez les patients atteints d'une infection au VIH et recevant le ganciclovir ou le valganciclovir comme traitement d'entretien (n = 1 704).**

<b>Réaction indésirable au médicament Classe de systèmes d'organes (MedDRA)</b>	<b>Pourcentage</b>
<b><i>Infections et infestations :</i></b>	
Candidoses, y compris candidose buccale	22,42 %
Infection des voies respiratoires supérieures	16,26 %
Sepsie	6,92 %
Grippe	3,23 %
Infection des voies urinaires	2,35 %
Cellulite	1,47 %
<b><i>Système sanguin et lymphatique :</i></b>	
Neutropénie	26,12 %
Anémie	19,89 %
Thrombocytopénie	7,34 %
Leucopénie	3,93 %
Pancytopenie	1,06 %
Insuffisance médullaire	0,29 %
Anémie aplasique	0,06 %
Agranulocytose*	0,02 %
Granulocytopénie*	0,02 %
<b><i>Troubles du système immunitaire :</i></b>	
Hypersensibilité	1,12 %
Réaction anaphylactique*	0,02 %
<b><i>Troubles métaboliques et nutritionnels :</i></b>	
Diminution de l'appétit	12,09 %
Diminution du poids corporel	6,46 %
<b><i>Troubles psychiatriques :</i></b>	
Dépression	6,69 %
Confusion	2,99 %
Anxiété	2,64 %
Agitation	0,59 %
Psychose	0,23 %
Pensées anormales	0,18 %
Hallucinations	0,18 %
<b><i>Troubles du système nerveux :</i></b>	
Céphalées	17,37 %
Insomnie	7,22 %
Neuropathie périphérique	6,16 %
Étourdissements	5,52 %
Paresthésie	3,58 %
Hypoesthésie	2,58 %
Crises convulsives	2,29 %
Dysgueusie (altération du goût)	1,35 %

<b>Réaction indésirable au médicament</b> <b>Classe de systèmes d'organes</b> <b>(MedDRA)</b>	<b>Pourcentage</b>
Tremblements	0,88 %
<b><i>Troubles oculaires :</i></b>	
Déficience visuelle	7,10 %
Décollement de la rétine**	5,93 %
Corps flottants du vitré	3,99 %
Douleur oculaire	2,99 %
Conjonctivite	1,58 %
Œdème maculaire	1,06 %
<b><i>Troubles de l'oreille et du labyrinthe :</i></b>	
Otalgie	1,17 %
Surdit�	0,65 %
<b><i>Troubles cardiaques :</i></b>	
Arythmies	0,47 %
<b><i>Troubles vasculaires :</i></b>	
Hypotension	2,05 %
<b><i>Troubles respiratoires, thoraciques et m�diastinaux :</i></b>	
Toux	18,31 %
Dyspn�e	11,80 %
<b><i>Troubles gastro-intestinaux :</i></b>	
Diarrh�e	34,27 %
Naus�es	26,35 %
Vomissements	14,85 %
Douleur abdominale	10,97 %
Dyspepsie	4,81 %
Flatulence	4,58 %
Douleur abdominale haute	4,58 %
Constipation	3,70 %
Ulc�ration buccale	3,17 %
Dysphagie	2,93 %
Ballonnement abdominal	2,41 %
Pancr�atite	1,64 %
<b><i>Troubles h�patobiliaires :</i></b>	
Augmentation des phosphatases alcalines dans le sang	3,58 %
Anomalie fonctionnelle h�patique	3,23 %
Augmentation des taux d'aspartate aminotransf�rase	1,88 %
Augmentation des taux d'alanine aminotransf�rase	1,23 %
<b><i>Troubles de la peau et des tissus sous-cutan�s :</i></b>	
Dermatite	11,80 %
Sueurs nocturnes	7,92 %
Prurit	4,58 %
�ruption cutan�e	2,52 %
Alop�cie	1,29 %
Peau s�che	0,94 %

<b>Réaction indésirable au médicament Classe de systèmes d'organes (MedDRA)</b>	<b>Pourcentage</b>
Urticaire	0,70 %
<b><i>Troubles de l'appareil locomoteur et des tissus conjonctifs :</i></b>	
Dorsalgie	4,46 %
Myalgie	3,52 %
Arthralgie	3,35 %
Spasmes musculaires	2,99 %
<b><i>Troubles rénaux et urinaires :</i></b>	
Dysfonction rénale	2,52 %
Diminution de la clairance rénale de la créatinine	2,35 %
Augmentation de créatininémie	1,88 %
Atteinte rénale	0,76 %
Hématurie	0,70 %
<b><i>Troubles du système de reproduction et des seins :</i></b>	
Infertilité chez l'homme	0,23 %
<b><i>Troubles d'ordre général et réactions au point d'administration :</i></b>	
Pyrexie	33,51 %
Fatigue	18,96 %
Réaction au point d'injection	6,98 %
Douleur	5,81 %
Frissons	5,40 %
Malaise	2,11 %
Asthénie	2,00 %
Douleur thoracique	0,88 %

\* Dans les cas de ces réactions indésirables, les fréquences ont été tirées de l'expérience postcommercialisation.

\*\* Le décollement de la rétine a seulement été signalé lors d'études menées auprès de patients infectés par le VIH qui recevaient du ganciclovir pour traiter une rétinite à CMV.

Les manifestations indésirables survenues pendant les essais cliniques portant sur le ganciclovir pour injection sont résumées ci-après selon les diverses populations de sujets ayant participé aux essais.

Les manifestations indésirables observées pendant les études sur le ganciclovir pour injection pouvaient aussi survenir lors des études sur les gélules de ganciclovir, et vice versa. L'innocuité du ganciclovir pour injection chez les patients porteurs du VIH-1 a fait l'objet de plusieurs études cliniques. Les tableaux qui suivent résument les données collectées dans le cadre de six essais cliniques, sur l'innocuité de l'administration de ganciclovir pour injection pour le traitement des maladies à CMV chez les patients infectés par le VIH. Ces données sont présentées en comparaison avec celles du groupe témoin (placebo oral plus implant intravitréen de ganciclovir) de l'une de ces études. Les réactions indésirables cliniques qui sont survenues chez au moins 2 % des patients sous ganciclovir intraveineux, quelles que soient la relation causale et la gravité, et plus souvent dans ce groupe que dans le groupe témoin sont résumées dans le Tableau 2.

**Tableau 2 : Réactions indésirables survenues chez  $\geq 2\%$  des patients recevant du ganciclovir sous forme intraveineuse**

<b>Appareil ou système</b> Réaction indésirable	<b>Ganciclovir intraveineux</b> N = 412	<b>Groupe témoin</b> N = 119
<b>Système sanguin et lymphatique</b>		
Neutropénie	25,7 %	11,8 %
Anémie	19,7 %	16,8 %
Thrombopénie	6,6 %	5,0 %
Leucopénie	3,2 %	0,8 %
Lymphadénopathie	2,9 %	1,7 %
<b>Appareil digestif</b>		
Diarrhée	26,5 %	24,4 %
Nausées	-	21,8 %
Vomissements	-	12,6 %
Douleur abdominale	9,0 %	7,6 %
Flatulence	-	1,7 %
Selles molles	-	1,7 %
Dysphagie	2,7 %	1,7 %
Candidose œsophagienne	2,2 %	1,7 %
<b>Organisme entier</b>		
Pyrexie	35,9 %	35,3 %
Céphalées	18,7 %	16,0 %
Candidose	10,4 %	4,2 %
Infection au point d'injection	8,0 %	0,8 %
Sepsie	6,1 %	3,4 %
Sepsie secondaire	5,8 %	-
Anorexie	4,9 %	-
Complexe <i>Mycobacterium avium</i>	4,9 %	4,2 %
Douleur	4,6 %	2,5 %
Douleur thoracique	4,4 %	3,4 %
Malaises	-	0,8 %
Asthénie	-	0,8 %
Culture sanguine positive	3,2 %	1,7 %
Inflammation au point d'injection	2,2 %	-
<b>Système nerveux central et périphérique</b>		
Confusion	-	2,5 %
Hypoesthésie	3,2 %	1,7 %
Anxiété	2,4 %	1,7 %
<b>Peau et annexes cutanées</b>		
Prurit	3,2 %	2,5 %
<b>Appareil respiratoire</b>		
Toux	16,0 %	15,1 %

<b>Appareil ou système</b>	<b>Ganciclovir intraveineux</b>	<b>Groupe témoin</b>
Réaction indésirable	N = 412	N = 119
Pneumonie à <i>Pneumocystis carinii</i>	7,3 %	2,5 %
Toux grasse	3,6 %	2,5 %
Infection des voies respiratoires supérieures	-	0,8 %
Infection des voies respiratoires inférieures	-	1,7 %
Congestion sinusale	3,4 %	2,5 %
<b>Troubles métaboliques et nutritionnels</b>		
Augmentation des phosphatases alcalines dans le sang	4,4 %	4,2 %
Augmentation de la créatininémie	3,2 %	1,7 %
<b>Appareil locomoteur</b>		
Arthralgie	2,4 %	1,7 %

### ***Décollement de la rétine***

Un décollement de la rétine a été observé chez des patients atteints de rétinite à CMV avant et après le début du traitement par le ganciclovir pour injection. Le lien entre le décollement de la rétine et l'administration de ganciclovir pour injection est inconnu. Un décollement de la rétine a été observé chez 11 % des patients traités par le ganciclovir pour injection et chez 8 % des patients traités par le ganciclovir en gélules. Les patients atteints de rétinite à CMV doivent être soumis à un suivi ophtalmologique fréquent destiné à surveiller l'état de la rétinite et à déceler toute autre lésion rétinienne.

Les anomalies biologiques constatées au cours de trois essais cliniques chez des patients infectés par le VIH et recevant du ganciclovir oral ou intraveineux pour le traitement d'entretien de la rétinite à CMV sont énumérées ci-dessous. Trois cent vingt-six patients recevant les gélules de ganciclovir et 179 patients recevant de ganciclovir pour injection pouvaient être pris en compte dans cette analyse.

### **Tableau 3 : Résultats des épreuves de laboratoire**

**Valeurs minimales du nombre absolu de neutrophiles (NAN), de la concentration en hémoglobine et du nombre de plaquettes et valeurs maximales de la créatinine sérique pendant un traitement par le ganciclovir pour injection et des gélules de ganciclovir au cours de trois essais cliniques contrôlés\***

	<b>% de sujets Gélules de ganciclovir† (3 000 mg/jour par voie orale) (n = 326)</b>	<b>% de sujets Solution intraveineuse‡ (5 mg/kg/jour) (n = 179)</b>
<b>Neutropénie [n(%)]</b>		
<b>NAN/μL</b>		
< 500	18,4	25,1
500 à < 750	16,6	14,3
750 à < 1 000	19,1	26,3
<b>Anémie [n(%)]</b>		
<b>Hémoglobine g/dL</b>		
< 6,5	1,6	4,6
6,5 à < 8,0	10,0	16,0



	<b>% de sujets Gélules de ganciclovir† (3 000 mg/jour par voie orale) (n = 326)</b>	<b>% de sujets Solution intraveineuse‡ (5 mg/kg/jour) (n = 179)</b>
8,0 à < 9,5	24,7	25,7
<b>Thrombopénie Plaquettes/μL</b>		
< 25 000	1,3	2,9
25 000 à < 50 000	8,1	5,1
50 000 à < 100 000	20,0	22,9
<b>Créatinine sérique (CrSé) CrSé mg/dL</b>		
≥ 2,5	0,9	1,7
≥ 1,5 à < 2,5	12,2	13,9

\* Données regroupées provenant des études ICM 1653, ICM 1774 et AVI034.

† Durée moyenne du traitement = 103 jours, incluant les périodes prévues pour la reprise du traitement d'induction.

‡ Durée moyenne du traitement = 91 jours, incluant les périodes prévues pour la reprise du traitement d'induction.

Dans l'ensemble, les patients traités par le ganciclovir pour injection ont présenté un nombre absolu de neutrophiles minimal et une concentration d'hémoglobine moindres comparativement à ceux qui ont reçu des gélules de ganciclovir, ce qui est compatible avec une aggravation de la neutropénie et de l'anémie ( $p = 0,024$  pour la neutropénie;  $p = 0,027$  pour l'anémie).

Chez la majorité des sujets, les taux maximaux de créatinine sérique étaient inférieurs à 1,5 mg/dL; en ce qui concerne la manifestation d'insuffisance rénale, aucune différence n'a été observée entre l'administration des deux présentations de ganciclovir. Des hausses des taux de créatinine sérique  $\geq 2,5$  mg/dL sont survenues chez moins de 2 % des sujets, et aucune différence importante n'a été notée dans le délai entre le début du traitement d'entretien et la survenue des hausses des taux de créatinine sérique.

## RECEVEURS DE GREFFE

Plusieurs essais cliniques ont examiné l'administration intraveineuse de ganciclovir pour le traitement ou la prévention des maladies à CMV chez les receveurs de greffe.

Le tableau suivant résume les réactions indésirables cliniques qui sont survenues chez au moins 5 % des patients prenant le ganciclovir i.v. dans trois études réunies sur la greffe de moelle osseuse, quelles que soient la relation causale et la gravité. Les réactions indésirables qui sont survenues à une fréquence plus élevée dans le groupe témoin d'observation / sous placebo que dans le groupe sous ganciclovir i.v. n'y figurent pas.

**Tableau 4 : Réactions indésirables survenues chez  $\geq 5\%$  des patients prenant le ganciclovir i.v.**

Appareil ou système Réaction indésirable	Receveurs de greffe de moelle osseuse (ICM 1308, 1570 et 1689)	
	Ganciclovir i.v. (N = 122)	Groupe placebo/d'observation (N = 120)
<b>Système sanguin et lymphatique</b>		
Pancytopénie	31 %	25 %
Leucopénie	20 %	7 %
<b>Organisme entier</b>		
Céphalées	15 %	13 %
Trouble d'une muqueuse	14 %	13 %
Pyrexie	11 %	8 %
Frissons	7 %	4 %
Sepsie	7 %	2 %
Anorexie	7 %	5 %
Œdème facial	5 %	2 %
<b>Appareil digestif</b>		
Diarrhée	24 %	23 %
Nausées	20 %	19 %
Dyspepsie	8 %	6 %
Ballonnement abdominal	8 %	6 %
<b>Troubles métaboliques et nutritionnels</b>		
Hausse de la créatininémie	16 %	13 %
Anomalie fonctionnelle hépatique	11 %	10 %
Diminution de la magnésémie	11 %	10 %
Hypocalcémie	9 %	8 %
Hypokaliémie	9 %	8 %
<b>Système nerveux central et périphérique</b>		
Tremblements	8 %	7 %
Confusion	5 %	3 %
<b>Peau et annexes cutanées</b>		
Dermatite exfoliative	10 %	9 %
<b>Appareil respiratoire</b>		
Rhinite	9 %	5 %
Dyspnée	6 %	4 %
<b>Appareil cardiovasculaire</b>		
Tachycardie	16 %	15 %
Hypotension	11 %	7 %
<b>Appareil génito-urinaire</b>		
Hématurie (présence)	16 %	13 %
<b>Organes des sens</b>		
Hémorragie oculaire	5 %	3 %
<b>Appareil locomoteur</b>		
Myalgie	5 %	3 %

Les réactions indésirables cliniques qui sont survenues chez au moins 5 % des patients recevant du ganciclovir i.v. pendant une étude contrôlée par placebo, sur la greffe cardiaque (ICM 1496),

quelles que soient la relation causale et la gravité, et plus souvent dans le groupe sous ganciclovir i.v. (n = 76) que dans celui sous placebo (n = 73) sont énumérées ci-dessous.

*Organisme entier* : céphalées (18 %), infection (18 %).

*Troubles métaboliques et nutritionnels* : œdème (9 %).

*Système nerveux central et périphérique* : confusion (5 %), neuropathie périphérique (7 %).

*Appareil respiratoire* : épanchement pleural (5 %).

*Appareil cardiovasculaire* : hypertension (20 %).

*Appareil génito-urinaire* : dysfonctionnement rénal (14 %), atteinte rénale (12 %).

### **Réactions indésirables survenues moins fréquemment dans les essais cliniques (< 1 %)**

Les réactions indésirables pertinentes qui ne sont pas énumérées ci-dessus, parce qu'elles ne répondaient pas aux critères d'inclusion dans l'un ou l'autre des tableaux précédents, apparaissent ci-dessous.

**Organisme entier** : cachexie, déshydratation, fatigue, abcès au point d'injection, œdème au point d'injection, hémorragie au point d'injection, douleur au point d'injection, thrombose au point d'injection, malaises, réaction de photosensibilité.

**Appareil digestif** : pancréatite, trouble gastro-intestinal, hémorragie gastro-intestinale, éructation, œsophagite, incontinence fécale, gastrite, ulcération buccale, trouble lingual.

**Système sanguin et lymphatique** : anémie aplasique, insuffisance médullaire osseuse, éosinophilie, splénomégalie.

**Système nerveux central et périphérique** : hallucinations, trouble psychotique, humeur euphorique, trouble émotionnel, syndrome hyperkinétique, secousses myocloniques, rêves anormaux, agitation, amnésie, ataxie, coma, crises convulsives, sécheresse de la bouche, hypertonie, diminution de la libido, nervosité, somnolence, troubles de la pensée.

**Peau et annexes cutanées** : dermatite, acné, alopécie, sécheresse cutanée, herpès, urticaire.

**Organes des sens** : décollement de la rétine, troubles de la vue, otalgie, cécité, surdité, douleur oculaire, glaucome, acouphène, troubles du corps vitré.

**Troubles métaboliques et nutritionnels** : hausse de la créatine phosphokinase sanguine, hausse de la glycémie, hausse de la déshydrogénase lactique sanguine.

**Appareil cardio-vasculaire** : arythmie (y compris arythmie ventriculaire), thrombophlébite profonde, phlébite, migraine.

**Appareil génito-urinaire** : impuissance, pollakiurie.

**Appareil locomoteur** : syndrome myasthénique.

**Infections :** manifestations reliées à l'insuffisance médullaire osseuse et à l'immunodéficience telles qu'infections locales ou générales et sepsie.

**Complications hémorragiques :** saignement associé à la thrombopénie et susceptible de menacer la vie.

**Système hépatique :** hépatite, ictère.

### **Anomalies dans les résultats des épreuves hématologiques et biochimiques**

Les résultats des épreuves de laboratoire de trois essais cliniques contrôlés sur l'administration de ganciclovir pour injection pour la prévention des maladies à CMV chez les receveurs de greffe sont résumés ci-après.

**Tableau 5 : Résultats des épreuves de laboratoire**

**Incidence de neutropénie et de thrombopénie dans des essais pour la prévention des maladies à CMV chez des receveurs de greffe**

	<b>Ganciclovir intraveineux*</b>			
	<b>Allogreffe cardiaque§</b>		<b>Allogreffe médullaire†</b>	
	<b>Ganciclovir</b>	<b>Placebo</b>	<b>Ganciclovir</b>	<b>Placebo</b>
<b>Sujets (nombre)</b>	<b>n = 76</b>	<b>n = 73</b>	<b>n = 57</b>	<b>n = 55</b>
<b>Neutropénie (plaquettes/<math>\mu</math>L)</b>				
< 500	4 %	3 %	12 %	6 %
500 – 1 000	3 %	8 %	29 %	17 %
<b>Thrombopénie (plaquettes/<math>\mu</math>L)</b>				
< 25 000	3 %	1 %	32 %	28 %
25 000 - 50 000	5 %	3 %	25 %	37 %

§ Étude ICM 1496 : Durée moyenne du traitement = 28 jours

† Études ICM 1570 et ICM 1689 : Durée moyenne du traitement = 45 jours

\* ganciclovir sodique pour injection

Le tableau suivant montre la fréquence des taux élevés de créatinine sérique au cours de ces essais cliniques contrôlés.

**Tableau 6 : Résultats des épreuves de laboratoire****Élévations de la créatinine sérique constatées lors d'essais sur la prévention des maladies à CMV chez les receveurs de greffe**

	Ganciclovir intraveineux*					
	Allogreffe cardiaque		Allogreffe médullaire			
	ICM 1496		ICM 1570		ICM 1689	
Taux maximaux de créatinine sérique	Ganciclovir (n = 76)	Placebo (n = 73)	Ganciclovir (n = 20)	Témoin (n = 20)	Ganciclovir (n = 37)	Placebo (n = 35)
Créatinine sérique (≥ 2,5 mg/dL)	18 %	4 %	20 %	0 %	0 %	0 %
Créatinine sérique (≥ 1,5 - < 2,5 mg/dL)	58 %	69 %	50 %	35 %	43 %	44 %

\* ganciclovir pour injection

Les taux de créatinine sérique étaient élevés chez les patients qui avaient reçu le ganciclovir pour injection par rapport aux patients qui avaient reçu un placebo. La plupart des patients qui ont participé à ces études ont également reçu de la cyclosporine. Le mécanisme à l'origine de ce dysfonctionnement rénal est inconnu. Il est cependant essentiel de surveiller rigoureusement la fonction rénale au cours d'un traitement par le ganciclovir pour injection, surtout chez les patients qui reçoivent des agents concomitants susceptibles d'entraîner des effets néphrotoxiques.

**Description de certaines des réactions indésirables**

**Neutropénie :** Le nombre de neutrophiles avant l'instauration du traitement ne permet pas de prédire le risque de neutropénie. La neutropénie survient typiquement au cours de la première ou deuxième semaine du traitement d'induction. Le nombre de cellules revient habituellement à la normale en 2 à 5 jours après l'arrêt du traitement ou la réduction de la dose (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hématologie).

**Thrombocytopénie :** Le risque de thrombocytopénie est plus élevé chez les patients dont la numération plaquettaire est faible au départ (< 100 000/μL). Les patients présentant une immunosuppression iatrogène due à l'utilisation de médicaments immunosuppresseurs sont plus susceptibles de devenir thrombocytopéniques que les patients infectés par le VIH (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hématologie). Une thrombocytopénie marquée s'accompagne parfois d'une hémorragie mettant la vie en danger.

**Réactions indésirables signalées après la commercialisation**

Les réactions indésirables qui suivent ont été signalées depuis la commercialisation du ganciclovir pour injection et ne sont pas énumérées dans la liste présentée ci-dessus. Comme ces réactions indésirables sont signalées volontairement par une population dont on ne connaît pas la taille, on ne peut pas estimer leur fréquence. On a choisi d'énumérer ces réactions soit à cause de l'ampleur de la fréquence avec laquelle elles ont été signalées, soit à cause d'une relation de cause à effet apparente, soit à cause de ces deux facteurs.

*Troubles du système sanguin et lymphatique :* anémie hémolytique, syndrome hémolytique et

urémique

*Troubles cardiaques* : arrêt cardiaque, anomalie de la conduction cardiaque, ischémie, torsade de pointe, tachycardie ventriculaire

*Troubles du système nerveux central et périphérique* : réaction extrapyramidale, hallucinations, perte de l'odorat, paralysie périphérique du nerf moteur oculaire commun

*Troubles congénitaux, familiaux et génétiques* : anomalie congénitale

*Troubles oculaires* : cataractes, sécheresse oculaire

*Troubles gastro-intestinaux* : cholélithiase, cholostase, ulcération intestinale

*Troubles hépatiques* : insuffisance hépatique, hépatite

*Troubles du système immunitaire* : réaction allergique, réaction anaphylactique

*Troubles métaboliques et nutritionnels* : acidose, taux élevés de triglycérides, hyponatrémie, concentration sérique inappropriée d'hormone antidiurétique (ADH), hypercalcémie

*Troubles de l'appareil locomoteur et des tissus conjonctifs* : arthrite, rhabdomyolyse

*Troubles du système nerveux* : dysesthésie, paralysie faciale, hypertension intracrânienne, perte de mémoire, myélopathie, dysphasie

*Troubles du système de reproduction et des seins* : stérilité, hypotrophie testiculaire

*Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux* : bronchospasme, fibrose pulmonaire

*Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés* : dermatite exfoliative, syndrome de Stevens-Johnson

*Circonstances sociales* : irritabilité

*Troubles de l'appareil génito-urinaire* : trouble tubulaire rénal

*Troubles vasculaires* : accident vasculaire cérébral, vasculite

L'anaphylaxie et une réduction de la fertilité masculine sont des réactions indésirables qui ont fait l'objet de rapports de pharmacovigilance sur l'administration de ganciclovir à des patients infectés par le VIH ou à d'autres patients immunodéficients, comme des receveurs de greffe, qui ne sont pas mentionnées précédemment et pour lesquelles une réaction causale ne peut pas être exclue.

#### Femmes et hommes aptes à procréer

Des études menées chez les animaux ont montré que le ganciclovir altère la fertilité. Dans le cadre

d'une étude clinique, des receveurs de greffe rénale traités par le valganciclovir (un promédicament du ganciclovir) en prophylaxie contre l'infection à CMV pendant une période allant jusqu'à 200 jours ont été comparés à un groupe témoin non traité. La spermatogenèse a été inhibée pendant le traitement par le valganciclovir. Au moment du suivi, environ 6 mois après l'interruption du traitement, la densité moyenne du sperme chez les patients traités a été semblable à celle observée dans le groupe témoin non traité. Après la fin du traitement, dans le groupe valganciclovir, le nombre de spermatozoïdes a été normal chez les 7 patients qui avaient un sperme de densité normale et chez 8 des 13 patients qui avaient un sperme de faible densité au début de l'étude. À la fin du suivi dans le groupe témoin, la densité du sperme a été normale chez les 6 patients qui avaient un sperme de densité normale et chez 2 des 4 patients qui avaient un sperme de faible densité au début de l'étude.

## **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

### ***Ganciclovir***

Comme le ganciclovir ne se fixe aux protéines plasmatiques que dans une proportion de 1 à 2 %, on ne prévoit pas d'interactions mettant en jeu le déplacement d'un médicament de ses sites de fixation.

### ***Zidovudine***

Lorsqu'on a administré 1 000 mg de ganciclovir en gélules toutes les 8 heures, on a observé que l'aire sous la courbe de concentration du ganciclovir (ASC) avait tendance à diminuer en présence de la zidovudine, administrée à raison de 100 mg toutes les 4 heures (18 %), mais cette diminution n'était pas statistiquement significative. L'aire sous la courbe de concentration de la zidovudine a augmenté de façon significative sur le plan statistique (15 %) en présence de ganciclovir.

Comme la zidovudine et le ganciclovir peuvent tous deux causé de la neutropénie et de l'anémie, de nombreux patients ne toléreront pas un traitement d'association à la posologie habituelle de ces deux médicaments. Une interaction pharmacodynamique pourrait se produire lors de l'administration concomitante de ces médicaments.

### ***Didanosine***

Lorsqu'on a administré 1 000 mg de ganciclovir par voie orale (gélules) toutes les 8 heures, l'aire sous la courbe de concentration de la didanosine (200 mg toutes les 12 heures) à l'état d'équilibre (ASC<sub>0-12</sub>) a augmenté d'environ 80 % quand la didanosine a été administrée 2 heures avant ou concurremment avec le ganciclovir en gélules. On a observé une diminution de l'aire sous la courbe de concentration de ganciclovir à l'état d'équilibre (23 %) en présence de didanosine lorsque celle-ci a été administrée 2 heures avant les gélules de ganciclovir, mais l'ASC n'a pas été modifiée par la présence de didanosine lorsque les deux médicaments ont été administrés simultanément. On n'a observé aucune modification importante de la clairance rénale de l'un ou l'autre des deux médicaments.

Lorsque la dose d'induction standard de ganciclovir pour injection (perfusion de 5 mg/kg pendant 1 heure, toutes les 12 heures) était administrée en concomitance avec de la didanosine (200 mg toutes les 12 heures) par voie orale, à l'état d'équilibre, on a constaté que l'ASC<sub>0-12</sub> de didanosine

augmentait de  $70 \pm 40$  % (intervalle, 3 à 121 %, n = 11) et que la  $C_{\max}$  augmentait de  $49 \pm 48$  % (intervalle, -28 à 125 %). Dans une autre étude, lorsque la dose d'entretien standard de ganciclovir pour injection (perfusion de 5 mg/kg pendant 1 heure, toutes les 24 heures) était administrée en concomitance avec de la didanosine (200 mg toutes les 12 heures) par voie orale, à l'état d'équilibre, on a constaté que l' $ASC_{0-12}$  de didanosine augmentait de  $50 \pm 26$  % (intervalle, 22 à 110 %, n = 11) et que la  $C_{\max}$  augmentait de  $36 \pm 36$  % (intervalle, -27 à 94 %) entre la première et la deuxième dose de didanosine. La concentration plasmatique de didanosine ( $ASC_{12-24}$ ) est restée inchangée durant les intervalles posologiques lorsque ganciclovir pour injection n'était pas administré en concomitance. La pharmacocinétique du ganciclovir n'était pas modifiée par la didanosine. Aucun changement significatif de la clairance rénale des deux médicaments n'a été observé, que ce soit dans une étude comme dans l'autre.

Lors de l'administration intraveineuse de doses de 5 et 10 mg/kg/jour, on a observé une augmentation de 38 à 67 % de l'ASC de la didanosine, ce qui confirme la survenue d'une interaction pharmacocinétique pendant la coadministration de ces médicaments. L'augmentation de la concentration plasmatique de didanosine ne peut pas être expliquée par une compétition pour la sécrétion tubulaire rénale, puisque le pourcentage d'excrétion de la dose de didanosine a augmenté. Elle pourrait découler d'une augmentation de la biodisponibilité ou d'une réduction du métabolisme. Il n'en reste pas moins qu'en raison de l'augmentation de la concentration plasmatique de didanosine en présence de ganciclovir, il faut suivre les patients de près afin de détecter toute toxicité liée à la didanosine (d.-à-d. une pancréatite).

La didanosine a été associée à la pancréatite. Au cours de trois essais contrôlés, une pancréatite a été signalée chez 2 % des patients prenant de la didanosine et du ganciclovir pour injection. La fréquence de la pancréatite était semblable dans les groupes traités par la solution intraveineuse et les gélules.

À part les résultats anormaux des épreuves de laboratoire, le traitement concomitant par la zidovudine, la didanosine ou la zalcitabine n'a pas semblé modifier le type ni la fréquence des réactions indésirables signalées, à l'exception d'une augmentation modérée de la fréquence de diarrhée. Chez les patients qui prenaient du ganciclovir pour injection, la fréquence de diarrhée était de 51 % et 49 %, respectivement, avec la didanosine comparativement à 39 % et à 35 %, respectivement, sans didanosine.

### ***Stavudine***

Aucune interaction pharmacocinétique statistiquement significative n'a été mise en évidence quand la stavudine et le ganciclovir oral ont été administrés en même temps.

### ***Triméthoprime***

Le triméthoprime a diminué de manière statistiquement significative (de 16,3 %) la clairance rénale du ganciclovir oral, et cette diminution s'accompagnait d'une réduction statistiquement significative de la vitesse d'élimination terminale et d'une augmentation correspondante (de 15 %) de la demi-vie. Ces changements ont cependant peu de chances d'avoir une importance clinique, puisque l' $ASC_{0-8}$  et la  $C_{\max}$  sont restés les mêmes. Le seul changement statistiquement significatif de la pharmacocinétique du triméthoprime qui a été observé lors de l'administration concomitante de ganciclovir était une augmentation de la  $C_{\min}$ . Comme il est peu probable que cette augmentation soit cliniquement pertinente, un ajustement posologique n'est pas recommandé.



### ***Cyclosporine***

D'après la comparaison des concentrations minimales de cyclosporine, l'administration de ganciclovir ne semble pas modifier la pharmacocinétique de la cyclosporine. Une augmentation de la créatininémie maximale a toutefois été observée après la mise en route du traitement par le ganciclovir.

### ***Association imipénem-cilastatine***

Des crises convulsives ont été signalées chez des patients qui recevaient du ganciclovir pour injection ainsi que l'association imipénem-cilastatine. Il faut tenir compte de la possibilité d'une interaction pharmacodynamique entre ces deux médicaments. Il ne faut pas administrer ces médicaments concurremment, à moins que les avantages possibles l'emportent sur les risques.

### ***Mofétilmycophénolate***

Après l'administration d'une dose unique à douze receveurs de greffe rénale stables, aucune interaction pharmacocinétique n'a été observée entre le mofétilmycophénolate (1,5 g) et le ganciclovir pour injection (5 mg/kg). La moyenne ( $\pm$  écart type) de l'aire sous la courbe de la concentration sérique en fonction du temps (ASC) du ganciclovir était de 54,3 ( $\pm$  19,0)  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$  après l'administration concomitante des deux médicaments comparativement à 51,0 ( $\pm$  17,0)  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$  après l'administration de ganciclovir sodique pour injection seul. La moyenne ( $\pm$  écart type) des concentrations sériques maximales ( $C_{\text{max}}$ ) du ganciclovir était de 11,5 ( $\pm$  1,8)  $\mu\text{g}/\text{mL}$  après l'administration conjointe des deux médicaments par rapport à 10,6 ( $\pm$  2,0)  $\mu\text{g}/\text{mL}$  après l'administration de ganciclovir sodique pour injection seul. Les moyennes ( $\pm$  écart type) de l'ASC et de la  $C_{\text{max}}$  de l'AMP (métabolite actif du mycophénolate) étaient respectivement de 80,9 ( $\pm$  21,6)  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$  et de 27,8 ( $\pm$  13,9)  $\mu\text{g}/\text{mL}$  après la coadministration des deux médicaments comparativement à 80,3 ( $\pm$  16,4)  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$  et à 30,9 ( $\pm$  11,2)  $\mu\text{g}/\text{mL}$  après l'administration du mofétilmycophénolate seul. Toutefois, d'après les effets connus de l'insuffisance rénale sur la pharmacocinétique du ganciclovir et du mycophénolate, on s'attend à ce que l'administration concomitante de ces deux médicaments entraîne une augmentation des concentrations de ganciclovir et de GAMP (métabolite inactif du mycophénolate), car il y a compétition entre ces deux médicaments au niveau des mécanismes de sécrétion tubulaire rénale. Chez les insuffisants rénaux qui reçoivent conjointement du ganciclovir et du mycophénolate, il convient d'observer les recommandations posologiques s'appliquant au ganciclovir et de surveiller étroitement les patients.

### ***Probenécide***

Lorsqu'on a administré 1 000 mg de ganciclovir en gélules toutes les 8 heures, les concentrations sériques de ganciclovir ont augmenté de 45 % en présence de probénécide administré à raison de 500 mg toutes les 6 heures. La clairance rénale du ganciclovir a diminué de 22 %, ce qui est compatible avec une interaction comportant une compétition pour la sécrétion tubulaire rénale. Il faut suivre les patients traités par le probénécide et le ganciclovir en gélules de près afin de détecter toute toxicité liée au ganciclovir.

Il est possible que les médicaments qui inhibent la réplication des populations de cellules à division rapide comme les spermatogonies, les cellules de la moelle osseuse et celles des couches germinales de la peau et de la muqueuse gastro-intestinale entraînent des effets toxiques additifs lorsqu'ils sont administrés concurremment avec le ganciclovir. Il est aussi possible que la coadministration de ganciclovir et d'autres médicaments myélosuppresseurs ou associés à une

insuffisance rénale augmente la toxicité. C'est pourquoi l'administration concomitante de ganciclovir et de médicaments associés à une myélosuppression ou à une insuffisance rénale, y compris les analogues nucléosidiques (comme la zidovudine, la didanosine et la stavudine), les immunosuppresseurs (comme la cyclosporine, le tacrolimus et le mofétilmycophénolate), les agents antinéoplasiques (comme la doxorubicine, la vincristine, la vinblastine et l'hydroxyurée) et les anti-infectieux (comme l'association du triméthoprime aux sulfamides, la dapsone, l'amphotéricine B, la flucytosine et la pentamidine) ne doit être envisagée que si l'on juge que les avantages possibles du traitement l'emportent sur les risques.

Étant donné que l'excrétion rénale à la fois par filtration glomérulaire et par sécrétion tubulaire active constitue la voie d'élimination du ganciclovir (voir MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Pharmacocinétique, Excrétion), il se peut que la coadministration du ganciclovir et de médicaments partageant la voie de sécrétion tubulaire modifie les concentrations plasmatiques du ganciclovir ou du médicament coadministré.

Les receveurs d'allogreffe traités par le ganciclovir pour injection lors de trois études cliniques contrôlées ont reçu également une variété de médicaments concomitants, dont l'amphotéricine B, l'azathioprine, la cyclosporine, le muromonab-CD3 (OKT3) et/ou la prednisone. On a observé des hausses de la créatinine sérique chez des patients recevant du ganciclovir conjointement avec de la cyclosporine ou de l'amphotéricine B, deux médicaments qui présentent un risque connu de néphrotoxicité (voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES). Dans une étude rétrospective chez 93 receveurs d'une allogreffe du foie auxquels on a administré du ganciclovir (perfusion de 5 mg/kg sur 1 heure, toutes les 12 heures) et de la cyclosporine (à des doses thérapeutiques), on n'a remarqué aucun effet sur la concentration sanguine de la cyclosporine.

## **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

### **Considérations posologiques**

**Ne pas administrer le ganciclovir pour injection USP par injection intraveineuse rapide ou bolus. Les concentrations plasmatiques excessives peuvent accroître la toxicité du ganciclovir.**

**L'injection intramusculaire ou sous-cutanée peut causer une grave irritation tissulaire en raison du pH élevé (environ 11) des solutions de ganciclovir pour injection USP.**

**Le ganciclovir pour injection USP doit être reconstitué et dilué sous la supervision d'un professionnel de la santé et administré en perfusion intraveineuse (voir ENTREPOSAGE ET STABILITÉ, Directives particulières de manipulation).**

### **Posologie recommandée et ajustement posologique**

**Ne pas dépasser la dose recommandée de ganciclovir pour injection USP. Ne pas non plus dépasser la vitesse de perfusion recommandée pour la solution de ganciclovir pour injection USP.**

Compte tenu des variations individuelles relatives à la réponse clinique des maladies à CMV et à la sensibilité aux effets myélosuppresseurs du ganciclovir pour injection, le traitement par le ganciclovir pour injection USP devra être adapté à chaque cas. Les modifications posologiques doivent reposer sur des évaluations cliniques et une surveillance hématologique régulières.

### ***Traitement de la rétinite à CMV :***

#### **Traitement d'induction**

La dose de ganciclovir pour injection USP recommandée chez les patients bénéficiant d'une fonction rénale normale est de 5 mg/kg toutes les 12 heures pendant 14 à 21 jours, administrée en perfusion intraveineuse continue d'une heure.

#### **Traitement d'entretien**

À la suite du traitement d'induction, la dose de ganciclovir pour injection USP recommandée est de 5 mg/kg en perfusion intraveineuse d'une heure une fois par jour à raison de sept jours par semaine, ou de 6 mg/kg une fois par jour à raison de cinq jours par semaine.

Chez les patients dont la rétinite à CMV continue d'évoluer pendant le traitement d'entretien par le ganciclovir pour injection USP, on recommande de reprendre le traitement d'induction par l'administration biquotidienne de ganciclovir pour injection USP.

### ***Prévention des maladies à CMV chez les receveurs de greffe***

La dose initiale recommandée chez les patients dont la fonction rénale est normale est de 5 mg/kg (administrés par voie intraveineuse à une vitesse constante pendant une heure) toutes les 12 heures pendant 7 à 14 jours, suivie soit par 5 mg/kg une fois par jour à raison de sept jours par semaine, ou par 6 mg/kg une fois par jour à raison de cinq jours par semaine.

La durée du traitement par le ganciclovir pour injection USP chez les receveurs de greffe dépend de la durée et du degré de l'immunosuppression. Dans les essais cliniques contrôlés menés chez les receveurs d'allogreffe médullaire, le traitement par le ganciclovir pour injection a été poursuivi 100 à 120 jours après la transplantation. Une maladie à CMV s'est manifestée chez plusieurs patients qui avaient interrompu prématurément le traitement par le ganciclovir pour injection. Chez les receveurs d'allogreffe cardiaque, les maladies à CMV diagnostiquées pour la première fois débutaient après l'interruption du traitement par le ganciclovir pour injection, qui avait lieu 28 jours après la transplantation, ce qui porte à croire que l'administration continue puisse être nécessaire pour prévenir la manifestation tardive d'une maladie à CMV chez cette population de patients.

### **Patients atteints d'une grave leucopénie, neutropénie, anémie, thrombopénie et/ou pancytopénie**

On a observé de graves cas de leucopénie, neutropénie, anémie, thrombopénie, insuffisance médullaire osseuse et anémie aplasique chez des patients traités par le ganciclovir. Ce traitement ne doit pas être commencé si le nombre absolu de neutrophiles est inférieur à 500/mL, le nombre de plaquettes est inférieur à 25 000/mL ou le taux d'hémoglobine est inférieur à 80 g/L (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hématologie; MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Épreuves de laboratoire et RÉACTIONS INDÉSIRABLES).

### **Surveillance des patients**

Étant donné la fréquence de la leucopénie, de la granulocytopénie (neutropénie), de l'anémie, de la thrombopénie, de la pancytopenie, de l'insuffisance médullaire osseuse et de l'anémie aplasique chez les patients recevant du ganciclovir (voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES), on recommande d'effectuer fréquemment des hémogrammes et des numérations plaquettaires, surtout lorsque le ganciclovir ou autres analogues de nucléosides ont déjà causé une cytopénie chez le patient, ou lorsque le nombre de neutrophiles est inférieur à 1 000/ $\mu$ L au début du traitement. Il y a lieu de surveiller la créatinine sérique ou la clairance de la créatinine pour effectuer des ajustements posologiques chez les insuffisants rénaux (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Posologie recommandée et ajustement posologique, Insuffisance rénale).

### **Réduction de la dose**

Chez les insuffisants rénaux, il faut réduire la posologie du ganciclovir pour injection USP (voir la section Insuffisance rénale). Il faut aussi considérer des réductions posologiques dans les cas de neutropénie, d'anémie et/ou de thrombopénie. Il ne faut pas administrer de ganciclovir pour injection dans les cas de neutropénie grave (NAN inférieur à 500/ $\mu$ L), de thrombopénie grave (nombre de plaquettes inférieur à 25 000/ $\mu$ L) ou d'anémie grave (taux d'hémoglobine inférieur à 80 g/L).

### **Insuffisance rénale**

Pour le traitement des insuffisants rénaux (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS), consulter le tableau suivant (tableau 7) pour connaître les doses recommandées de ganciclovir pour injection USP et ajuster l'intervalle posologique tel qu'indiqué.

**Tableau 7 : Doses d'induction et doses d'entretien pour l'administration de ganciclovir pour injection en présence d'insuffisance rénale**

Clairance de la créatinine* (mL/min)	Dose d'induction (mg/kg)	Intervalle entre les doses (heures)	Dose d'entretien (mg/kg)	Intervalle entre les doses (heures)
$\geq 70$	5,0	12	5,0	24
50 à 69	2,5	12	2,5	24
25 à 49	2,5	24	1,25	24
10 à 24	1,25	24	0,625	24
< 10	1,25	3 fois par semaine, après l'hémodialyse	0,625	3 fois par semaine, après l'hémodialyse

### **Hémodialyse**

La posologie chez les patients soumis à l'hémodialyse ne doit pas dépasser 1,25 mg/kg trois fois par semaine, après chaque séance d'hémodialyse. Le ganciclovir pour injection USP doit être administré peu de temps après la fin de l'hémodialyse, puisqu'on a observé que l'hémodialyse réduisait les concentrations plasmatiques d'environ 50 %.

\* La clairance de la créatinine estimée peut être calculée en fonction du taux de créatinine sérique grâce à la formule suivante :

$$\text{Créatinine sérique chez l'homme} = \frac{[140 - \text{âge (années)}] [\text{poids corporel (kg)}]}{[72] [0,011 \times \text{créatinine sérique } (\mu\text{mol/L})]}$$

Clairance de la créatinine chez la femme = 0,85 x la valeur chez l'homme.

Clairance de la créatinine en unités SI (mL/S) = 0,01667 x la valeur obtenue avec la formule ci-dessus exprimée en unités traditionnelles (mL/min).

### **Administration**

Les concentrations de perfusion supérieures à 10 mg/mL ne sont pas recommandées. Ne pas administrer le ganciclovir pour injection USP par injection intraveineuse rapide ou bolus. L'administration doit s'effectuer par perfusion intraveineuse continue d'une heure.

### **Reconstitution**

**Reconstitution de la poudre lyophilisée stérile :** Reconstituer en injectant de l'eau stérile pour injection dans la fiole.

<b>Format de la fiole</b>	<b>Volume de solvant à ajouter dans la fiole</b>	<b>Volume approximatif disponible</b>	<b>Concentration approximative</b>
500 mg	10 mL	10,29 mL	50 mg/mL

Faire tourner doucement afin de mouiller complètement le produit. Continuer d'agiter jusqu'à ce que la solution reconstituée devienne claire. D'un point de vue microbiologique, la solution reconstituée doit être utilisée immédiatement.

**Le ganciclovir pour injection USP ne doit pas être mélangé avec d'autres produits i.v.**

**Ne pas utiliser d'eau bactériostatique pour injection contenant des parabènes, puisque ceux-ci sont incompatibles avec la poudre stérile de ganciclovir sodique et peuvent entraîner la formation de précipités.**

On doit vérifier l'absence de particules opaques et de changement de couleur dans la solution reconstituée avant de procéder à la préparation du mélange injectable.

**Préparation du mélange injectable :** La solution reconstituée est diluée de nouveau dans l'une des solutions pour perfusion intraveineuse énumérées ci-dessous.

**Solutions pour perfusion intraveineuse :** solution physiologique salée, solution aqueuse de dextrose à 5 %, solution injectable de Ringer, solution injectable de Ringer avec lactate.

### **SURDOSAGE**

Pour la prise en charge d'un surdosage soupçonné, communiquer immédiatement avec le centre antipoison régional.

**Traitement :** Puisqu'elle peut réduire les concentrations plasmatiques de ganciclovir d'environ 50 % pendant une séance de 4 heures, l'hémodialyse peut se révéler utile pour diminuer les concentrations sériques (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Hémodialyse). Il faut maintenir une hydratation adéquate et envisager l'administration de facteurs de croissance hématopoïétiques.

Des rapports de surdoses de ganciclovir intraveineux ont été reçus durant les essais cliniques et après la commercialisation du produit, et certains des cas signalés ont été mortels. Dans certains cas, aucune réaction indésirable n'a été signalée. La majorité des patients ont éprouvé une ou plusieurs des réactions indésirables suivantes :

*Toxicité hématologique :* myélosuppression, y compris pancytopenie, insuffisance médullaire, aplasie médullaire, leucopénie, neutropénie, granulocytopenie.

*Hépatotoxicité :* hépatite, trouble fonctionnel hépatique.

*Toxicité rénale :* aggravation d'une hématurie chez un patient déjà atteint d'un dysfonctionnement rénal, atteinte rénale aiguë, hausse de la créatinine.

*Toxicité gastro-intestinale :* douleur abdominale, diarrhée, vomissements.

*Neurotoxicité :* tremblements généralisés, crises convulsives.

De plus, un adulte qui a reçu 0,4 mL (au lieu de 0,1 mL) de ganciclovir par voie intravitréenne, a perdu temporairement la vue et a présenté une occlusion de l'artère centrale de la rétine après l'élévation de la pression intraoculaire reliée au volume du liquide injecté.

### ***Surdosage observé avec le valganciclovir***

Un adulte a développé une insuffisance médullaire osseuse mortelle (aplasie médullaire) après avoir reçu pendant plusieurs jours une posologie qui était au moins dix fois plus élevée que celle recommandée pour son degré d'insuffisance rénale (selon la réduction de la clairance de la créatinine).

## **ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE**

### **Mode d'action**

Le ganciclovir est un analogue synthétique du nucléoside de la guanine qui inhibe la réplication des virus de la famille des Herpèsvirus tant *in vitro* qu'*in vivo*.

Le ganciclovir intracellulaire est d'abord phosphorylé en ganciclovir monophosphate par une désoxyguanosine-kinase cellulaire. La phosphorylation se poursuit ensuite sous l'effet de plusieurs kinases cellulaires pour donner du ganciclovir triphosphate. Il a été montré *in vitro* que les concentrations de ganciclovir triphosphate sont approximativement 100 fois plus grandes dans les cellules infectées par le cytomegalovirus (CMV) que dans les cellules non infectées. La phosphorylation du ganciclovir est donc favorisée dans les cellules infectées par le virus. Dans ces

cellules, le ganciclovir triphosphate est métabolisé lentement, et on en retrouve de 60 à 70 % à l'intérieur des cellules 18 heures après le retrait du ganciclovir du liquide extracellulaire. L'activité antivirale du ganciclovir résulte de l'inhibition de la synthèse de l'ADN viral de deux façons : (1) le ganciclovir triphosphate inhibe de façon compétitive l'incorporation de dGTP dans l'ADN par l'ADN-polymérase, et (2) l'incorporation du ganciclovir triphosphate dans l'ADN viral empêche ou limite considérablement l'élongation de l'ADN viral.

Le ganciclovir inhibe la prolifération *in vitro* des cellules de mammifères à des concentrations variant de 10 à 60 µg/mL; les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse sont les plus sensibles à cette inhibition (CI<sub>50</sub> de 10 µg/mL).

### **Pharmacocinétique**

La pharmacocinétique du ganciclovir pour injection a été évaluée chez des patients immunodéprimés présentant une grave maladie à CMV. En présence d'une fonction rénale normale, la demi-vie plasmatique était de  $2,9 \pm 1,3$  heures. Une pharmacocinétique indépendante de la dose a été observée aux doses s'échelonnant entre 1,6 et 5,0 mg/kg. L'excrétion rénale à la fois par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire active constitue la principale voie d'élimination du ganciclovir (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS concernant l'administration en présence d'insuffisance rénale). La perfusion intraveineuse de 5 mg/kg de ganciclovir pour injection pendant une heure a entraîné une aire totale sous la courbe de la concentration sérique en fonction du temps (ASC) du ganciclovir variant entre  $22,1 \pm 3,2$  (n = 16) et  $26,8 \pm 6,1$  µg•h/mL (n = 16) et une concentration sérique maximale (C<sub>max</sub>) entre  $8,27 \pm 1,02$  (n = 16) et  $9,0 \pm 1,4$  µg/mL (n = 16).

## **STABILITÉ ET ENTREPOSAGE**

### **STABILITÉ ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ENTREPOSAGE**

**Poudre lyophilisée :** Conserver à la température ambiante (15 °C - 30 °C), à l'abri de l'humidité.

**Conditions d'entreposage pour la solution reconstituée (avec de l'eau pour injection) :** La solution reconstituée dans la fiole peut être entreposée à 15 °C à 30 °C pendant un maximum de 12 heures et ne doit pas être réfrigérée.

**Conditions d'entreposage pour la solution diluée (diluée avec une solution physiologique salée, une solution aqueuse de dextrose à 5 %, une solution injectable de Ringer ou une solution injectable de Ringer avec lactate) :** Conserver réfrigérée à 2 °C à 8 °C. La stabilité du ganciclovir pour injection sur les plans physique et chimique dure 14 jours dans des sacs de polychlorure de vinyle (PVC). Cependant, comme le ganciclovir pour injection est reconstitué avec de l'eau stérile qui n'est pas bactériostatique, il est recommandé d'utiliser la solution pour perfusion dans les 24 heures qui suivent la dilution afin de réduire le risque de contamination bactérienne. Les solutions reconstituées puis diluées doivent être réfrigérées. La congélation n'est pas recommandée.

## DIRECTIVES PARTICULIÈRES POUR LA MANIPULATION

La prudence est de rigueur pendant la manipulation et la préparation de ganciclovir pour injection USP. Éviter l'ingestion, l'inhalation ou le contact direct avec la peau et les muqueuses. Le ganciclovir pour injection USP doit être considéré comme un agent tératogène et cancérigène possible chez l'humain. Les solutions de ganciclovir pour injection USP sont alcalines (pH d'environ 11). Le port de gants en latex et de lunettes protectrices est recommandé afin d'éviter l'exposition au produit en cas de bris ou d'écoulement accidentel. Si la solution entre en contact avec la peau ou les muqueuses, nettoyer à fond avec de l'eau et du savon; rincer les yeux à l'eau claire pendant au moins 15 minutes.

**Élimination des médicaments non utilisés ou périmés :** Il faut minimiser la dispersion de produits pharmaceutiques dans l'environnement. Il ne faut pas jeter les médicaments dans le système des eaux usées et éviter de les jeter dans les ordures ménagères. Le recours à des systèmes de collecte établis, s'ils sont offerts dans la collectivité, est recommandé. Il existe plusieurs lignes directrices pour la manipulation et l'élimination des produits pharmaceutiques dangereux, y compris les médicaments cytotoxiques (p. ex., la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux, 1991). L'élimination de ganciclovir pour injection USP doit se faire conformément aux lignes directrices ou exigences provinciales, municipales et hospitalières locales.

## PRÉSENTATION, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

<b>Forme posologique</b>	<b>Poudre lyophilisée stérile</b>
<b>Teneur</b>	<b>Ganciclovir à 500 mg/fiole (sous forme sodique)</b>
<b>Description</b>	<b>Avant reconstitution :</b> Poudre lyophilisée stérile, de couleur blanche à jaune pâle conditionnée dans un flacon de verre transparent, muni d'un bouchon en caoutchouc de butyle gris et d'une collerette en aluminium avec un disque de PP blanc. <b>Après reconstitution :</b> Une solution claire, de couleur qui varie d'incolore à jaune clair.
<b>Composition</b>	<b>Ingrédients non médicinaux :</b> Hydroxyde de sodium (80 mg), azote (quantité suffisante) et eau pour injection (3,5 mL).
<b>Conditionnement</b>	Fioles de verre transparent de type I de 10 mL 5 fioles par boîte.




## PARTIE II : RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

### RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

#### Substance médicamenteuse

Dénomination commune :	ganciclovir
Nom chimique :	9-[[2-hydroxy-1-(hydroxyméthyl)-éthoxy]méthyl]guanine
Formule moléculaire :	C <sub>9</sub> H <sub>13</sub> N <sub>5</sub> O <sub>4</sub>
Poids moléculaire :	255,23 g/mol
Formule développée :	



Propriétés physicochimiques : Légèrement soluble dans l'eau, pratiquement insoluble dans l'éthanol (96 %). Aisément soluble dans une solution de 1M d'hydroxyde de sodium et de 1M d'acide hydrochlorique.

### ESSAIS CLINIQUES

Aucune donnée disponible.

### PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE

#### *Études pharmacodynamiques chez l'animal*

Le ganciclovir a manifesté une activité pharmacologique minime dans une batterie d'épreuves destinées à évaluer ses effets sur les systèmes nerveux central, cardio-vasculaire et immunitaire. Aucun effet constant n'a été observé lorsque le ganciclovir a été administré en concomitance avec divers médicaments agissant sur le système nerveux autonome.

#### *Pharmacologie chez l'humain*

**Absorption :** La biodisponibilité absolue du ganciclovir oral était d'environ 5 % chez le sujet à jeun (n = 6), et de 6 à 9 % après la prise d'aliments (n = 32). Lorsque le ganciclovir a été administré par voie orale avec des aliments à une dose quotidienne totale de 3 g (500 mg toutes les 3 heures 6 fois par jour et 1 000 mg 3 fois par jour), l'absorption à l'état d'équilibre, mesurée par l'aire sous la courbe de la concentration sérique en fonction du temps sur une période de 24 heures (ASC<sub>0-24</sub>), et les concentrations sériques maximales (C<sub>max</sub>) étaient semblables pour les deux schémas posologiques, l'ASC<sub>0-24</sub> étant de 15,9 ± 4,2 (moyenne ± écart type) et 15,4 ±

4,3  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$ , et la  $C_{\text{max}}$ , de  $1,02 \pm 0,24$  et  $1,18 \pm 0,36 \mu\text{g}/\text{mL}$ , respectivement ( $n = 16$ ).

La perfusion intraveineuse de 5 mg/kg de ganciclovir pendant une heure a entraîné une aire totale sous la courbe (ASC) variant entre  $22,1 \pm 3,2$  ( $n = 16$ ) et  $26,8 \pm 6,1 \mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$  ( $n = 16$ ) et une concentration maximale ( $C_{\text{max}}$ ) entre  $8,27 \pm 1,02$  ( $n = 16$ ) et  $0,9 \pm 1,4 \mu\text{g}/\text{mL}$  ( $n = 16$ ).

**Distribution :** Le volume de distribution du ganciclovir à l'état d'équilibre après administration intraveineuse était de  $0,74 \pm 0,15 \text{ L}/\text{kg}$  ( $n = 98$ ). Les concentrations dans le liquide céphalorachidien décelées 0,25 et 5,67 heures après l'administration de ganciclovir, à raison de 2,5 mg/kg par voie intraveineuse toutes les 8 heures ou toutes les 12 heures, chez trois patients variaient entre 0,31 et 0,68  $\mu\text{g}/\text{mL}$ , ce qui représente 24 à 70 % des concentrations plasmatiques respectives. La fixation aux protéines plasmatiques était de 1 à 2 % à des concentrations de ganciclovir de 0,5 et de 51  $\mu\text{g}/\text{mL}$ ; on n'envisage donc pas la possibilité d'interactions comportant le déplacement d'une substance de ses sites de fixation.

**Métabolisme :** Lorsque le ganciclovir est administré par voie intraveineuse, on observe une pharmacocinétique linéaire pour les concentrations s'échelonnant de 1,6 à 5,0 mg/kg. L'excrétion rénale de l'agent intact par la filtration glomérulaire et la sécrétion tubulaire active constitue la principale voie d'élimination du ganciclovir. Chez les patients bénéficiant d'une fonction rénale normale,  $91,3 \pm 5,0 \%$  ( $n = 4$ ) du ganciclovir administré par voie intraveineuse a été retrouvé sous forme non métabolisée dans l'urine. La clairance corporelle totale du ganciclovir administré par voie intraveineuse était de  $3,52 \pm 0,80 \text{ mL}/\text{min}/\text{kg}$  ( $n = 98$ ), et la clairance rénale, de  $3,20 \pm 0,80 \text{ mL}/\text{min}/\text{kg}$  ( $n = 47$ ); celle-ci représente donc  $91 \pm 11 \%$  de la clairance corporelle totale ( $n = 47$ ).

### *Populations particulières*

**Insuffisance rénale :** La clairance corporelle totale du ganciclovir est en corrélation linéaire avec la clairance de la créatinine. Chez les patients atteints d'insuffisance rénale légère, modérée et grave, les clairances générales moyennes ont été de 2,1, de 1,0 et de 0,3  $\text{mL}/\text{min}/\text{kg}$ . La demi-vie d'élimination a augmenté en cas d'insuffisance rénale. Chez les patients atteints d'insuffisance rénale grave, la demi-vie d'élimination a été multipliée par 10.

La pharmacocinétique du ganciclovir pour injection administré par voie intraveineuse a été évaluée chez 10 patients immunodéprimés atteints d'insuffisance rénale qui recevaient des doses variant entre 1,25 et 5 mg/kg. Une diminution de la fonction rénale s'est traduite par une baisse de la clairance du ganciclovir (voir Tableau 8).

**Tableau 8 Propriétés pharmacocinétiques suivant l'administration intraveineuse de ganciclovir chez des patients immunodéprimés atteints d'insuffisance rénale**

CICr (mL/min)	Sujets (n)	Dose	Clairance (mL/min) Moyenne $\pm$ E.T.	Demi-vie (heures) Moyenne $\pm$ E.T.
50-79	4	3,2 - 5 mg/kg	128 $\pm$ 63	4,6 $\pm$ 1,4
25-49	3	3 - 5 mg/kg	57 $\pm$ 8	4,4 $\pm$ 0,4
< 25	3	1,25 - 5 mg/kg	30 $\pm$ 13	10,7 $\pm$ 5,7

L'hémodialyse diminue les concentrations plasmatiques de ganciclovir d'environ 50 % après l'administration par voie intraveineuse (voir SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE).

**Race et sexe :** Les effets de la race et du sexe ont été examinés lors d'études pharmacocinétiques chez 50 patients recevant une posologie orale de 1 000 mg toutes les 8 heures. Bien que le nombre de sujets de race noire (n = 8; 16 %) et de sujets hispaniques (n = 10; 20 %) eut été faible, il semblait y avoir une tendance vers des valeurs moins élevées de la  $C_{max}$  et de l' $ASC_{0-8}$  à l'état d'équilibre chez ces sous-populations comparativement aux sujets de race blanche. On n'a pu tirer aucune conclusion définitive concernant le sexe en raison du petit nombre de femmes (n = 6; 12 %); aucune différence n'a toutefois été observée entre les hommes et les femmes.

**Enfants :** La pharmacocinétique du ganciclovir a été étudiée chez 27 nouveau-nés âgés de 2 à 49 jours. Après l'administration d'une dose intraveineuse de 4 mg/kg (n = 14) ou de 6 mg/kg (n = 13), les paramètres pharmacocinétiques ont été, respectivement, de  $5,5 \pm 1,6$  et de  $7,0 \pm 1,6$  µg/mL pour la  $C_{max}$ , de  $3,14 \pm 1,75$  et de  $3,56 \pm 1,27$  mL/min/kg pour la clairance corporelle totale, et de 2,4 heures (moyenne harmonique) pour la demi-vie dans les deux cas.

On a également étudié la pharmacocinétique du ganciclovir chez 10 enfants âgés de 9 mois à 12 ans. Les caractéristiques pharmacocinétiques du ganciclovir étaient les mêmes après l'administration intraveineuse d'une ou de plusieurs doses (5 mg/kg toutes les 12 heures). Le volume de distribution à l'état d'équilibre était de  $0,64 \pm 2,2$  L/kg, la  $C_{max}$ , de  $7,9 \pm 3,9$  µg/mL, la clairance systémique, de  $4,7 \pm 2,2$  mL/min/kg, et la demi-vie, de  $2,4 \pm 0,7$  heures. La pharmacocinétique du ganciclovir administré par voie intraveineuse à des nouveau-nés et à des enfants est semblable à celle que l'on remarque chez les adultes.

**Personnes âgées :** La pharmacocinétique du ganciclovir n'a pas été évaluée chez les adultes de plus de 65 ans. Toutefois, comme le ganciclovir est principalement excrété par les reins et comme la clairance rénale diminue avec l'âge, il faut s'attendre à une réduction de la clairance corporelle totale du ganciclovir et à une prolongation de la demi-vie d'élimination du ganciclovir chez les personnes âgées (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Insuffisance rénale).

## **VIROLOGIE**

### **Effet antiviral clinique du ganciclovir.**

Parmi les 314 patients immunodéprimés recrutés dans une étude ouverte sur l'administration de ganciclovir pour injection pour le traitement d'une infection à CMV menaçant le pronostic vital ou la vue, on a identifié 121 patients chez qui les cultures pour la recherche du CMV se sont révélées positives moins de sept jours avant le traitement. La réponse virologique post-thérapeutique a été évaluée à partir de cultures virales en série effectuées après l'administration de ganciclovir pour injection; elle était définie en fonction du passage de la culture de positive à négative, ou d'une diminution du nombre d'unités infectieuses de CMV par un facteur de plus de 100, comme on peut le voir dans le tableau suivant :

**Tableau 9 : Réponse virologique**

Source du spécimen mis en culture	Nombre de patients étudiés	Nombre de patients (%) ayant répondu au traitement	Médiane du délai de réponse (jours)
Urine	107	93 (87 %)	8
Sang	41	34 (83 %)	8
Gorge	21	19 (90 %)	7
Sperme	6	6 (100 %)	15

L'activité antivirale de ganciclovir pour injection a été démontrée dans deux études séparées contrôlées par placebo et portant sur la prévention des maladies à CMV chez les receveurs de greffe. Cent quarante-neuf receveurs d'allogreffe cardiaque qui étaient séropositifs pour le CMV ou qui avaient reçu des allogreffes cardiaques séropositives ont été répartis au hasard pour recevoir du ganciclovir pour injection (5 mg/kg 2 fois par jour pendant 14 jours, suivis de 6 mg/kg une fois par jour à raison de 5 jours par semaine pendant 14 autres jours) ou un placebo. Soixante-douze receveurs de greffe de moelle osseuse allogénique dont les cultures révélaient la présence de CMV ont été répartis au hasard pour recevoir du ganciclovir pour injection (5 mg/kg 2 fois par jour pendant 7 jours, suivis de 5 mg/kg une fois par jour) ou un placebo pendant les 100 premiers jours après la transplantation. Le ganciclovir pour injection a inhibé l'excrétion du CMV chez les receveurs d'allogreffe cardiaque et d'allogreffe médullaire. L'effet antiviral du ganciclovir pour injection chez ces patients est résumé dans le tableau suivant :

**Tableau 10 : Patients dont les cultures révélaient la présence de CMV**

Temps	Allogreffe cardiaque		Allogreffe médullaire	
	Ganciclovir	Placebo	Ganciclovir	Placebo
<b>Avant le traitement</b>	1/67 (2 %)	5/64 (8 %)	37/37 (100 %)	35/35 (100 %)
<b>Semaine 2</b>	2/75 (3 %)	11/67 (16 %)	2/31 (6 %)	19/28 (68 %)
<b>Semaine 4</b>	3/66 (5 %)	28/66 (43 %)	0/24 (0 %)	16/20 (80 %)

L'activité antivirale du ganciclovir pour injection a été confirmée dans deux essais contrôlés randomisés pour le traitement d'entretien de la rétinite à CMV chez des patients atteints du sida. On a procédé à des urocultures en série et, lorsque la situation s'y prêtait, à des cultures de sperme, de spécimens biopsiques, de sang et d'autres tissus. Les cultures d'un faible pourcentage de patients seulement sont demeurées positives durant le traitement d'entretien par le ganciclovir. Il n'y avait aucune différence statistiquement significative concernant la fréquence de cultures positives dans les divers groupes thérapeutiques. L'effet antiviral du ganciclovir pour injection chez les patients de ces deux études est résumé dans le tableau 11 suivant :

**Tableau 11 : Patients dont les cultures révélaient la présence du CMV dans deux essais cliniques contrôlés**

	Patients présentant une rétinite à CMV nouvellement diagnostiquée*	Patients présentant une rétinite à CMV traitée antérieurement et stable**
	Solution intraveineuse	Solution intraveineuse
Début du traitement d'entretien	5/37 (13,5 %)	2/66 (3,0 %)
N'importe quand durant le traitement d'entretien	3/48 (6,3 %)	1/45 (2,2 %)

\* Étude ICM1653 : administration de ganciclovir intraveineux pendant 3 semaines avant le début du traitement d'entretien

\*\* Étude ICM1774 : administration de ganciclovir intraveineux pendant des périodes allant de 4 semaines à 4 mois avant le début du traitement d'entretien

Résistance virale : Cultures cellulaires : Des isolats de CMV à sensibilité réduite au ganciclovir ont été sélectionnés dans des cultures cellulaires. La croissance des souches de CMV en présence de ganciclovir a entraîné la sélection de substitutions d'acides aminés dans la protéine kinase virale pUL97 et l'ADN polymérase virale pUL54.

*In vivo* : Des virus résistants au ganciclovir peuvent apparaître après un traitement ou une prophylaxie de longue durée par le ganciclovir, par sélection des substitutions dans pUL97 ou pUL54. Les données cliniques sur l'apparition de la résistance clinique au ganciclovir sont limitées et il existe probablement de nombreuses voies de résistance. Dans des isolats cliniques, sept substitutions canoniques de la pUL97 (M460V/I, H520Q, C592G, A594V, L595S et C603W) sont les substitutions associées à la résistance au ganciclovir les plus fréquentes. Ces substitutions, de même que d'autres substitutions associées à la résistance au ganciclovir les plus fréquentes. Ces substitutions, de même que d'autres substitutions signalées moins souvent dans la littérature ou observées au cours d'essais cliniques, sont énumérées au tableau 12.

**Tableau 12 Résumé des substitutions d'acides aminés associées à la résistance observées dans les isolats de CMV provenant de patients chez qui le traitement ou la prophylaxie par le ganciclovir a échoué**

pUL97	L405P, A440V, M460I/V/T/L, V466G/M, C518Y, H520Q, P521L, del 590-593, A591D/V, C592G, A594E/G/T/V/P, L595F/S/T/W, del 595, del 595-603, E596D/G/Y, K599E/M, del 600-601, del 597-600, del 601-603, C603W/R/S/Y, C607F/S/Y, I610T, A613V
pUL54	E315D, N408D/K/S, F412C/L/S, D413A/E/N, L501F/I, T503I, K513E/N/R, D515E, L516W, I521T, P522A/L/S, V526L, C539G, L545S/W, Q578H/L, D588E/N, G629S, S695T, I726T/V, E756K, L773V, V781I, V787L, L802M, A809V, T813S, T821I, A834P, G841A/S, D879G, A972V, del 981-982, A987G

Remarque : Il existe probablement de nombreuses autres voies de résistance au ganciclovir.

Une résistance du CMV au ganciclovir a été observée chez des personnes atteintes du sida et d'une rétinite à CMV qui n'avaient jamais été traitées par le ganciclovir auparavant. Une résistance virale a aussi été observée chez des patients recevant un traitement prolongé par le ganciclovir i.v. pour une rétinite à CMV. Au cours d'une étude contrôlée sur le ganciclovir administré par voie orale pour la prévention de la maladie à CMV associée au sida, 364 personnes ont été évaluées par une ou plusieurs cultures après au moins 90 jours de traitement par le ganciclovir. De ce nombre, 113 ont eu un résultat positif à au moins une culture. Le dernier isolat obtenu de chaque sujet a fait l'objet d'une épreuve de sensibilité, et 2 isolats sur 40 se sont révélés résistants au ganciclovir. Ces isolats résistants ont été associés à un échec subséquent du traitement pour la rétinite.

La possibilité de résistance virale doit être prise en considération lorsque la réponse clinique du patient n'est pas satisfaisante ou lorsque l'excrétion virale est continue durant le traitement.

Résistance croisée : Une résistance croisée a été signalée pour les substitutions d'acides aminés sélectionnées dans des cultures cellulaires par le ganciclovir, le cidofovir ou le foscarnet. En général, les substitutions d'acides aminés dans pUL54 qui confèrent une résistance croisée au ganciclovir et au cidofovir se trouvent dans les domaines exonucléase et la région V de l'ADN polymérase virale. Toutefois, les substitutions d'acides aminées qui confèrent une résistance croisée au foscarnet sont diverses, mais concentrées dans et entre les régions II (codons 696-742) et III (codons 805-845). Les substitutions d'acides aminés qui ont entraîné une sensibilité réduite au ganciclovir et au cidofovir ou au foscarnet sont résumées au tableau 13.

**Tableau 13 Résumé des substitutions d'acides aminés dans pUL54 associées à une résistance croisée entre ganciclovir, le cidofovir ou le foscarnet**

<b>Résistance croisée au cidofovir</b>	D301N, N408D/K, N410K, F412C/L/S/V, D413E/N, P488R, L501I, T503I, K513E/N, L516R/W, I521T, P522S/A, V526L, C539G/R, L545S/W, Q578H, D588N, I726T/V, E756K, L773V, V812L, T813S, A834P, G841A, del 981-982, A987G
<b>Résistance croisée au foscarnet</b>	F412C, Q578H/L, D588N, V715A/M, E756K, L773V, V781I, V787L, L802M, A809V, V812L, T813S, T821I, A834P, G841A/S, del 981-982

### Études *in vitro*

Le ganciclovir inhibe la réplication virale *in vitro* (voir tableau 14). La relation entre la sensibilité *in vitro* du CMV aux médicaments antiviraux et la réponse clinique n'a pas été établie.

**Tableau 14 : Activité *in vitro* du ganciclovir**

<b>Virus</b>	<b>CI<sub>50</sub> (µM)*</b>
Virus de l'herpès (VHS)	2,4 <sup>ab</sup>
Cytomégalovirus humain (CMVH)	0,4-11,0
Virus zona-varicelle (VZV)	32,0
Virus d'Epstein-Barr (VEB)	1,0
Cytomégalovirus murin (CMVM)	15,0
Cytomégalovirus du cobaye (CMVC)	70,0

\*  $\mu\text{M} = 10^{-6}\text{M}$

<sup>a</sup> Épreuve de réduction des plages virales

L'activité antivirale du ganciclovir contre un certain nombre de souches de CMV humain, dans des cultures cellulaires, est illustrée au Tableau 15.

**Tableau 15 : Activité antivirale *in vitro* du ganciclovir contre des souches de CMV humain**

Souche de CMV humain	Culture cellulaire	CI <sub>50</sub> ( $\mu\text{M}$ ) <sup>a</sup> du ganciclovir
AD 169	MRC-5	7
AD 169	MRC-5	1,5-6,2
Towne	MRC-5	0,4-6,2
Towne	WI-38	1,0
Major	WI-38	4,8
BT 1943	WI-38	1,1
AD 169	HET	7
Davis	MRC-5	7
Davis	HET	5
Towne	MRC-5	2,0
Davis	MRC-5	3,1
AD 16	MRC-5	3,1
Eisenhardt-CID9	HEL	2,0
SIDA-O.L.	HEL	0,8
SIDA-O.C.	HEL	5,5
CHMC-CID	HEL	5,9
Mononucléose à CMV	HEL	1,0-11,0
Receveurs de greffe rénale	HEL	0,5-9,5
Hommes homosexuels	HEL	1,0-5,0

<sup>a</sup> CI<sub>50</sub> : dose inhibitrice médiane ( $\mu\text{M}$ )

La CI<sub>50</sub> du ganciclovir pour une variété de cellules de mammifères en culture est indiquée au Tableau 16.

**Tableau 16 : Effets du ganciclovir sur la prolifération des cellules hôtes**

Type de cellules	CI <sub>50</sub> du ganciclovir ( $\mu\text{M} \pm \text{E.T.}$ )
Cellules souches hématopoïétiques humaines de moelle osseuse	39 $\pm$ 73 <sup>a</sup>
Poumon embryonnaire humain (MRC-5)	110 $\pm$ 50
Amygdale embryonnaire humaine (HET)	250 $\pm$ 80
Poumon de singe-écureuil (SML)	1 500 $\pm$ 95
Embryon de cobaye (GPE)	2 900 $\pm$ 844
Fibroblaste d'embryon de souris (MEF)	210 $\pm$ 80

<sup>a</sup> Les résultats ne tiennent pas compte d'une souche de cellules de moelle osseuse résistante au ganciclovir.

### Études *in vivo*

Le ganciclovir a démontré une activité *in vivo* dans trois modèles animaux d'infection à CMV. Ces modèles incluait une infection à CMVM aiguë, une infection pulmonaire et une pneumonie

interstitielle à CMVM, ainsi qu'une infection aiguë à CMVC.

Comme l'illustre le Tableau 17, on a évalué l'efficacité de différentes doses de ganciclovir pour le traitement de souris infectées par le CMV. Une hausse statistiquement significative du nombre de survivants a été observée aux doses de 10 mg/kg ou plus. Une dose de 25 mg/kg d'acyclovir a été nécessaire pour que l'effet sur le nombre de souris qui ont survécu soit statistiquement significatif.

**Tableau 17 : Effets du ganciclovir sur la mortalité attribuée au CMVM (souche Smith) lorsque le traitement était entrepris 6 heures après l'infection**

Médicament (mg/kg) <sup>a</sup>	Survivants/Total	Durée moyenne de survie (jours) <sup>b</sup>
Solution salée	2/20 (10) <sup>c</sup>	4,4 ± 0,78 <sup>d</sup>
Ganciclovir		
1	2/20 (10)	6,2 ± 1,8 <sup>f</sup>
5	2/20 (10)	6,3 ± 1,4 <sup>f</sup>
10	8/20 (40) <sup>e</sup>	7,7 ± 1,8 <sup>f</sup>
25	15/20 (75) <sup>e</sup>	6,4 ± 0,55 <sup>f</sup>
50	19/20 (95) <sup>e</sup>	7,0 ± 0,0 <sup>f</sup>

<sup>a</sup> Les doses quotidiennes ont été fractionnées en deux et administrées par voie sous-cutanée à 9 h et à 15 h pendant 5 jours.

<sup>b</sup> Des souris qui sont mortes

<sup>c</sup> Pourcentage de survie

<sup>d</sup> Écart type

<sup>e</sup> Statistiquement significatif ( $p < 0,05$ ) d'après le test exact de Fisher

<sup>f</sup> Statistiquement significatif ( $p < 0,05$ ) d'après le test en U de Mann-Whitney

Dans une autre expérience, le traitement a été instauré soit 6, 24, 48, 72 ou 96 heures après l'infection. On y a observé une augmentation statistiquement significative du nombre de survivants lorsque le traitement par le ganciclovir était entrepris 48 heures ou moins après l'inoculation (Tableau 18).

**Tableau 18 : Effets de 50 mg/kg de ganciclovir sur la mortalité attribuée au CMVM (souche Smith) lorsque le traitement était entrepris 6, 24, 48, 72 ou 96 heures après l'infection**

Médicament (heures après l'infection) <sup>a</sup>	Survivants/ Total	Durée moyenne de survie (jours) <sup>b</sup>
Solution salée	2/19 (11) <sup>c</sup>	5,2 ± 1,2 <sup>d</sup>
Ganciclovir		
6	18/20 (90) <sup>e</sup>	6,5 ± 0,71
24	15/19 (79) <sup>e</sup>	10,7 ± 3,8
48	9/19 (47) <sup>e</sup>	8,0 ± 2,5
72	6/20 (30)	6,1 ± 1,6
96	1/20 (5)	4,8 ± 0,71

<sup>a</sup> Les doses quotidiennes ont été fractionnées en deux et administrées par voie sous-cutanée à 9 h et à 15 h pendant 5 jours.

<sup>b</sup> Des souris qui sont mortes

<sup>c</sup> Pourcentage de survie

<sup>d</sup> Écart type

<sup>e</sup> Statistiquement significatif ( $p < 0,05$ ) d'après le test exact de Fisher

<sup>f</sup> Statistiquement significatif ( $p < 0,05$ ) d'après le test en U de Mann-Whitney

Des doses de ganciclovir allant d'environ 40 à 300 mg/kg (*ad libitum* dans l'eau de boisson à compter de 24 heures après l'infection) ont réduit les titres salivaires de CMVM de 84 à 99 pour cent et les titres pulmonaires, de 97 à 99 pour cent. Le traitement de la pneumonie interstitielle



diffuse par le ganciclovir a aussi diminué la réplication du CMVM tant dans les glandes salivaires que dans les poumons, mais n'a pas interrompu la progression de la pneumonie.

Le CMV du cobaye est très peu sensible au ganciclovir (Tableau 12); ce médicament (25 mg/kg par voie intrapéritonéale 2 fois par jour pendant 7 jours) a néanmoins abaissé les titres de CMVC dans les glandes salivaires. L'analyse histopathologique a en outre montré que les lésions des reins et des glandes salivaires chez les animaux traités par le ganciclovir étaient considérablement moins graves que chez les animaux témoins.

## **TOXICOLOGIE**

Les Tableaux 19 à 23 constituent un sommaire des études toxicologiques portant sur le ganciclovir.

L'organe cible le plus sensible aux effets toxiques primaires du ganciclovir était le testicule. Les autres systèmes perturbés par l'administration du ganciclovir, mais à un degré moindre que l'appareil reproducteur mâle, étaient les systèmes hématopoïétique, tégumentaire, reproducteur femelle, gastro-intestinal et urinaire, ainsi que le développement embryonnaire et fœtal. Exception faite des effets sur le système reproducteur mâle, et de certains effets sur le système hématopoïétique et la peau, les changements occasionnés par le médicament sont survenus à des doses supérieures à la dose thérapeutique proposée. Les réactions indésirables attribuées au ganciclovir étaient généralement réversibles à l'arrêt du traitement, à moins que les doses administrées n'aient été extrêmement élevées, et à l'exception de certains effets sur le développement embryonnaire ou fœtal.

**Tableau 19 : Toxicité aiguë**

Espèce Souche Sexe (N) Âge	Voie Méthode Volume	Conditionnement préthérapeutique	Dose (mg/kg)	Mortalité		DL <sub>50</sub>	Signes de toxicité
				Jour de l'étude	Animaux (N)		
Souris Swiss-Webster Mâles (12) Femelles (12) 8-12 semaines	Orale Sonde gastrique 0,2 mL/10 g de poids corporel	1 mois d'acclim. 3 heures de jeûne avant l'administration	900 2 000	- -	0 0	> 2 000 mg/kg	État clinique normal sauf pour une inactivité occasionnelle et/ou un pelage rugueux. Aucun effet relié au traitement pour les doses respectant le poids corporel.
Souris Swiss-Webster Mâles (18) Femelles (18) 8-12 semaines	Intraveineuse Inj. dans veine de la queue 0,2 mL/10 g de poids corporel	1 mois d'acclim.	0 900  2 000	- 1** 6 7 8 1** 4 8	0 1M, 1F 1F 1M, 1F 1M, 1F 3M 1M, 5F 1F	Évaluée à 900 mg/kg	Pelage rugueux chez les souris recevant le véhicule. Effets reliés à la dose : pâleur, dépense métabolique excessive, hypothermie, inactivité, dyspnée ou hyperpnée, nécrose et ulcération au point d'injection. Poids corporel et apport alimentaire réduits pendant la première semaine après le traitement.
Chien Beagle Mâle (1) Femelle (1) 9-16 mois	Orale Sonde gastrique 10 mL/kg de poids corporel	5-10 mois d'acclim. jeûne la nuit précédant l'administration	1 000	-	0	> 1 000 mg/kg	Aucun changement relié au traitement n'a été observé quant au poids corporel, à la pathologie macroscopique, à l'hématologie et à la biochimie clinique.
Chien Beagle Mâle (1) Femelle (1) 18-29 mois	Intraveineuse inj. dans veine céphalique 5 mL/kg	13-22 mois d'acclim.	500	5 7	1M 1F	Évaluée à < 500 mg/kg	Anorexie, diarrhée, hypothermie, vomissements, collapsus, salivation, dépense métabolique excessive. Réduction de 15-20% du poids corporel. Changements sanguins gastriques et intestinaux. Mâle : leucopénie; hausses de l'azote uréique du sang, de l'ALT et de l'AST.
Chien Beagle Mâle (1) Femelle (1) 10 mois	Intraveineuse Inj. dans veine céphalique 1,5 mL/kg	6 mois d'acclim.	150	-	0	Évaluée à > 150 mg/kg	Aucun effet relié au traitement sur l'état clinique ou le poids corporel. Mâle (jour suivant le traitement) : légères hausses du nombre de globules rouges, de l'hémoglobine, de l'hématocrite, des protéines totales et de l'albumine.

\* M = MÂLE; F = FEMELLE

\*\* Dans ces cas, la mort est survenue pendant l'administration du médicament ou dans la minute qui a suivi et n'a par conséquent pas été considérée comme un effet relié à la dose.

**Tableau 20 : Études sur la toxicité de doses multiples**

Espèce Souche Durée du traitement	Voie Dose (mg/kg/jour)	Mortalité	Hématologie	Biochimie clinique	Poids des organes	Pathologie	Commentaires
Souris Swiss-Webster 3 mois	Gavage (Mâles seulement)						
	0	1/45	-	-	-	-	-
	10	1/45	PEM	PEM	Testicules : diminué	Atrophie testiculaire et hypospermatogenèse, avec rétablissement complet 130 jours après le traitement	Fertilité réduite et augmentation des anomalies morphologiques du sperme, avec rétablissement entre 30 et 130 jours après le traitement. Aucun effet létal dominant.
	100	0/45	PEM	PEM	Testicules : diminué	Atrophie testiculaire et aspermie	Stérilité et augmentation des anomalies morphologiques du sperme.
	1 000	4/45	PEM	PEM. Pas de changements de la FSH, de la LH ou de la testostérone reliés au traitement	Testicules : diminué	Atrophie testiculaire et aspermie	Stérilité et augmentation des anomalies morphologiques du sperme. Diminution de l'apport alimentaire et du poids corporel.
Souris Swiss-Webster 3 mois	Gavage (Femelles seulement)						
	0	1/85	-	-	-	-	-
	100	0/85	PEM	PEM	PEM	PEM	PEM
	300	1/85	PEM	PEM	PEM	PEM	PEM
	1 000	2/85	PEM	PEM. Pas de changements de la FSH ou de la LH reliés au traitement.	PEM	PEM	PEM

PEM = pas d'effets reliés au médicament      NE = test non effectué

**Tableau 20 (Suite)**

Espèce Souche Durée du traitement	Voie Dose (mg/kg/jour)	Mortalité	Signes de toxicité	Hématologie	Biochimie clinique	Poids des organes	Pathologie
Souris Swiss-Webster 1 mois	Intraveineuse (mâles et femelles)						
	0	0/25 (M) 0/25 (F)	-	-	-	-	-
	15	0/25 (M) 0/25 (F)	PEM	PEM	PEM	Testicules : diminué Rate : augmenté (femelles)	Aspermie et atrophie des organes reproducteurs mâles. Rétablissement partiel 1 mois après le traitement.
	45	5/25 (M) 3/25 (F)	Hypothermie, inactivité, pâleur, pelage rugueux, cachexie, dépense métabolique excessive. Rétablissement 1 semaine après le traitement.	PEM	PEM	Testicules : diminué Rate : augmenté	Aspermie et atrophie des organes reproducteurs mâles. Lésion du cortex rénal; atrophie des tissus annexiels de la peau. Peu de signes de rétablissement 1 mois après le traitement.
	135	8/25 (M) 7/25 (F)	Perte de poids corporel pendant la 1 <sup>re</sup> et/ou la 2 <sup>e</sup> semaine de traitement. Hypothermie, inactivité, pâleur, pelage rugueux, cachexie, dépense métabolique excessive. Rétablissement 1 semaine après le traitement.	Baisse du nombre d'érythrocytes et des taux d'hémoglobine et d'hématocrite. Morphologie anormale des érythrocytes chez certaines souris. Rétablissement complet 1 mois après le traitement.	Hausse de l'AST, de l'ALT et de l'azote uréique du sang chez les femelles. Guérison complète 1 mois après le traitement.	<u>Mâles</u> : testicules, prostate et vésicules séminales : diminué; rate : augm. <u>Femelles</u> : utérus : dim.; rate, foie et reins : augmenté.	Aspermie. Atrophie des organes reproducteurs (mâles et femelles). Inhibition du cycle ovarien. Lésion du cortex rénal. Atrophie des tissus annexiels de la peau. Peu de signes de rétablissement 1 mois après le traitement.
Rat Sprague-Dawley 3 mois	Orale (dans nourriture) (mâles et femelles)						
	0	0/6 (M) 0/6 (F)	-	-	-	-	-
	100	0/6 (M) 0/6 (F)	PEM	PEM	PEM	Testicules : diminué	Atrophie testiculaire et tubules aspermatogéniques
	500	0/6 (M) 0/6 (F)	PEM	PEM	PEM	Testicules : diminué	Atrophie testiculaire et tubules aspermatogéniques.
	1 400	0/6 (M) 0/6 (F)	PEM	PEM	PEM	Testicules : diminué	Atrophie testiculaire et tubules aspermatogéniques.
	5 000	1/6 (M) 0/6 (F)	Baisse de 8 à 12 % du gain de poids corporel	PEM	PEM	Testicules : diminué	Atrophie testiculaire et tubules aspermatogéniques.
Chien	Intraveineuse						

**Tableau 20 (Suite)**

Espèce Souche Durée du traitement	Voie Dose (mg/kg/jour)	Mortalité	Signes de toxicité	Hématologie	Biochimie clinique	Poids des organes	Pathologie
Beagle 1 mois							
	0	0/3(M) 0/2(F)					
	0,4	0/3(M)	PEM	PEM	PEM		Atrophie testiculaire et hypospermatogénèse après un rétablissement d'un mois.
	1,2	0/3(M) 0/2(F)	PEM	PEM	PEM		Atrophie testiculaire et hypospermatogénèse après un rétablissement d'un mois.
	3,6	0/3(M) 0/2(F)	PEM	PEM	PEM		Atrophie testiculaire et hypospermatogénèse. Rétablissement prévu d'après la présence de spermatogonies et de spermatoctes 1 mois après le traitement.
Chien Beagle 3 mois	Orale Sonde gastrique						
	<u>Mâles</u> 0 0,2	0/6 0/6	PEM	PEM	PEM	PEM	Atrophie testiculaire minime ou légère et hypospermatogénèse. Atrophie des glandes sébacées. Guérison complète de toutes les lésions 65 jours après le traitement.
	2,0	0/6	Dim. du poids corporel et du volume des testicules	PEM	PEM	Testicules : diminué	Atrophie testiculaire et aspermie. Dim. de l'activité épидидymaire. Atrophie des glandes sébacées. Guérison complète de toutes les lésions 4 mois après le traitement
	20,0	0/6	Dim. du poids corporel et du volume des testicules. Larmolement.	Dim. des taux d'hémoglobine et de l'hématocrite, et du nombre d'érythrocytes, de leucocytes et de plaquettes.	Pas de changements de la FSH, de la LH et de la testostérone reliés au traitement.	Testicules : diminué	Atrophie testiculaire et aspermie. Dim. de l'activité épидидymaire. Hypocellularité de la moelle osseuse. Atrophie des glandes sébacées et des follicules pileux. Guérison complète de toutes les lésions 4 mois après le traitement.
	<u>Femelles</u> 0	0/6	PEM	PEM	PEM	PEM	PEM

**Tableau 20 (Suite)**

Espèce Souche Durée du traitement	Voie Dose (mg/kg/jour)	Mortalité	Signes de toxicité	Hématologie	Biochimie clinique	Poids des organes	Pathologie
	2,0 6,0	0/6 0/6	Dim. du poids corporel et larmolement.	Dim. du nombre de leucocytes et de plaquettes.	PEM	PEM	Hypocellularité de la moelle osseuse. Atrophie des glandes sébacées. Guérison complète de toutes les lésions 65 jours après le traitement.
	20,0	1/6	Dim. du poids corporel et larmolement.	Dim. des taux d'hémoglobine et de l'hématocrite. Dim. du nombre d'érythrocytes, de leucocytes et de plaquettes.	Pas de changements de la FSH, de la LH et de la testostérone reliés au traitement.	PEM	Hypocellularité de la moelle osseuse. Atrophie des glandes sébacées et des follicules pileux. Guérison complète de toutes les lésions 4 mois après le traitement.
Chien Beagle 1 mois	intraveineuse						
	0	0/3 (M) 0/3 (F)	-	-	-	-	-
	10	0/3 (M) 0/3 (F)	Écoulement oculaire clair	Légère baisse du nombre de leucocytes	PEM	Testicules : diminué	Hypocellularité de la moelle osseuse. Atrophie des testicules et des glandes sébacées.
	30	0/3 (M) 1/3 (F)	Écoulement oculaire clair chez tous les chiens. Perte de poids, anorexie, vomissements, hypothermie et diarrhée sanguinolente chez la femelle qui est morte.	Dim. du nombre de leucocytes, de plaquettes et/ou de réticulocytes chez tous les chiens. Rétablissement partiel 2 sem. après le traitement. Dim. du nombre d'érythrocytes, du taux d'hémoglobine et de l'hématocrite chez la femelle qui est morte.	Des effets similaires à ceux présentés par les chiens recevant les doses élevées ont été observés chez la femelle qui est morte.	Testicules : diminué	Hypocellularité de la moelle osseuse. Rétablissement partiel 2 sem. après le traitement. Atrophie des testicules, de l'épiderme, des glandes sébacées et des follicules pileux.
	90	3/3 (M) 3/3 (F)	Perte de poids, anorexie, vomissements, hypothermie, diarrhée sanguinolente, déshydratation et écoulement oculaire clair chez tous les chiens	Dim. du nombre de leucocytes, de réticulocytes et de plaquettes. Augm. du nombre d'érythrocytes, du taux d'hémoglobine et de l'hématocrite.	Dim. du Na et du Cl. Hausse de l'azote uréique du sang, de la créatinine, de la phosphatase alcaline, du phosphore, du cholestérol et des	Testicules : normal; les chiens sont morts trop tôt pour présenter des effets	Hypocellularité de la moelle osseuse. Grave dégénérescence et atrophie gastro-intestinale. Dilatation des tubules rénaux. Atrophie de l'épiderme, des glandes sébacées et des follicules pileux. Involution du thymus. Suppression ovarienne et atrophie lymphoïde peut-être dues au stress attribuable à une maladie

**Tableau 20 (Suite)**

<b>Espèce Souche Durée du traitement</b>	<b>Voie Dose (mg/kg/jour)</b>	<b>Mortalité</b>	<b>Signes de toxicité</b>	<b>Hématologie</b>	<b>Biochimie clinique</b>	<b>Poids des organes</b>	<b>Pathologie</b>
					triglycérides.		systémique.

PEM = pas d'effets reliés au médicament

Sauf avis contraire, ces observations s'appliquent tant aux mâles qu'aux femelles

NE = test non effectué

**Tableau 21 : Études sur la reproduction**

Espèce Souche et sexe/groupe	Dose et voie programme de reproduction et de sacrifice	Résultats et conclusions
<b>Fertilité et reproduction</b>		
Souris Swiss-Webster Mâles : 20/groupe, traités pendant 60 jours avant l'accouplement et 9 jours pendant la période d'accouplement. Femelles : 38-40/groupe, non traitées	0, 0,4, 2,0, et 10,0 mg/kg/jour par voie intraveineuse. Accouplement 2 et 6 mois après le traitement. Autopsie (mâles) : 2 mois et 7 mois.	Fertilité réduite chez les mâles recevant des doses moyennes et élevées à la fin du traitement, associée à une atrophie et à une diminution du nombre de spermatozoïdes dans les testicules et l'épididyme. Dose moyenne : rétablissement complet de la fertilité après 2 mois; dose élevée : rétablissement minime de la fertilité après 6 mois. Aucun effet relié au traitement concernant l'accouplement, le nombre de petits et les taux de survie. Aucun effet létal dominant.
Souris Swiss-Webster Mâles : non traités Femelles : 40/groupe, traitées 14 jours avant l'accouplement et jusqu'après le sevrage.	0, 5, 20 et 90 mg/kg/jour par voie intraveineuse. Accouplement le 14 <sup>e</sup> jour du traitement (femelles autorisées à mettre bas) et 2 mois après le traitement. Autopsie (femelles) : aux deux périodes d'accouplement.	Dim. de la réceptivité à l'accouplement, dim. du taux de grossesse et augm. du taux de résorption chez les femelles traitées par de fortes doses à la première période d'accouplement; les petits présentaient des testicules et des vésicules séminales hypoplasiques ainsi qu'une incidence accrue d'hyperplasie épithéliale et d'hyperkératose de la partie non glandulaire de l'estomac. Disparition complète des changements reliés au traitement concernant l'accouplement, la fertilité et l'embryolétalité après 2 mois. Les petits des femelles recevant des doses légères et moyennes n'ont présenté aucun changement relié au médicament, et le comportement d'accouplement, la fertilité et la viabilité de la progéniture ont été normaux pour le cycle d'accouplement de la deuxième génération.
<b>Tératologie</b>		
Souris Swiss-Webster Femelles : 25/groupe traitées du 7 <sup>e</sup> au 16 <sup>e</sup> jour de la gestation.	0, 12, 36 et 108 mg/kg/jour Autopsie le 18 <sup>e</sup> jour de la gestation.	Diminution du gain de poids corporel chez les mères recevant les doses élevées, associée à une augm. du taux de résorption, une dim. de la taille des portées vivantes et du poids des fœtus vivants. Retard de croissance pour les fœtus des souris recevant des doses élevées, mais aucun effet tératologique relié au médicament n'a été noté après l'examen de l'apparence, du squelette et des viscères.
Lapin Dutch-Belted Femelles : 21/groupe traitées du 7 <sup>e</sup> au 19 <sup>e</sup> jour de la gestation.	0, 6, 20 et 60 mg/kg/jour Autopsie le 29 <sup>e</sup> jour de la gestation.	Les mères recevant les doses élevées ont montré des signes de toxicose, des pertes pondérales et la résorption de 12 des 14 portées. Réduction de poids fœtal et retard de croissance fœtale avec les doses moyennes et élevées. Malformations fœtales y compris fente palatine, hydrocéphalie et microphthalmie chez 2 mères traitées à doses moyennes et 2 traitées à doses élevées; les effets tératogènes ne semblaient pas résulter des effets toxiques chez la mère.



**Tableau 22 : Études sur le pouvoir mutagène**

Type d'étude	Dose	Effets	Conclusion
Épreuve d'Ames sur gélose avec <i>Salmonella</i> et test de conversion mitotique avec <i>Saccharomyces</i> (avec et sans activation dans les deux cas)	1, 10, 100, 500, 1 000, 2 500, 5 000 et 10 000 µg/gélose	Non toxique pour la souche bactérienne TA- 100 ou la souche de levures DI à 10 000 µg/gélose; cytotoxicité non évaluée pour quatre autres souches bactériennes utilisées. Les résultats des deux tests effectués avec ou sans activation ont été négatifs.	La DHPG n'a montré aucune activité mutagène dans les épreuves effectuées et n'a donc pas été considérée mutagène dans les conditions prévalant lors de ces épreuves.
Épreuve d'Ames en milieu liquide avec <i>Salmonella</i> (avec et sans activation)	500, 1 000, 1 250, 2 500 et 5 000 µg/mL	Non toxique pour la souche bactérienne TA- 100 – cytotoxicité non évaluée pour quatre autres souches bactériennes utilisées. Les résultats des deux tests effectués avec ou sans activation ont été négatifs.	La DHPG n'a montré aucune activité mutagène dans les épreuves effectuées et n'a donc pas été considérée mutagène dans les conditions prévalant lors de ces épreuves.
Test de l'échange entre chromatides- sœurs dans des lymphocytes humains (avec activation uniquement)	0,250, 0,500, 0,750, 1,0, 1,5 et 2,0 mg/mL	Croissance cellulaire retardée à 1,0 mg/mL et plus. Les résultats des tests effectués avec activation ont été positifs, à toutes les doses testées.	La DHPG était positive à toutes les concentrations dans les lymphoblastes humains dans les conditions prévalant lors de cette épreuve.
Test de mutation directe dans les cellules L5178Y de lymphome de souris, avec et sans activation	50, 100, 400, 500, 600 et 800 µg/mL sans activation; 100, 400, 800 et 1 000 µg/mL avec activation	Toxicité modérée ou très grande pour la gamme de doses utilisées. Les résultats de tous les tests effectués dans des conditions de toxicité modérée ont été positifs, avec ou sans activation.	La DHPG était positive pour une vaste gamme de concentrations dans les conditions prévalant lors de cette épreuve.
Test de transformation cellulaire dans les cellules BALB/c-3T3, sans activation	1,88, 7,5, 15, 25 et 40 µg/mL	Létalité totale à 62,5 µg/mL et plus. Survie des cellules : 12,8 % à 31,3 µg/mL, près des valeurs témoins à 3,91 µg/mL et moins. Les réactions de transformation aux doses évaluées n'ont pas été significativement élevées par rapport à la fréquence de transformations spontanées; aucune preuve de hausse de l'activité de transformation reliée à la dose.	La DHPG était considérée inactive dans ce test aux concentrations évaluées.
Test de formation de micronoyaux chez les souris CD- 1(ICR) mâles et femelles	50, 150 et 500 mg/kg de poids corporel par voie intraveineuse	Cytotoxicité de la moelle osseuse à la dose élevée. Tendances de relation à la dose pour les 2 sexes aux doses moyennes et élevées, avec une réponse maximale observée 48 heures après la dose.	La DHPG était considérée négative dans ce test à 50 mg/kg et positive à 150 et 500 mg/kg.

**Tableau 23 : Autres études sur la toxicité**

Protocole	Espèce souche	Voie dose	Nombre/sexe par groupe	Durée de l'étude	Résultats
Gonadotoxicité d'une dose unique	Souris Swiss-Webster	Intraveineuse 0, 2, 10, 30, 100 et 300 mg/kg	Mâles : 15/groupe thérapeutique Femelles : 15/groupe théér. (30, 100 et 300 mg/kg uniquement)	Dose unique avec autopsie 2 semaines, 1 mois et 3 mois après le traitement	Atrophie testiculaire et hypospermatogénèse chez les mâles 2 sem. et 1 mois après le traitement par 30, 100 et 300 mg/kg; guérison totale ou partielle au 3 <sup>e</sup> mois. Aucun changement relié au traitement chez les femelles.
Gonadotoxicité d'une dose unique	Chien Beagle	Intraveineuse 0, 1, 6, 30 et 150 mg/kg	Mâles : 2/groupe thérapeutique	Dose unique avec hémicastration à 1 mois suivie d'une autopsie à 2 mois, ou hémicastration à 2 mois suivie d'une autopsie à 4 mois (1 chien par groupe théér.)	Hypospermatogénèse 1 et 2 mois après le traitement par 30 ou 150 mg/kg; guérison totale à 4 mois. Aucun changement relié au traitement quant à l'état clinique, au poids corporel, à la FSH, à la LH ou à la testostérone.
Irritation veineuse	Lapin Néo-zélandais	Intraveineuse, solution à 45 mg/mL	Femelles : 2/groupe thérapeutique	Dose unique avec autopsie à 10, 30 et 240 minutes après le traitement.	Aucune pathologie macroscopique ou microscopique n'a été observée dans les veines auriculaires traitées.

## RÉFÉRENCES

1. Alcorn J, and McNamara PJ, Acyclovir, Ganciclovir, and Zidovudine Transfer into Rat Milk. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 2002; 46(6):1831–1836.
2. Buhles WC, Mastre B, Tinker AJ, Strand V, Koretz S.H, Syntex Collaborative Ganciclovir Treatment Study Group. Ganciclovir treatment of life-or sight-threatening cytomegalovirus infection: Experience in 314 immunocompromised patients. *Rev Infect Dis* 1988;10(Suppl 3):495-506.
3. Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux. Lignes directrices sur la manutention et l'élimination des substances pharmaceutiques dangereuses (médicaments cytotoxiques compris). Janvier 1991.
4. Collaborative DHPG Treatment Study Group. Treatment of serious cytomegalo-virus infections with 9-(1,3-dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine in patients with AIDS and other immunodeficiencies. *N Engl J Med* 1986;314: 801-5.
5. Erice A, Chou S, Biron KK, Stanat SC, Balfour HH, Jordan MC. Progressive disease due to ganciclovir-resistant cytomegalovirus in immunocompromised patients. *N Engl J Med* 1989;320(5):289-93.
6. Fletcher CV, Balfour HH. Evaluation of ganciclovir for cytomegalovirus disease. *DICP Ann Pharmacother* 1989;23:5-11.
7. Fletcher CV, Sawchuk R, Chinnock B, de Miranda P, Balfour HH. Human pharmacokinetics of the antiviral drug DHPG. *Clin Pharmacol Ther* 1986;40: 281-286.
8. Fong CKY, Cohen SD, McCormick S, Hsiung GD. Antiviral effect of 9-(1,3,dihydroxy-2-propoxymethyl) guanine against cytomegalovirus infection in a guinea pig model. Elsevier Science Publishers BV. (Biochemical Division). 1987;11-23.
9. Freedman PG, Weiner BC, Balthazar E. Cytomegalovirus esophagogastritis in a patient with acquired immuno-deficiency syndrome. *Am J Gastro* 1985; 80: 434-7.
10. Freitas VR, Smee, DF, Chernow M, Boehme R, Matthews TR. Activity of 9-(1,3-dihydroxy-2-propoxymethyl) guanine: compared with that of acyclovir against human, monkey and rodent cytomegaloviruses. *Antimicrob Agents Chemo* 1985;28:240-5.
11. Gertler SL, Pressman J, Price P, Brozinsky S, Miyai K. Gastrointestinal cytomegalovirus infection in a homosexual man with severe acquired immunodeficiency syndrome. *Gastroenterology* 1983;85:1403-6.
12. Goodrich JM, Mori M, Gleaves CA, Du Mond C, Cays M, Ebeling DF, Buhles WC, DeArmond B, Meyers JD. Early treatment with ganciclovir to prevent cytomegalovirus disease after allogeneic bone marrow transplantation. *N Engl J Med* 1991;325:1601-07.

13. Hardy WD. Combined ganciclovir and recombinant human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in the treatment of cytomegalovirus retinitis in AIDS patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 1991;4:S22-S28.
14. Hawley DA, Schaefer JF, Schulz DM, Muller J. Cytomegalovirus encephalitis in acquired immunodeficiency syndrome. *Am J Clin Pathol* 1983;80: 874-7.
15. Hochster H, Dieterich D, Bozzette S, Reichman RC, Connor JD, Liebes L, Sonke RL, Spector SA, Valentine F, Pettinelli C, Richman DD. Toxicity of combined ganciclovir and zidovudine for cytomegalovirus disease associated with AIDS. *Ann Int Med* 1990;113:111-7.
16. Jabs DA, Enger C, Bartlett JG. Cytomegalovirus retinitis and acquired immunodeficiency syndrome. *Arch Ophthalmol* 1989;107:75-80.
17. Jacobson MA, O'Donnell JJ, Brodie HR, Wofsy C, Mills J. Randomized prospective trial of ganciclovir maintenance therapy for cytomegalovirus retinitis. *Journal of Medical Virology* 1988;25:339-49.
18. Jacobson MA, Stanley HD, Heartd SE. Ganciclovir with recombinant methionyl human granulocyte-stimulating factor in the treatment of cytomegalovirus disease in AIDS patients. *AIDS* 1992;6:515-7.
19. Hochster H, Dietrich D, et al. Toxicity of Combined Ganciclovir and Zidovudine. *Annals of Internal Medicine*. 1990;113:111-117
20. Khadem M, Kalish SB, Goldsmith J, Fetkenhour C, O'Grady RB, Phair JP, Chrobak M. Ophthalmologic findings in acquired immune deficiency syndrome (AIDS). *Arch Ophthalmol* 1984;102:201-6.
21. Koretz SH, Buhles WC, Brewin A, Roe RL, Collaborative DHPG Treatment Study Group. Treatment of serious cytomegalovirus infections with 9-(1,3-dihydroxy-2-propoxymethyl) guanine in patients with AIDS and other immunodeficiencies. *N Engl J Med* 1986;314:801-5.
22. Laurence J. CMV infections in AIDS patients. *Infect in Med* 1986;262-5.
23. Manuel O, Venetz J-P, et al. Efficacy and safety of universal valganciclovir prophylaxis combined with a tacrolimus/mycophenolate-based regimen in kidney transplantation. *SWISS MED Weekly* 2007; 137: 669 – 676
24. Merigan TC, Renlund DG, Keay S, Bristow MR, Starnes V, O'Connell JB, Resta S, Dunn D, Gamberg P, Ratkovec RM, Richenbacher WE, Millar, RC, DuMond C, DeAmond B, Sullivan V, Cheney T, Buhles W, Stinson EB. A controlled trial of ganciclovir to prevent cytomegalovirus disease after heart transplantation. *N Engl J Med* 1992;326:1182-6.
25. Morris DJ, Adverse Effects and Drug Interactions of Clinical Importance with Antiviral Drugs. *Drug Safety* 1994: 10 (4): 281-291

26. Rozenbaum W, Gharakhanian S, Zazoun L, Vaseghi M, De Sahb R, Thomson M. Efficacy and toxicity of ganciclovir maintenance treatment in AIDS-related CMV retinitis. 5e Conférence internationale sur le sida, Montréal, 1989.
27. Schmidt GM, Horak DA, Niland JC, Duncan SR, Forman SJ, Zaia JA, City of Hope- Stanford-Syntex CMV Study Group. A randomized, controlled trial of prophylactic ganciclovir for cytomegalovirus pulmonary infection in recipients of allogeneic bone marrow transplants. *N Engl J Med* 1991;324:1005-11.
28. Shanley JD, Morningstar J, Jordan MC. Inhibition of murine cytomegalovirus lung infection and interstitial pneumonitis by acyclovir and 9-(1,3-dihydroxy-2-propoxymethyl) guanine. *Antimicrob Agent Chemother* 1985;28(2):172-5.
29. Smee DF, Boehme R, Chernow M, Binko BP, Matthews TR. Intracellular metabolism and enzymatic phosphorylation of 9-(1,3-dihydroxy-2-propoxymethyl) guanine and acyclovir in herpes simplex virus-infected and uninfected cells. *Biochem Pharmacol* 1985;34:1049-56.
30. Spector SA, Busch DF, Follansbee S et coll. Pharmacokinetic, safety, and antiviral profiles of oral ganciclovir in persons infected with human immunodeficiency virus: a phase I/II study. *J Infect Dis* 1995;171:1431-7.
31. Taburet A-M, and Singlas E, Drug Interactions with Antiviral Drugs. *Clinical Pharmacokinetics* 1996 May; 30 (5), 385-401.
32. The Oral Ganciclovir European and Australian Cooperative Study Group: Intravenous versus oral ganciclovir: European/Australian comparative study of efficacy and safety in the prevention of cytomegalovirus retinitis recurrence in patients with AIDS. *AIDS* 1995;9:471-7.
33. Wilson EJ, Medearis DN, Hansen LA, Rubin RH. 9-(1-3-Dihydroxy-2-Propoxymethyl) guanine prevents death but not immunity in murine cytomegalovirus-infected normal and immunosuppressed BALB/c mice. *Antimicrob Agent Chemother* 1987;31:1017-20.
34. Zeuzem S. Quantification of the initial decline of serum hepatitis C virus RNA and response to interferon alfa. *Hepatology* 1998;27:1149-56.
35. Monographie de Produit, CYTOVENE® Hoffman-La Roche Limitée, Numéro de contrôle de la présentation : 209988, en date du 8 janvier 2018.

**PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR**

<sup>Pr</sup>Ganciclovir pour injection USP  
Ganciclovir (sous forme de ganciclovir sodique)

500 mg/ fiole  
Poudre lyophilisée stérile

Le présent feuillet constitue la troisième et dernière partie de la « monographie de produit » publiée à la suite de l'homologation du ganciclovir pour injection USP pour la vente au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Ce feuillet est un résumé et ne contient pas tous les renseignements pertinents sur le ganciclovir pour injection USP. Pour toute question au sujet du médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**AU SUJET DE CE MÉDICAMENT****Les raisons d'utiliser ce médicament :**

- Le ganciclovir pour injection USP est un médicament offert sur ordonnance qui appartient à la famille des « antiviraux ».
- Le ganciclovir pour injection USP est utilisé pour traiter la rétinite à cytomégalovirus (CMV) chez les personnes atteintes du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ou chez les patients sous chimiothérapie.
- Le ganciclovir pour injection USP est également utilisé pour prévenir l'infection à cytomégalovirus (CMV) chez les patients ayant reçu une greffe d'organe solide risquant de présenter une telle infection.

**Les effets de ce médicament :**

- Le ganciclovir pour injection ralentit la croissance du virus CMV, le virus qui cause la rétinite à CMV et des infections à CMV touchant d'autres parties de l'organisme. Chez la plupart des personnes atteintes d'une rétinite à CMV, le ganciclovir pour injection ralentit la progression (propagation) de l'infection à CMV vers des cellules saines, protégeant ainsi contre la détérioration de la vue causée par le virus CMV.
- Le ganciclovir pour injection ne guérit pas la rétinite à CMV, de sorte que la rétinite peut progresser pendant ou après le traitement par le ganciclovir pour injection. Par conséquent, vous devez suivre les conseils de votre médecin et subir des examens réguliers des yeux.

**Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :**

Ne prenez pas de ganciclovir pour injection USP si vous avez déjà eu une réaction grave au ganciclovir, au valganciclovir ou à tout autre ingrédient non médicinal (voir « Les ingrédients non médicinaux sont »). L'utilisation du ganciclovir pour injection en présence d'une hypersensibilité connue à l'acyclovir ou à son promédicament, le valacyclovir.

**L'ingrédient médicinal est :**

L'ingrédient actif du ganciclovir pour injection USP est le ganciclovir sodique.

**Les ingrédients non médicinaux sont :**

Hydroxyde de sodium (80 mg), azote (quantité suffisante) et eau pour injection (3,5 mL).

**Les formes posologiques :**

Le ganciclovir pour injection USP est une poudre blanche ou blanchâtre contenue dans une fiole. Chaque fiole contient l'équivalent de 500 mg de l'ingrédient actif, le ganciclovir. La solution est reconstituée par la dissolution de la poudre dans un liquide pour injection.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS****Mises en garde et précautions importantes**

- De sérieux troubles sanguins peuvent survenir telle une faible numération de globules blancs, de globules rouges ou de plaquettes.
- Des tumeurs ont été notées chez des animaux de laboratoire recevant ce médicament; aucune étude chez les humains n'a observé ce phénomène. Le médicament a aussi des effets néfastes sur le système reproducteur. Chez les hommes, il peut réduire la quantité de spermatozoïdes dans le sperme, et ce, de façon complète et irréversible. Chez les femmes, non seulement il peut compromettre la fertilité, mais toute grossesse survenant pendant le traitement entraînera probablement des anomalies congénitales chez l'enfant.

**Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT de prendre le ganciclovir pour injection USP dans les cas suivants :**

- Si vous avez ou avez déjà présenté une faible numération des globules blancs, des globules rouges ou des plaquettes.
- Si vous prenez de l'acyclovir du valganciclovir ou du valacyclovir.
- Si vous avez des problèmes rénaux.
- Si vous êtes traité par hémodialyse.
- Si vous prenez TOUT autre médicament (sur ordonnance ou en vente libre), y compris les produits naturels et à base de plantes médicinales.
- Si vous ou votre partenaire êtes enceinte, prévoyez devenir enceinte ou allaitez, car le ganciclovir pour injection USP peut causer des anomalies congénitales chez l'humain et ne devrait pas être utilisé pendant la grossesse. S'il y a une chance que vous ou votre partenaire puissiez devenir enceinte, il est très important d'utiliser une méthode obstructive (condom) en plus d'une autre forme de contraception (contraceptif oral, dispositif intra-utérin) pendant le traitement par le ganciclovir pour injection USP et pendant au moins 30 jours après la fin du traitement. Le partenaire de sexe masculin doit utiliser un condom pendant le traitement par le ganciclovir pour injection USP et pendant au moins 90 jours après la fin du traitement, à

moins d'être certain que sa partenaire ne risque pas de devenir enceinte. Les femmes séropositives ne doivent pas allaiter, car l'infection au VIH peut être transmise au nourrisson par le lait maternel.

Ces renseignements vous aideront, vous et votre médecin, à déterminer si vous pouvez utiliser le ganciclovir pour injection USP et quelles précautions supplémentaires devront être prises pendant votre traitement. Vous devriez toujours consulter votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser tout autre médicament pendant votre traitement par le ganciclovir pour injection USP.

**INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT**

Mentionnez à votre médecin ou à votre pharmacien tous les autres médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sans ordonnance, les remèdes à base de plantes et les produits naturels. Le ganciclovir pour injection USP peut modifier l'effet des autres médicaments.

Si vous prenez les médicaments suivants en même temps que le ganciclovir pour injection USP, il faudra peut-être en changer la dose :

- zidovudine
- didanosine
- probénécide
- cyclosporine
- mofétilmycophénolate

Imipénem-cilastatine - Si vous prenez l'association imipénem-cilastatine, dites-le à votre médecin. Des crises convulsives sont apparues chez des patients qui prenaient cette association et le ganciclovir. Vous pouvez discuter de différentes options avec votre médecin.

**UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT**

**Posologie habituelle chez l'adulte :**

**Traitement de la rétinite à CMV**

La dose initiale est habituellement de 5 milligrammes par kilogramme de poids corporel (donc 5 mg/kg). La dose peut être administrée toutes les 12 heures pendant 14 à 21 jours.

**Traitement d'entretien de la rétinite à CMV**

On peut administrer une dose de 5 mg/kg une fois par jour pendant 7 jours, ou de 6 mg/kg une fois par jour pendant 5 jours.

**Prévention de la rétinite à CMV chez les receveurs de greffe**

La dose initiale habituelle est de 5 milligrammes par kilogramme de poids corporel (5 mg/kg). La dose peut être administrée toutes les 12 heures pendant 7 à 14 jours.

Si vos reins ne fonctionnent pas normalement, votre médecin pourra vous prescrire une dose différente.

Pour évaluer l'effet du traitement, vous devrez subir des tests sanguins réguliers.

**Surdosage :**

Si vous pensez avoir pris une quantité excessive de ganciclovir pour injection USP, contactez votre professionnel de la santé, l'urgence d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

**PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES**

Tous les médicaments ont des effets secondaires. Si vous ne vous sentez pas bien pendant que vous prenez le ganciclovir pour injection USP, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien le plus tôt possible.

Les effets secondaires les plus courants incluent : nausées, diarrhée, problèmes d'estomac, douleurs abdominales, maux de tête, douleur au point d'injection, toux, fièvre et perte de poids. Consultez votre médecin si ces effets deviennent inconfortables.

**EFFETS SECONDAIRES GRAVES, FRÉQUENCE DE LEUR SURVENUE ET PROCÉDURES À SUIVRE**

Symptôme / effet		Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et sollicitez des soins médicaux d'urgence
		Dans les cas graves seulement	Dans tous les cas	
<b>Fréquent</b>	Troubles sanguins (voir le texte)		✓	
	Décollement de la rétine*		✓	
	Réactions cutanées graves (dermatite exfoliative)		✓	

\*Le médecin pourra recommander des examens fréquents des yeux.

**Troubles sanguins.** Le ganciclovir pour injection peut causer de graves troubles sanguins, comme une baisse du nombre de globules blancs (granulopénie, neutropénie ou leucopénie) ou du nombre de globules rouges (anémie). Le ganciclovir pour injection peut également causer une élévation de la créatinine dans le sang. Votre médecin devrait vous recommander de passer des tests sanguins à intervalles réguliers.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines :** Le ganciclovir pour injection USP peut réduire votre capacité de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines. Évitez de conduire, d'utiliser des outils ou de faire fonctionner des machines si vous avez des troubles de vision ou d'autres problèmes qui pourraient affaiblir vos facultés, par exemple si

vous êtes étourdi ou fatigué. En cas de doute, parlez à votre médecin.

*Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu pendant votre traitement par le ganciclovir pour injection USP, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.*

### **COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

Poudre lyophilisée : Conserver à la température ambiante (15 °C à 30 °C), à l'abri de l'humidité.

Conditions d'entreposage pour la solution reconstituée (avec de l'eau pour injection) : La solution reconstituée dans la fiole peut être entreposée à 15 °C à 30 °C pendant un maximum de 12 heures et ne doit pas être réfrigérée.

Conditions d'entreposage pour la solution diluée (diluée avec une solution physiologique salée, une solution aqueuse de dextrose à 5 %, une solution injectable de Ringer ou une solution injectable de Ringer avec lactate) : Conserver réfrigérée à 2 °C à 8 °C. La stabilité du ganciclovir pour injection sur les plans physique et chimique dure 14 jours dans des sacs de polychlorure de vinyle (PVC). Cependant, comme le ganciclovir pour injection est reconstitué avec de l'eau stérile qui n'est pas bactériostatique, il est recommandé d'utiliser la solution pour perfusion dans les 24 heures qui suivent la dilution afin de réduire le risque de contamination bactérienne. Les solutions reconstituées puis diluées doivent être réfrigérées. La congélation n'est pas recommandée.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Vous pouvez signaler tout effet secondaire soupçonné d'être associé à l'emploi des produits de santé à Santé Canada :

- en visitant la page web sur la Déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffets-canada.html>) pour l'information relative à la déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345

**REMARQUE :** *Si vous avez besoin de renseignements concernant la prise en charge des effets secondaires, communiquez avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.*

### **POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

**Pour en savoir plus sur le ganciclovir pour injection USP :**

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Lisez la monographie de produit intégrale, rédigée à l'intention des professionnels de la santé. Celle-ci renferme également les Renseignements destinés aux patients. Vous

pouvez les obtenir sur le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche>) , sur le site du fabricant <http://www.eugia.ca>, ou en téléphonant au 1-855-648-6681.

Ce dépliant a été rédigé par

**Eugia Pharma Inc.**

3700, avenue Steeles Ouest, Suite 402  
Woodbridge, Ontario L4L 8K8  
Canada

Date de préparation: Le 16 juin 2023