



Peel back label, front, central panel: SELON-E

DIN 01955551
Code 440731

Sterile emulsion
Émulsion stérile

Selon-E®

Selenium and Vitamin E Injection
Injection de sélénium et vitamine E

VETERINARY USE ONLY
USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

WARNINGS: Withdrawal periods: Meat: 35 days. For complete warnings, see peel-back label.
MISES EN GARDE : Période de retrait : Viande : 35 jours. Pour les mises-en-garde complètes, voir l'étiquette dépliante.

Net 100 mL



Date of last revision: July 27, 2023

Peel back label, front, right lateral panel: SELON-E

INGRÉDIENTS ACTIFS (par ml)

Sélénum (sous forme de sélénite de sodium).....3,0 mg
Vitamine E (acétate de tocophéryle)..... 136 U.I.

AGENTS DE CONSERVATION

Alcool benzyllique10 mg/ml

INDICATIONS : Pour la prévention et le traitement de la dystrophie musculaire (maladie du muscle blanc) chez les veaux et les agneaux.

ENTREPOSAGE : Entreposer entre 15°C et 25°C.

Consulter l'étiquette dépliante pour les sections POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION, PRÉCAUTIONS, RÉACTIONS INDÉSIRABLES et MISES EN GARDE.

Vetoquinol N.-A. Inc.

2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC, Canada J5T 3S5

Lot :

Exp. :

Peel back label, front, left lateral panel: SELON-E

ACTIVE INGREDIENTS (per mL)

Selenium (as sodium selenite).....3.0 mg
Vitamin E (tocopherol acetate)..... 136 I.U.

PRESERVATIVES

Benzyl Alcohol.....10 mg/mL

INDICATIONS: For the prevention and treatment of white muscle disease (muscular dystrophy) in calves and lambs.

STORAGE: Store between 15°C and 25°C.

Consult the peel-back label for sections DOSAGE AND ADMINISTRATION, CAUTIONS, ADVERSE REACTIONS and WARNINGS.

UPC: 6 73994 11344 7

Date of last revision: July 27, 2023

Peel back label, inside

SELON-E®

DIN 01955551

Selenium and Vitamin E Injection
Sterile Emulsion

Veterinary Use Only

ACTIVE INGREDIENTS (per mL)

Selenium (as sodium selenite).....	3.0 mg
Vitamin E (tocopherol acetate).....	136 I.U.

PRESERVATIVES

Benzyl Alcohol.....10 mg/mL

INDICATIONS: For the prevention and treatment of white muscle disease (muscular dystrophy) in calves and lambs.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: Administer intramuscularly.

Prevention: Calves: All ages, 1 mL per 45 kg body weight. Lambs: Newborn, 1/4 mL. 2-8 weeks, 1/2 mL.

Treatment: Calves: 2 mL per 45 kg body weight. Lambs: 1/2 mL

CAUTIONS: This product contains the toxic substance selenium. Do not exceed recommended dosages. Administer only to animals who are known to be ingesting sub-normal levels of selenium. In case of an anaphylactic reaction, administer epinephrine immediately.

ADVERSE REACTIONS: Anaphylactic reactions, some of which have been fatal, have been reported very rarely after the use of this product.

WARNINGS: Not for use in lactating dairy cattle. Do not administer at less than 30 days intervals. Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 35 days after the latest treatment with this drug.
Do not exceed recommended dose. Keep out of reach of children.

STORAGE: Store between 15°C and 25°C.

Vetoquinol N.-A. Inc.

2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC, Canada J5T 3S5

Selon-E is a Registered Trademark of Vetoquinol N.-A. Inc.

Date of last revision: July 27, 2023

Peel back label, inside

SELON-E®

DIN 01955551

Injection de sélénium et vitamine E
Émulsion stérile

Usage vétérinaire seulement

INGRÉDIENTS ACTIFS (par ml)

Sélénum (sous forme de sélénite de sodium).....3,0 mg
Vitamine E (acétate de tocophéryle).....136 U.I.

AGENTS DE CONSERVATION

Alcool benzyllique10 mg/ml

INDICATIONS : Pour la prévention et le traitement de la dystrophie musculaire (maladie du muscle blanc) chez les veaux et les agneaux.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : Administration par voie intramusculaire.

Prévention : Veaux : À tout âge, 1 ml par 45 kg de poids vif. Agneaux : Nouveaux nés, 1/4 ml. Âgés de 2 à 8 semaines, 1/2 ml.

Traitement : Veaux : 2 ml par 45 kg de poids vif. Agneaux : 1/2 ml.

PRÉCAUTIONS : Ce produit contient la substance toxique sélénum. Ne pas dépasser les doses recommandées. N'administrer qu'aux animaux dont on sait qu'ils ingèrent des niveaux de sélénum inférieurs à la normale. En cas de réaction anaphylactique, administrer immédiatement de l'épinéphrine.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES : Des réactions anaphylactiques, dont certaines ont été fatales, ont été rapportées très rarement après l'utilisation de ce produit.

MISES EN GARDE : Ne pas utiliser pour traiter les vaches laitières en lactation. Ne pas administrer à moins de 30 jours d'intervalle. Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 35 jours après le dernier traitement avec ce médicament. **Ne pas dépasser la posologie recommandée. Tenir hors de la portée des enfants.**

ENTREPOSAGE : Entreposer entre 15°C et 25°C.

Vetoquinol N.-A. Inc.

2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC, Canada J5T 3S5

Selon-E est une marque déposée de Vetoquinol N.-A. Inc.