

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Package Insert (English)

DIN 02173255

Pr **Cefa-Dri®**

Cephapirin Benzathine
Intramammary suspension
(dry cows)
Veterinary Use Only
Sterile




Description: Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine) for intramammary infusion into the dry cow is a product which provides a wide range of bactericidal activity against gram-positive and gram-negative organisms. It is derived biosynthetically from 7-aminocephalosporanic acid.

The chemical name for cephapirin benzathine is:

(6R,7R)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(4-pyridylthio)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid compound with N,N'-dibenzylethylenediamine (2:1)

The chemical structure of cephapirin benzathine is:



Its empirical formula is: $(C_{17}H_{17}N_3O_6S_2)_2 \cdot C_{16}H_{20}N_2$

Active Ingredient: Each 10 mL disposable sterile syringe contains 300 mg of Cephapirin activity in a stable peanut oil gel.

Storage: Store between 15°C- 25°C. Do not freeze.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Action: In the non-lactating mammary gland, Cefa-Dri® provides bactericidal levels of the active antibiotic, Cephapirin, for a prolonged period of time. This prolonged activity is due to the low solubility of the Cephapirin benzathine and to the slow-release gel base.

Cephapirin is bactericidal to susceptible organisms; it is known to be highly active against *Streptococcus agalactiae*.

To determine the susceptibility of bacteria to Cephapirin in the laboratory, the class disc, Cephalothin Susceptibility Test Discs, 30 mcg, should be used.

Indications: For the treatment of mastitis caused by *Streptococcus agalactiae* in dairy cows during the dry period.

Cefa-Dri® has been shown by extensive clinical studies to be efficacious in the treatment of mastitis in dry cows, when caused by *Streptococcus agalactiae*.

Treatment of the dry cow with Cefa-Dri® is indicated in any cow known to harbour any of these organisms in the udder at drying off.

Dosage and directions for use: Cefa-Dri® is for use in dry cows only. Infuse each quarter at the time of drying off with a single 10 mL syringe. **Use no later than 30 days prior to calving.**

Completely milk out all four quarters. The udder and teats should be thoroughly washed with warm water containing a suitable dairy antiseptic and dried, preferably using individual paper towels. Carefully scrub the teat end and orifice with 70% alcohol, using a separate swab for each teat. **Allow to dry.**

Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine) is packaged with the protective cap.

For partial insertion: Twist off upper portion of the protective cap to expose 3-4 mm of the syringe tip.

For full insertion: Remove protective cap to expose the full length of the syringe tip. Insert syringe tip into the teat canal and expel the entire contents of syringe into the quarter. Withdraw the syringe and gently massage the quarter to distribute the medication.

Do not infuse contents of the mastitis syringe into the teat canal if the protective cap is broken or damaged.

Caution: Cefa-Dri® should be administered with caution to subjects which have demonstrated some form of allergy, particularly to penicillin. Such reactions are rare; however, should they occur, discontinue use, and consult your veterinarian.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Warnings: For use in dry cows only. Not to be used within 30 days of calving. Milk from treated cows must not be used for food during the first 84 hours after calving. Any animal infused with this product must not be slaughtered for food until 42 days after the latest dose . Peanut Allergy Warning: This product contains peanut oil. Keep out of reach of children.

Supply: Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine) for intramammary infusion into dry cow Cephapirin benzathine equivalent to 300 mg of Cephapirin activity per 10 mL syringeCarton containing 24 x 10 mL syringes or pail containing 144 x 10 mL syringes.

Cefa-Dri® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., used under license.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.
5180 South Service Road
Burlington ON L7L

Package Insert (French)

DIN 02173255

Pr Cefa-Dri®
Benzathine céphapirine
Suspension intramammaire
(vaches tarées)
Usage vétérinaire seulement
Stérile




Description : Cefa-Dri® (benzathine céphapirine) pour perfusion intramammaire chez la vache tarée est un produit doté d'un large spectre d'activité bactéricide contre les organismes pathogènes gram-positifs et gram-négatifs. Il est produit par procédé biosynthétique à partir de l'acide 7-amino-céphalosporanique.

La dénomination chimique de la benzathine céphapirine est :

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

(6R,7R)-3-(hydroxyméthyle)-8-oxo-7-[2-(4-pyridylthio)acétamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-composé d'acide carboxylique avec N,N'-dibenzyléthylènediamine (2:1)

La composition chimique de la benzathine céphapirine est :



Sa formule empirique est : $(C_{17}H_{17}N_3O_6S_2)_2 \cdot C_{16}H_{20}N_2$

Ingrédient actif : Chaque seringue stérile jetable de 10 mL renferme 300 mg de céphapirine active dans un gel stable d'huile d'arachides.

Entreposage : Entreposer à une température entre 15 °C et 25 °C. Protéger du gel.

Action : Dans la glande mammaire tarie, Cefa-Dri® procure des taux bactéricides de l'antibiotique actif céphapirine pendant une période prolongée. Cette activité prolongée est due à la faible solubilité de la benzathine céphapirine et à la base de gel à libération lente.

La céphapirine est bactéricide à l'endroit des organismes pathogènes sensibles. On connaît sa grande efficacité contre *Streptococcus agalactiae*.

Pour déterminer la sensibilité des bactéries à la céphapirine en laboratoire, utiliser le disque pour antibiogramme imprégné de 30 mcg de céphalothine.

Indications : Pour le traitement de la mammite causée par *Streptococcus agalactiae* chez les vaches laitières durant la période de tarissement.

Dans le cadre d'études cliniques approfondies, Cefa-Dri® s'est révélé efficace dans le traitement de la mammite chez la vache tarie lorsqu'elle est causée par *Streptococcus agalactiae*.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Le traitement de la vache tarie par Cefa-Dri® est indiqué chez toute vache dont le pis héberge l'un de ces organismes pathogènes au moment du tarissement.

Posologie et mode d'emploi : Cefa-Dri® doit être utilisé chez des vaches taries seulement. Administrer tout le contenu d'une seringue de 10 mL dans chaque quartier affecté au moment du tarissement. **Ne pas utiliser dans les 30 jours précédant la mise bas.**

Traire le pis complètement. Bien laver le pis et les trayons avec de l'eau tiède additionnée d'un antiseptique convenant aux élevages laitiers et bien assécher à l'aide de serviettes de papier individuelles préférablement. Désinfecter soigneusement l'extrémité du trayon et son orifice à l'aide de tampons d'alcool à 70 % en utilisant un tampon pour chaque trayon. **Laisser sécher.**

Cefa-Dri® (benzathine céphapirine) est présenté avec un embout protecteur.

Pour introduction partielle : Dévisser la portion supérieure de l'embout protecteur afin d'exposer 3 à 4 mm de l'extrémité de la seringue.

Pour introduction complète : Retirer l'embout protecteur pour exposer entièrement l'extrémité de la seringue. Insérer l'extrémité de la seringue dans le canal du trayon et injecter le contenu entier d'une seringue dans le quartier. Retirer la seringue et masser délicatement le quartier afin de distribuer le médicament.

Ne pas injecter le contenu de la seringue dans le canal du trayon si l'embout protecteur est endommagé ou brisé.

Précaution : Cefa-Dri® devrait être administré avec prudence aux sujets qui ont manifesté une forme d'allergie, particulièrement à la pénicilline. Ces réactions sont rares, mais le cas échéant, cesser le traitement et consulter votre vétérinaire.

Mises en garde : N'utiliser que chez les vaches taries. Ne pas utiliser dans les 30 jours précédant la mise bas. Le lait provenant des vaches traitées ne doit pas être utilisé à des fins alimentaires dans les 84 heures suivant la mise bas. Les animaux ayant reçu une perfusion de ce produit ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 42 jours après la dernière dose. Mise en garde contre l'allergie aux arachides : Ce produit renferme de l'huile d'arachides. Garder hors de la portée des enfants.

Présentation : Cefa-Dri® (benzathine céphapirine) pour perfusion intramammaire chez la vache tarie. Benzathine céphapirine équivalant à 300 mg de céphapirine active par seringue de 10 mL. Boîte de 24 seringues de 10 mL ou contenant de 144 seringues de 10 mL.

Cefa-Dri® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., utilisée sous licence.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Syringe Label

Net: 10 mL

DIN 02173255

Pr Cefa-Dri®

Cephapirin Benzathine

Benzathine céphapirine

Veterinary Use Only

Usage vétérinaire seulement

Sterile/Stérile

Intramammary Suspension (dry cows)

Suspension intramammaire (vaches tarées)

300 mg of Cephapirin activity

300 mg de céphapirine active

Warnings: This product contains peanut oil. Keep out of reach of children. See package insert for Warnings and complete information.

Storage: Store between 15°C- 25°C. Do not freeze.

Mises en garde : Ce produit renferme de l'huile d'arachides. Garder hors de la portée des enfants. Voir la notice pour les mises en garde et l'information complète.

Entreposage : Entreposer à une température entre 15 °C et 25 °C. Protéger du gel.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.

Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.

5180 South Service Road

Burlington ON L7L 5H4

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components



Lot.

Exp.

Carton Label (24 x 10 mL)

Front Panel

Net: 24 x 10 mL

DIN 02173255

Pr **Cefa Dri®**

Cephapirin Benzathine

Benzathine céphapirine

Veterinary Use Only

Usage vétérinaire seulement

Intramammary Suspension (dry cows)

Suspension intramammaire (vaches tarées)

300 mg of Cephapirin activity

300 mg de céphapirine active

Sterile/Stérile



Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Back Panel

Lot.

Exp.

Side Panel (English)

Active Ingredient: Each 10 mL Sterile syringe contains 300 mg of Cephapirin activity in a stable peanut oil gel.

Warnings: For use in dry cows only. Not to be used within 30 days of calving. Milk from treated cows must not be used as food during the first 84 hours after calving. Any animal infused with this product must not be slaughtered for food until 42 days after the latest dose . Peanut Allergy Warning: This product contains peanut oil. Keep out of reach of children

Indications: For the treatment of mastitis caused by Streptococcus agalactiae in dairy cows during the dry period.

Cefa-Dri® has been shown by extensive clinical studies to be efficacious in the treatment of mastitis in dry cows, when caused by Streptococcus agalactiae.

Treatment of the dry cow with Cefa-Dri® is indicated in any cow known to harbour any of these organisms in the udder at drying off.

Contains 24 alcohol pads.

Directions for Use: Infuse each quarter at time of drying off with a single 10 mL syringe. See package insert for Directions for Use.

Caution: Cefa-Dri® should be administered with caution to subjects which have demonstrated some form of allergy, particularly to penicillin. Such reactions are rare; however, should they occur, discontinue use and consult your veterinarian.

READ PACKAGE INSERT.

Storage: Store between 15°C- 25°C. Do not freeze.

Cefa-Dri® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., used under license.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

5180 South Service Road
Burlington ON L7L 5H4

Side Panel (French)

Ingrédient actif : Chaque seringue stérile de 10 mL renferme 300 mg de céphapirine active dans un gel stable d'huile d'arachides.

Mises en garde : N'utiliser que chez les vaches tarées. Ne pas utiliser dans les 30 jours précédant la mise bas. Le lait provenant des vaches traitées ne doit pas être utilisé à des fins alimentaires dans les 84 heures suivant la mise bas. Les animaux ayant reçu une perfusion de ce produit ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 42 jours après la dernière dose. Mise en garde contre l'allergie aux arachides : Ce produit renferme de l'huile d'arachides. Garder hors de la portée des enfants.

Indications : Pour le traitement de la mammite causée par *Streptococcus agalactiae* chez les vaches laitières durant la période de tarissement.

Dans le cadre d'études cliniques approfondies, Cefa-Dri® s'est révélé efficace dans le traitement de la mammite chez la vache tarie lorsqu'elle est causée par *Streptococcus agalactiae*.

Le traitement de la vache tarie par Cefa-Dri® est indiqué chez toute vache dont le pis héberge l'un de ces organismes pathogènes au moment du tarissement.

Renferme 24 tampons d'alcool.

Mode d'emploi : Injecter le contenu d'une seringue de 10 mL dans chaque quartier au moment du tarissement. Voir la notice pour le mode d'emploi.

Précaution : Cefa-Dri® devrait être administré avec prudence aux sujets qui ont manifesté une forme d'allergie, particulièrement à la pénicilline. Ces réactions sont rares, mais le cas échéant, cesser le traitement et consulter votre vétérinaire.

VOIR LA NOTICE.

Entreposage : Entreposer à une température entre 15 °C et 25 °C. Protéger du gel.

Cefa-Dri® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., utilisée sous licence.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.
5180 South Service Road
Burlington ON L7L 5H4

Top Panel

Net: 24 x 10 mL

DIN 02173255

Pr **Cefa-Dri®**

Cephapirin Benzathine
Benzathine céphapirine
Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Intramammary Suspension (dry cows)/Suspension intramammaire (vaches tarées)
300 mg of Cephapirin activity/300 mg de céphapirine active
Sterile/Stérile

Warnings: For use in dry cows only. Not to be used within 30 days of calving. Milk from treated cows must not be used as food during the first 84 hours after calving. Any animal infused with this product must not be slaughtered for food until 42 days after the latest dose.
Peanut Allergy Warning: This product contains peanut oil. Keep out of reach of children.

Mises en garde : N'utiliser que chez les vaches tarées. Ne pas utiliser dans les 30 jours précédant la mise bas. Le lait provenant des vaches traitées ne doit pas être utilisé à des fins alimentaires dans les 84 heures suivant la mise bas. Les animaux ayant reçu une perfusion de ce produit ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 42 jours après la dernière dose.
Mise en garde contre l'allergie aux arachides :
Ce produit renferme de l'huile d'arachides. Garder hors de la portée des enfants.



Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Pail Label (144 x 10 mL)

Front Label

Net: 144 x 10 mL

DIN 02173255

Pr **Cefa Dri®**

Cephapirin Benzathine

Veterinary Use Only

Intramammary Suspension

(dry cows)

300 mg of cephapirin activity

Sterile

Warnings: For use in dry cows only. Not to be used within 30 days of calving.

Milk from treated cows must not be used as food during the first 84 hours after calving.

Any animal infused with this product must not be slaughtered for food until 42 days after the latest dose. Peanut Allergy Warning: This product contains peanut oil.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Keep out of reach of children.



Back Panel:

Net : 144 x 10 mL

DIN 02173255

Pr **Cefa-Dri®**

Benzathine céphapirine

Usage vétérinaire seulement

Suspension intramammaire

(vaches tarées)

300 mg de céphapirine active

Stérile

Mises en garde : N'utiliser que chez les vaches tarées. Ne pas utiliser dans les 30 jours précédant la mise bas. Le lait provenant des vaches traitées ne doit pas être utilisé à des fins alimentaires dans les 84 heures suivant la mise bas. Les animaux ayant reçu une perfusion de ce produit ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 42 jours après la dernière dose. Mise en garde contre l'allergie aux arachides : Ce produit renferme de l'huile d'arachides. Garder hors de la portée des enfants.



Side Panel-English

Description: Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine) for intramammary infusion into the dry cow is a product which provides a wide range of bactericidal activity against gram-positive and gram-negative organisms. It is derived biosynthetically from 7 aminocephalosporanic acid.

Active Ingredient: Each 10 mL disposable sterile syringe contains Cephapirin benzathine equivalent to 300 mg of Cephapirin activity in a stable peanut oil gel.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Action: In the non-lactating mammary gland, Cefa-Dri® provides bactericidal levels of the active antibiotic, Cephapirin, for a prolonged period of time. This prolonged activity is due to the low solubility of the Cephapirin benzathine and to the slow release gel base.

Cephapirin is bactericidal to susceptible organisms; it is known to be highly active against *Streptococcus agalactiae*

Indications: For the treatment of mastitis caused by *Streptococcus agalactiae* in dairy cows during the dry period.

Cefa-Dri® has been shown by extensive clinical studies to be efficacious in the treatment of mastitis in dry cows, when caused by *Streptococcus agalactiae*.

Treatment of the dry cow with Cefa-Dri® is indicated in any cow known to harbour any of these organisms in the udder at drying off.

Contains 144 alcohol pads.

Directions for Use: Infuse each quarter at time of drying off with a single 10 mL syringe.

Completely milk out all four quarters. The udder and teats should be thoroughly washed with warm water containing a suitable dairy antiseptic and dried, preferably using individual paper towels. Carefully scrub the teat end and orifice with 70% alcohol, using a separate swab for each teat. **Allow to dry.**

Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine) is packaged with the protective cap.

For partial insertion: Twist off upper portion of the protective cap to expose 3-4 mm of the syringe tip.

For full insertion: Remove protective cap to expose full length of the syringe tip.

Insert syringe tip into the teat canal and expel the entire contents of syringe into the quarter.

Withdraw the syringe and gently massage the quarter to distribute the medication. Do not infuse contents of the mastitis syringe into the teat canal if the protective cap is broken or damaged.

Caution: Cefa-Dri® should be administered with caution to subjects which have demonstrated some form of allergy, particularly to penicillin. Such reactions are rare; however, should they occur, discontinue use and consult your veterinarian.

Warnings: For use in dry cows only. Not to be used within 30 days of calving. Milk from treated cows must not be used as food during the first 84 hours after calving. Any animal infused with this product must not be slaughtered for food until 42 days after the latest dose

Peanut Allergy Warning: This product contains peanut oil. Keep out of reach of children.

Storage: Store between 15°C- 25°C. Do not freeze.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

Cefa-Dri® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., used under license.

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.

5180 South Service Road

Burlington ON L7L 5H4

Side Panel (French)

Description : Cefa-Dri® (benzathine céphapirine) pour perfusion intramammaire chez la vache tarie est un produit doté d'un large spectre d'activité bactéricide contre les organismes pathogènes gram-positifs et gram-négatifs. Il est produit par procédé biosynthétique à partir de l'acide 7-amino-céphalosporanique.

Ingrédient actif : Chaque seringue stérile jetable de 10 mL renferme de la benzathine céphapirine équivalant à 300 mg de céphapirine active dans un gel stable d'huile d'arachides.

Action : Dans la glande mammaire tarie, Cefa-Dri® procure des taux bactéricides de l'antibiotique actif céphapirine pendant une période prolongée. Cette activité prolongée est due à la faible solubilité de la benzathine céphapirine et à la base de gel à libération lente.

La céphapirine est bactéricide à l'endroit des organismes pathogènes sensibles. On connaît sa grande efficacité contre *Streptococcus agalactiae*.

Indications : Pour le traitement de la mammite causée par *Streptococcus agalactiae* chez les vaches laitières durant la période de tarissement.

Dans le cadre d'études cliniques approfondies, Cefa-Dri® s'est révélé efficace dans le traitement de la mammite chez la vache tarie lorsqu'elle est causée par *Streptococcus agalactiae*.

Le traitement de la vache tarie par Cefa-Dri® est indiqué chez toute vache dont le pis héberge l'un de ces organismes pathogènes au moment du tarissement.

Renferme 144 tampons d'alcool.

Mode d'emploi : Injecter le contenu d'une seringue de 10 mL dans chaque quartier au moment du tarissement.

Traire le pis complètement. Bien laver le pis et les trayons avec de l'eau tiède additionnée d'un antiseptique convenant aux élevages laitiers et bien assécher à l'aide de serviettes de papier

Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc.
Cefa-Dri® (Cephapirin benzathine)
Intramammary Suspension /Proposed Labeling Components

individuelles préférablement. Désinfecter soigneusement l'extrémité du trayon et son orifice à l'aide de tampons d'alcool à 70 % en utilisant un tampon pour chaque trayon. **Laisser sécher.**

Cefa-Dri® (benzathine céphapirine) est présenté avec un embout protecteur.

Pour introduction partielle : Dévisser la portion supérieure de l'embout protecteur afin d'exposer 3 à 4 mm de l'extrémité de la seringue.

Pour introduction complète : Retirer l'embout protecteur pour exposer entièrement l'extrémité de la seringue. Insérer l'extrémité de la seringue dans le canal du trayon et injecter le contenu entier d'une seringue dans le quartier. Retirer la seringue et masser délicatement le quartier afin de distribuer le médicament.

Ne pas injecter le contenu de la seringue dans le canal du trayon si l'embout protecteur est endommagé ou brisé.

Précaution : Cefa-Dri® devrait être administré avec prudence aux sujets qui ont manifesté une forme d'allergie, particulièrement à la pénicilline. Ces réactions sont rares, mais le cas échéant, cesser le traitement et consulter votre vétérinaire.

Mises en garde : N'utiliser que chez les vaches tarées. Ne pas utiliser dans les 30 jours précédant la mise bas. Le lait provenant des vaches traitées ne doit pas être utilisé à des fins alimentaires dans les 84 heures suivant la mise bas. Les animaux ayant reçu une perfusion de ce produit ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 42 jours après la dernière dose. Mise en garde contre l'allergie aux arachides : Ce produit renferme de l'huile d'arachides. Garder hors de la portée des enfants.

Entreposage : Entreposer à une température entre 15 °C et 25 °C. Protéger du gel.

Cefa-Dri® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., utilisée sous licence.

Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.

5180 South Service Road

Burlington ON L7L 5H4

51745515

471821-01