

MONOGRAPHIE DE PRODUIT  
INCLUANT LES RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

**PrM-AMOXI CLAV**

Amoxicilline et clavulanate de potassium pour suspension orale  
Poudre pour suspension

M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg par 5 mL)  
250 mg d'amoxicilline (sous forme de trihydrate) et 62,5 mg d'acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium) / 5 mL

M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg par 5 mL)  
400 mg d'amoxicilline (sous forme de trihydrate) et 57 mg d'acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium) / 5 mL

Norme maison

**Associations de pénicillines, comprenant des inhibiteurs de bêta-lactamases**

**Code ATC : J01CR02**

Mantra Pharma Inc.  
1000 rue du Lux, Suite 201  
Brossard, Quebec  
J4Y 0E3

Date d'approbation initiale :  
2022, 09, 13

Date de révision :  
2023, 10, 06

Numéro de contrôle de la présentation : 272550

## RÉCENTES MODIFICATIONS IMPORTANTES DE L'ÉTIQUETTE

[7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Immunitaire](#)

2023-10

### TABLE DES MATIÈRES

Les sections ou sous-sections qui ne sont pas pertinentes au moment de l'autorisation ne sont pas énumérées.

<b>RÉCENTES MODIFICATIONS IMPORTANTES DE L'ÉTIQUETTE.....</b>	<b>2</b>
<b>TABLE DES MATIÈRES .....</b>	<b>2</b>
<b>PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.....</b>	<b>4</b>
<b>1 INDICATIONS.....</b>	<b>4</b>
1.1 Enfants .....	4
1.2 Personnes âgées .....	4
<b>2 CONTRE-INDICATIONS .....</b>	<b>4</b>
<b>4 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION .....</b>	<b>5</b>
4.2 Dose recommandée et modification posologique .....	5
4.3 Reconstitution.....	9
4.4 Administration .....	10
<b>5 SURDOSAGE.....</b>	<b>10</b>
<b>6 FORMES POSOLOGIQUES, CONCENTRATIONS, COMPOSITION ET EMBALLAGE .....</b>	<b>11</b>
<b>7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS.....</b>	<b>11</b>
7.1 Populations particulières .....	14
7.1.1 Femmes enceintes .....	14
7.1.2 Allaitement.....	14
7.1.3 Enfants.....	14
<b>8 EFFETS INDÉSIRABLES.....</b>	<b>15</b>
8.2 Effets indésirables observés dans les essais cliniques.....	15
8.2.1 Effets indésirables observés au cours des essais cliniques – enfants.....	15
8.5 Effets indésirables observés après la mise en marché .....	15
<b>9 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES .....</b>	<b>17</b>
9.4 Interactions médicament-médicament .....	17
9.5 Interactions médicament-aliment .....	17

9.6	Interactions médicament-plante médicinale .....	17
9.7	Interactions médicament-tests de laboratoire.....	17
<b>10</b>	<b>PHARMACOLOGIE CLINIQUE.....</b>	<b>17</b>
10.1	Mode d'action .....	17
10.3	Pharmacocinétique .....	18
<b>11</b>	<b>ENTREPOSAGE, STABILITÉ ET TRAITEMENT .....</b>	<b>19</b>
<b>12</b>	<b>INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES DE MANIPULATION .....</b>	<b>19</b>
	<b>PARTIE II : INFORMATIONS SCIENTIFIQUES .....</b>	<b>20</b>
<b>13</b>	<b>INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES.....</b>	<b>20</b>
<b>14</b>	<b>ESSAIS CLINIQUES.....</b>	<b>21</b>
14.2	Études de biodisponibilité comparatives .....	21
<b>15</b>	<b>MICROBIOLOGY .....</b>	<b>24</b>
<b>16</b>	<b>TOXICOLOGIE NON CLINIQUE .....</b>	<b>28</b>
<b>17</b>	<b>MONOGRAPHIES DE PRODUIT DE SOUTIEN .....</b>	<b>34</b>
	<b>RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT.....</b>	<b>35</b>

## PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

### 1 INDICATIONS

M-AMOXI CLAV (amoxicilline et clavulanate de potassium) est indiqué dans le traitement des infections suivantes, lorsque celles-ci sont causées par des souches sensibles, productrices de  $\beta$ -lactamases, des bactéries sous-mentionnées :

- la sinusite causée par des souches de *H. influenzae* ou de *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*;
- l'otite moyenne causée par des souches de *H. influenzae* ou de *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*;
- les infections des voies respiratoires inférieures causées par des souches de *H. influenzae*, de *K. pneumoniae*, de *S. aureus* ou de *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*;
- les infections de la peau et des tissus mous causées par des souches de *S. aureus*;
- les infections des voies urinaires causées par des souches de *E. coli*.

Bien que M-AMOXI CLAV soit indiqué seulement pour le traitement des affections susmentionnées, les infections causées par des organismes sensibles à l'ampicilline (amoxicilline) peuvent aussi être traitées par M-AMOXI CLAV vu sa teneur en amoxicilline. De plus, le traitement des infections mixtes causées par des organismes sensibles à l'ampicilline (amoxicilline) et par des organismes producteurs de  $\beta$ -lactamases sensibles à M-AMOXI CLAV ne devrait pas nécessiter l'ajout d'un autre antibiotique.

Pour réduire l'apparition de bactéries résistantes aux médicaments et maintenir l'efficacité de M-AMOXI CLAV et des autres agents antibactériens, M-AMOXI CLAV ne doit être utilisé que pour traiter des infections dont la cause confirmée ou fortement soupçonnée est une bactérie sensible. Si des renseignements sont connus sur la culture et la sensibilité, ils doivent être pris en compte dans le choix ou la modification du traitement antibactérien. En l'absence de telles données, les renseignements épidémiologiques locaux, les tendances en matière de sensibilité et les lignes directrices locales officielles sur la prescription d'antibiotiques peuvent aider au choix empirique d'un traitement.

#### 1.1 Enfants

**Enfants (< 18 ans) :** Voir [4.2 Dose recommandée et modification posologique, Enfants](#) et [7.1.3 Enfants](#).

#### 1.2 Personnes âgées

**Personnes âgées :** Voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hépatique/biliaire/pancréatique](#).

### 2 CONTRE-INDICATIONS

L'emploi de M-AMOXI CLAV est contre-indiqué chez les patients allergiques à la pénicilline ou

aux céphalosporines, c'est-à-dire aux médicaments qui renferment un cycle  $\beta$ -lactame ou à l'un des composants du produit ou du contenant. Pour obtenir la liste complète des ingrédients, veuillez consulter la section [6 FORMES POSOLOGIQUES, CONCENTRATIONS, COMPOSITION ET EMBALLAGE](#).

M-AMOXI CLAV est contre-indiqué chez les patients chez qui on soupçonne ou on a diagnostiqué une mononucléose infectieuse.

M-AMOXI CLAV est également contre-indiqué chez les patients qui ont déjà souffert d'une jaunisse ou d'un dysfonctionnement hépatique associés à l'amoxicilline et clavulanate de potassium.

## 4 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

### 4.2 Dose recommandée et modification posologique

#### Enfants (3 mois ou plus)

Chez les nourrissons de 12 semaines (3 mois) ou plus et chez les enfants, la posologie à 2 f.p.j. de M-AMOXI CLAV formulé à 400 mg est recommandée en raison d'une incidence significativement réduite de diarrhée avec le schéma à 2 f.p.j. (voir [8 EFFETS INDÉSIRABLES](#)).

La posologie ci-dessous se rapporte à la dose d'amoxicilline et s'applique aux patients âgés de 12 semaines (3 mois) et plus :

Infection	Sévérité	Posologie	
		Posologie à 2 f.p.j.*	Posologie à 3 f.p.j.
		200 mg d'amoxicilline / 28,5 mg d'acide clavulanique***	125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique***
		400 mg d'amoxicilline / 57 mg d'acide clavulanique	250 mg d'amoxicilline / 62.5 mg d'acide clavulanique
Voies urinaires	Légère à modérée	25 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 12 heures	20 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 8 heures
Peau et tissus mous	Sévère	45 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 12 heures	40 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 8 heures
Voies respiratoires inférieures		45 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 12 heures	40 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 8 heures
Sinusite			
Otite moyenne**			40 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 8 heures

\* La posologie à 2 f.p.j. est recommandée parce qu'elle est associée à beaucoup moins de diarrhée.

\*\* La durée de traitement étudiée et recommandée pour l'otite moyenne aiguë est de 10 jours.

\*\*\* M-AMOXI-CLAV n'est disponible qu'en concentration de 250 mg d'amoxicilline / 62,5 mg d'acide clavulanique et de 400 mg d'amoxicilline / 57 mg d'acide clavulanique.

La durée normale du traitement était de 7 à 10 jours. Cependant, le traitement devrait généralement être maintenu pendant au moins 48 à 72 heures après la disparition des symptômes ou l'éradication bactérienne. Un traitement d'une durée minimale de 10 jours est recommandé contre toute infection causée par des streptocoques bêta-hémolytiques afin de prévenir le rhumatisme articulaire aigu ou la glomérulonéphrite.

La posologie pour les enfants ne doit pas dépasser celle recommandée pour les adultes. L'enfant pesant plus de 38 kg doit recevoir la posologie recommandée pour l'adulte (*c'est-à-dire que la dose habituelle pour un adulte est d'un (1) comprimé d'amoxicilline et de clavulanate de potassium à 500 mg/125 mg toutes les 12 heures. Pour les infections plus graves et les infections des voies respiratoires inférieures, la dose doit être d'un (1) comprimé d'amoxicilline et de clavulanate de potassium à 875 mg/125 mg toutes les 12 heures ou d'un (1) comprimé d'amoxicilline et de clavulanate de potassium à 500 mg/125 mg toutes les 8 heures*).

Le [tableau 1](#) ci-dessous peut servir de guide pour déterminer la posologie appropriée de la suspension orale (125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale ou M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg par 5 mL)) suivant le poids corporel.

**Tableau 1 Posologie des suspensions orales 125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale et M-AMOXI CLAV 250 mg / 62,5 mg par 5 mL pour les enfants<sup>a</sup>**

Poids corporel (kg)	Posologie à 20 mg/kg/jour <sup>a</sup>		Posologie à 40 mg/kg/jour <sup>a</sup>			
	Dose globale par jour <sup>b</sup> (mg)	Volume (mL) de suspension orale reconstituée donnée toutes les 8 heures	Dose globale par jour <sup>b</sup> (mg)	Volume (mL) de suspension orale reconstituée donnée toutes les 8 heures		
		125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale		125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale		
		M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg)		M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg)		
05	125	1,3	0,7	250	2,7	1,3
07	175	1,9	0,9	350	3,7	1,9
10	250	2,7	1,3	500	5,3	2,7
12	300	3,2	1,6	600	6,4	3,2
14	350	3,7	1,9	700	7,5	3,7
16	400	4,3	2,1	800	8,5	4,3

Poids corporel	Posologie à 20 mg/kg/jour <sup>a</sup>			Posologie à 40 mg/kg/jour <sup>a</sup>		
	Dose globale par jour <sup>b</sup>	Volume (mL) de suspension orale reconstituée donnée toutes les 8 heures		Dose globale par jour <sup>b</sup>	Volume (mL) de suspension orale reconstituée donnée toutes les 8 heures	
(kg)	(mg)	125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale	M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg)	(mg)	125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale	M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg)
18	450	4,8	2,4	900	9,6	4,8
20	500	5,3	2,7	1000	10,7	5,3
25	625	6,7	3,3	1250	13,3	6,7
30	750	8,0	4,0	1500	16,0	8,0
35	875	9,3	4,7	1750	18,7	9,3
38	950	10,1	5,1	1900	20,3	10,1

<sup>a</sup> Se rapporte à la dose d'amoxicilline.

<sup>b</sup> Ces posologies tiennent compte de l'association de l'amoxicilline avec l'acide clavulanique. Ces deux composants se retrouvent dans une proportion de 4:1 dans chacune des suspensions orales, soit 125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale et M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg).

Vingt (20) mL de suspension orale de 125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique par 5 mL reconstituée ou dix (10) mL de suspension orale M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg par 5 mL) reconstituée sont équivalents à un (1) comprimé d'amoxicilline et clavulanate de potassium-500 mg /125 mg.

Le [tableau 2](#) ci-dessous peut servir de guide pour déterminer la posologie appropriée de suspension orale (200 mg d'amoxicilline / 28,5 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale ou M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg par 5 mL)) suivant le poids corporel.

**Tableau 2 Posologie des suspensions orales 200 mg d'amoxicilline / 28,5 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale et M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg) pour les enfants**

Poids corporel	Posologie à 25 mg/kg/jour <sup>a</sup>			Posologie à 45 mg/kg/jour <sup>a</sup>		
	Dose globale par jour <sup>b</sup>	Volume (mL) de suspension orale reconstituée donnée toutes les 12 heures		Dose globale par jour <sup>b</sup>	Volume (mL) de suspension orale reconstituée donnée toutes les 12 heures	
(kg)	(mg)	200 mg d'amoxicilline / 28,5 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale	M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg)	(mg)	200 mg d'amoxicilline / 28,5 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale	M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg)
05	143	1,6	0,8	257	2,8	1,4
07	200	2,2	1,1	360	3,9	2,0
10	286	3,1	1,6	514	5,6	2,8
12	343	3,8	1,9	617	6,8	3,4
14	400	4,4	2,2	720	7,9	3,9
16	458	5,0	2,5	822	9,0	4,5
18	515	5,6	2,8	925	10,1	5,1
20	572	6,3	3,1	1028	11,3	5,6
25	715	7,8	3,9	1285	14,1	7,0
30	858	9,4	4,7	1542	16,9	8,4
35	1001	11,0	5,5	1799	19,7	9,8
38	1087	11,9	5,9	1953	21,4	10,7

<sup>a</sup> Se rapporte à la dose d'amoxicilline.

<sup>b</sup> Ces posologies tiennent compte de l'association de l'amoxicilline avec l'acide clavulanique. Ces deux composants se retrouvent dans une proportion de 7 :1 dans chacune des suspensions orales, soit 200 mg d'amoxicilline / 28,5 mg d'acide clavulanique par 5 mL pour suspension orale et M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg).

Il est recommandé d'utiliser un compte-gouttes jaugé pour mesurer de façon précise la dose recommandée.

### Enfants (nouveau-nés et enfants de moins de 12 semaines [3 mois])

En raison du développement incomplet de la fonction rénale, l'élimination de l'amoxicilline est altérée chez ces patients. La dose de M-AMOXI CLAV recommandée est donc de 30 mg/kg/jour (il s'agit de la dose d'amoxicilline) en doses fractionnées toutes les 12 heures. L'élimination du clavulanate n'est pas altérée chez les patients de ce groupe d'âge. Les données sur la préparation de 200 mg/5 mL pour ce groupe d'âge étant limitées, on recommande la suspension orale à 125 mg/5 mL.

### Insuffisance rénale



En présence d'atteinte rénale, les ajustements posologiques reposent sur le taux maximal d'amoxicilline recommandé. Les présentations de M-AMOXI CLAV dont la proportion d'amoxicilline et de clavulanate est de 7 :1 (p. ex., M-AMOXI CLAV 400 mg / 57 mg par 5 mL suspension orale) ne doivent être utilisées que chez les patients dont la clairance de la créatinine est supérieure à 30 mL/min.

### Enfants

<b>Clairance de la créatinine &gt; 30 mL/min</b>	Aucun ajustement nécessaire
<b>Clairance de la créatinine de 10 à 30 mL/min</b>	15/3,75 mg/kg administrés deux fois par jour (dose maximale de 500/125 mg deux fois par jour)
<b>Clairance de la créatinine &lt; 10 mL/min</b>	15/3,75 mg/kg administrés en une seule dose quotidienne (dose maximale de 500/125 mg)
<b>Hémodialyse</b>	15/3,75 mg/kg/jour administrés en une seule dose quotidienne  Une dose additionnelle de 15/3,75 mg/kg devrait être administrée avant l'hémodialyse. Pour rétablir les concentrations de médicament dans la circulation, une autre dose de 15/3,75 mg/kg devrait être administrée après l'hémodialyse.

Seuls les patients dont la clairance de la créatinine est supérieure à 30 mL/min devraient prendre la suspension orale M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg par 5 mL) (proportion d'amoxicilline et de clavulanate de 7:1).

### 4.3 Reconstitution

Reconstituer la poudre pour la suspension orale avec de l'eau purifiée.

#### **M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg)**

Après reconstitution, 5 mL de suspension contiennent approximativement 250 mg d'amoxicilline (sous forme de trihydrate) et 62,5 mg d'acide clavulanique (sous forme de sel de potassium). Mesurer 85 mL d'eau et ajouter au flacon en deux portions (42,5 mL chacune).

Agiter vigoureusement après chaque ajout.

<u>Format du flacon</u>	<u>Volume reconstitué</u>	<u>Quantité d'eau nécessaire pour la dose de 400 mg / 57 mg</u>
Flacon de 125 mL	100 mL	85 mL

#### **M-AMOXI CLAV (400mg: 57 mg):**

Après reconstitution, 5 mL de suspension contiennent approximativement 400 mg d'amoxicilline (sous forme de trihydrate) et 57 mg d'acide clavulanique (sous forme de sel de

potassium). Mesurer 62 mL d'eau et ajouter au flacon en deux portions (31 mL chacune). Agiter vigoureusement après chaque ajout.

<u>Format du flacon</u>	<u>Volume reconstitué</u>	<u>Quantité d'eau nécessaire pour la dose de 400 mg / 57 mg</u>
Flacon de 100 mL	70 mL	62 mL

La suspension reconstituée de M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg par 5 mL) doit être conservée au réfrigérateur (2 à 8 °C) et utilisée dans les 10 jours. Jeter la suspension inutilisée après 10 jours.

La suspension reconstituée de M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg par 5 mL) doit être conservée au réfrigérateur (2°C à 8 °C) et utilisée dans les 7 jours. Jeter la suspension inutilisée après 7 jours (voir [11 ENTREPOSAGE, STABILITÉ ET TRAITEMENT](#)).

#### 4.4 Administration

Bien que M-AMOXI CLAV puisse se prendre sans se préoccuper des repas, l'absorption de l'acide clavulanique est plus grande si on le prend avec de la nourriture que si on le prend à jeun. La prise d'amoxicilline et clavulanate de potassium à jeun ou aux repas a très peu d'effet sur la pharmacocinétique de l'amoxicilline. L'innocuité et l'efficacité d'amoxicilline et clavulanate de potassium ont été établies dans des essais cliniques où les sujets prenaient l'amoxicilline et clavulanate de potassium sans se préoccuper des repas.

Pour réduire au minimum le risque d'intolérance gastro-intestinale, le médicament doit être administré au début du repas.

## 5 SURDOSAGE

On peut administrer du charbon activé pour favoriser l'élimination du médicament non absorbé. Des mesures générales de soutien sont également recommandées.

De nombreux patients ont été asymptomatiques après un surdosage ou ont principalement présenté des symptômes gastro-intestinaux, y compris des maux d'estomac, des douleurs abdominales, des vomissements et la diarrhée. On a également observé une éruption cutanée, une hyperactivité ainsi que la somnolence chez un petit nombre de patients. Une cristallurie à l'amoxicilline dans quelques cas donnant lieu à une insuffisance rénale a été observée (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS](#)).

En cas de surdosage, cesser le traitement, soulager les symptômes et entreprendre des mesures de soutien au besoin. Les symptômes gastro-intestinaux et le déséquilibre hydro-électrolytique peuvent être traités symptomatiquement. L'amoxicilline et clavulanate de potassium peut être éliminé de la circulation sanguine par l'hémodialyse. Une étude prospective menée chez 51 enfants dans un centre antipoison révèle que les surdosages de moins de 250 mg/kg d'amoxicilline ne sont pas associés à des symptômes cliniques significatifs et ne nécessitent pas de vidange gastrique.

Une néphrite interstitielle ayant causé une insuffisance rénale oligurique a été signalée chez un

petit nombre de patients après un surdosage à l'amoxicilline. L'insuffisance rénale semble réversible par l'arrêt du traitement. Une concentration sanguine élevée peut survenir plus facilement chez les patients présentant une atteinte rénale en raison d'une clairance rénale réduite de l'amoxicilline et du clavulanate. Ces deux substances sont éliminées de la circulation sanguine par l'hémodialyse.

Pour traiter une surdose présumée, communiquez avec le centre antipoison de votre région.

## 6 FORMES POSOLOGIQUES, CONCENTRATIONS, COMPOSITION ET EMBALLAGE

Tableau 3 – Formes posologiques, concentrations, composition et emballage

Voie d'administration	Forme posologique / concentration / composition	Ingrédients non médicinaux
Orale	<p><b>Poudre pour suspension orale</b></p> <p><b>M-AMOXI CLAV 250 mg/62,5 mg par 5 mL:</b> après reconstitution, 5 mL de suspension contiennent 250 mg d'amoxicilline sous forme de trihydrate et 62,5 mg d'acide clavulanique sous forme de sel de potassium (proportion de 4:1)</p> <p><b>M-AMOXI CLAV 400 mg/57 mg par 5 mL:</b> Après reconstitution, 5 mL de suspension contiennent 400 mg d'amoxicilline sous forme de trihydrate et 57 mg d'acide clavulanique sous forme de sel de potassium (proportion de 7 :1)</p>	Acide citrique anhydre, arôme tutti frutti, arôme vanille, cellulose microcristalline et carmellose sodique, citrate de sodium anhydre, dioxyde de silicium, gomme xanthane, mannitol, silice colloïdale anhydre, sucralose.

### Présentation des formes posologiques

#### Poudre pour la suspension orale :

M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg) est offert en flacons de 100 mL (volume de reconstitution).

M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg) est offert en flacons de 70 mL (volume de reconstitution).

## 7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

### Généralités

Tout au long de la thérapie à l'aide de M-AMOXI CLAV, il convient de garder à l'esprit la possibilité d'une surinfection provoquée par des agents pathogènes tels que les champignons ou les bactéries. Dans le cas d'une surinfection (habituellement à *Aerobacter*, à *Pseudomonas* ou à *Candida*), le traitement par M-AMOXI CLAV doit être interrompu, et un traitement approprié doit être instauré.

L'emploi prolongé pourrait également à l'occasion donner lieu à un surcroissement des organismes non sensibles.

L'érythème morbilliforme attribuable à l'ampicilline chez des patients atteints de mononucléose infectieuse est bien étayé. Cette réaction a aussi été signalée avec l'amoxicilline. Une réaction similaire pourrait aussi se produire suite à l'utilisation de M-AMOXI CLAV.

### **Maladie associée à *Clostridium difficile***

On a fait état de maladie associée à *Clostridium difficile* par suite de l'emploi de nombreux antibactériens, y compris l'amoxicilline et clavulanate de potassium. La gravité de la maladie associée à *Clostridium difficile* peut varier, allant d'une diarrhée légère à une colite fatale. Il est important d'envisager ce diagnostic chez les patients qui présentent une diarrhée ou des symptômes de colite, de colite pseudomembraneuse, du syndrome colectasique ou de perforation du côlon après la prise d'un antibactérien. On a signalé la maladie associée à *Clostridium difficile* plus de 2 mois après l'emploi d'antibactériens.

L'antibiothérapie peut modifier la flore normale du côlon et favoriser la prolifération de *Clostridium difficile*. La bactérie *Clostridium difficile* produit les toxines A et B, responsables de l'installation de la maladie à *Clostridium difficile*. Cette dernière peut entraîner une morbidité et une mortalité importantes et s'avérer réfractaire au traitement antibiotique.

Si le diagnostic de maladie associée à *Clostridium difficile* est soupçonné ou confirmé, on doit amorcer les mesures thérapeutiques appropriées. Les cas légers répondent habituellement à l'arrêt de la prise des antimicrobiens non dirigés contre *Clostridium difficile*. Dans les cas modérés ou sévères, on doit songer à prendre en charge le patient par l'administration de liquides et d'électrolytes, de suppléments de protéines, et par l'instauration d'une antibiothérapie par un médicament cliniquement efficace contre *Clostridium difficile*. On doit recourir à l'évaluation chirurgicale si elle est indiquée sur le plan clinique, car une intervention chirurgicale peut être nécessaire dans certains cas sévères (voir [8 EFFETS INDÉSIRABLES](#)).

### **Cardiovasculaire**

Un allongement anormal du temps de Quick (augmentation du rapport international normalisé [RIN]) a été signalé chez des patients ayant reçu l'amoxicilline et clavulanate de potassium en association avec des anticoagulants oraux. Une surveillance appropriée devrait être entreprise lorsque des anticoagulants sont prescrits en association. Des ajustements de la dose d'anticoagulants oraux pourraient s'avérer nécessaires pour maintenir le niveau d'anticoagulation désiré.

Syndrome de Kounis (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Réactions d'hypersensibilité](#)).

### **Hépatique/biliaire/pancréatique**

L'hépatite et l'ictère cholestasique transitoires ont été rarement signalés. Ces manifestations ont été observées avec d'autres pénicillines et céphalosporines. Les manifestations d'atteinte hépatique associées à l'amoxicilline et clavulanate de potassium peuvent être graves et se produisent surtout chez les hommes et les personnes âgées, et peuvent être liées à un traitement prolongé. Ces effets ont été très rarement signalés chez des enfants. D'habitude, les signes et les symptômes se présentent durant ou peu après le traitement, mais ils peuvent aussi

apparaître plusieurs semaines après l'arrêt du traitement. L'hépatotoxicité liée à l'amoxicilline et clavulanate de potassium est habituellement réversible, mais de rares cas de décès ont été rapportés (on estime qu'il y a eu moins de 1 rapport de décès pour 4 millions d'ordonnances à l'échelle mondiale). En général, ces cas étaient associés à des maladies sous-jacentes graves ou à d'autres médicaments pris en concomitance (voir [2 CONTRE-INDICATIONS et 8.5 Effets indésirables observés après la mise en marché, Foie](#)).

M-AMOXI CLAV doit être employé avec prudence chez les patients qui présentent des manifestations de dysfonctionnement hépatique.

## **Immunitaire**

### **Réactions d'hypersensibilité**

Réactions d'hypersensibilité graves et parfois fatales, incluant :

- l'œdème de Quincke;
- des réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes;
- des réactions indésirables cutanées sévères (p. ex., pustulose exanthématique aiguë généralisée, syndrome de Stevens-Johnson, érythrodermie bulleuse avec épidermolyse et réaction médicamenteuse s'accompagnant d'éosinophilie et de symptômes généraux [syndrome DRESS]). Ces réactions ont été rapportées chez des patients traités par la pénicilline, y compris M-AMOXI CLAV (amoxicilline et clavulanate de potassium);
- un syndrome de Kounis, soit une réaction allergique grave qui, à son tour, peut entraîner un infarctus du myocarde. Les symptômes que provoquent de telles réactions peuvent inclure une douleur thoracique s'accompagnant d'une réaction allergique à l'amoxicilline et au clavulanate.

(Voir [8.5 Effets indésirables observés après la mise en marché](#).)

Bien que la plupart du temps ces réactions fassent suite à une thérapie parentérale, elles se sont produites chez des patients traités oralement avec des pénicillines. L'apparition de ces réactions est plus probable chez des sujets que l'on sait sensibles à de nombreux allergènes. Des patients dont l'anamnèse révélait déjà une hypersensibilité aux céphalosporines ont manifesté des réactions graves lors d'un traitement par les pénicillines. Avant d'entreprendre un traitement à l'aide de M-AMOXI CLAV, une recherche approfondie doit être menée pour identifier des réactions antérieures potentielles d'hypersensibilité à la pénicilline, aux céphalosporines ou à d'autres allergènes (voir [2 CONTRE-INDICATIONS](#)).

Si une réaction allergique survient, l'utilisation de M-AMOXI CLAV devrait être cessée et une thérapie de remplacement appropriée devrait être instituée. Les réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes graves exigent un traitement immédiat à l'épinéphrine. On peut aussi avoir recours à l'oxygénation, à l'administration de stéroïdes par voie intraveineuse et au rétablissement de la fonction respiratoire, incluant l'intubation, s'il y a lieu.

## Peau

Des réactions indésirables cutanées sévères ont été rapportées chez des patients traités par CLAVULIN (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Réactions d'hypersensibilité](#)).

## Rénal

L'amoxicilline et clavulanate de potassium pour suspension orale sont surtout excrétés par le rein. En présence d'atteinte rénale, les ajustements posologiques doivent être effectués en fonction du taux maximal d'amoxicilline recommandé (voir [4.2 Dose recommandée et modification posologique, Insuffisance rénale](#)).

Très rarement, une cristallurie a été observée chez des patients présentant un débit urinaire réduit, principalement sous traitement parentéral. Au cours de l'administration de fortes doses d'amoxicilline, il est recommandé de maintenir un apport liquidien approprié ainsi qu'un débit urinaire adéquat afin de réduire la possibilité de cristallurie à l'amoxicilline (voir [5 SURDOSAGE](#)).

## Sensibilité/résistance

La prescription de M-AMOXI CLAV en l'absence d'infection bactérienne confirmée ou fortement soupçonnée ne procurera probablement aucun bienfait au patient et risque d'entraîner l'apparition de bactéries résistantes au médicament.

## Surveillance et tests de laboratoire

Si la thérapie par M-AMOXI CLAV est prolongée, les fonctions rénale, hépatique et hématopoïétique devraient être évaluées périodiquement.

### 7.1 Populations particulières

#### 7.1.1 Femmes enceintes

Dans le cadre d'une étude unique menée chez des femmes ayant eu une rupture prématurée des membranes du fœtus (avant terme), on a signalé que le traitement prophylactique par l'amoxicilline et clavulanate de potassium peut être associé à un risque accru d'entérococolite ulcéro-nécrosante du nouveau-né. On devrait donc éviter d'employer ce médicament durant la grossesse, à moins qu'il ne soit jugé essentiel par le médecin.

#### 7.1.2 Allaitement

On sait que les pénicillines (y compris l'ampicilline) passent dans le lait maternel humain. On ne sait pas si l'acide clavulanique passe dans le lait maternel. La prudence est de mise si l'on envisage d'administrer M-AMOXI CLAV à une femme qui allaite.

#### 7.1.3 Enfants

En raison du développement incomplet de la fonction rénale chez les nouveau-nés et les nourrissons, l'élimination de l'amoxicilline peut être retardée. La dose de M-AMOXI CLAV doit être modifiée chez les patients de moins de 12 semaines (3 mois) [voir [4.2 Dose recommandée et modification posologique, Enfants \(nouveau-nés et enfants de moins de 12 semaines \[3 mois\]\)](#)].

## 8 EFFETS INDÉSIRABLES

### 8.2 Effets indésirables observés dans les essais cliniques

Les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières. Les taux d'effets indésirables qui y sont observés ne reflètent pas nécessairement les taux observés en pratique, et ces taux ne doivent pas être comparés aux taux observés dans le cadre d'essais cliniques portant sur un autre médicament. Les informations sur les effets indésirables provenant d'essais cliniques peuvent être utiles pour déterminer et estimer les taux de réactions indésirables aux médicaments lors d'une utilisation réelle.

#### 8.2.1 Effets indésirables observés au cours des essais cliniques – enfants

Un essai clinique canado-américain a comparé la posologie d'amoxicilline et clavulanate de potassium à 2 f.p.j. (45/6,4 mg/kg/jour toutes les 12 heures pendant 10 jours) à l'amoxicilline et clavulanate de potassium à 3 f.p.j. (40/10 mg/kg/jour toutes les 8 heures pendant 10 jours) chez 575 patients souffrant d'otite moyenne aiguë, âgés de 2 mois à 12 ans. L'incidence de la diarrhée était considérablement réduite chez les patients qui ont reçu le schéma à 2 f.p.j. par rapport aux patients qui ont reçu le schéma à 3 f.p.j. (9,6 % vs 26,7 %;  $p < 0,001$ ). Une proportion significativement plus faible des patients qui ont reçu le schéma à 2 f.p.j. ont abandonné le traitement en raison de la diarrhée par rapport aux patients qui ont reçu le schéma à 3 f.p.j. (2,8 % vs 7,6 %;  $p = 0,009$ ). L'incidence de l'érythème fessier relié ou peut-être relié était également inférieure chez les patients qui ont reçu le schéma à 2 f.p.j. par rapport à ceux qui ont reçu le schéma à 3 f.p.j. (3,1 % vs 6,6 %;  $p = 0,054$ ).

### 8.5 Effets indésirables observés après la mise en marché

Les effets indésirables suivants ont été observés lors de la thérapie par l'amoxicilline et clavulanate de potassium.

On a signalé de très rares cas de langue noire et pileuse. On a aussi signalé de très rares cas de coloration dentaire chez les enfants et les adultes. Une bonne hygiène bucco-dentaire peut aider à prévenir la coloration dentaire, car il suffit souvent de se brosser les dents pour la faire disparaître.

#### Effets sur le système nerveux central

Méningite aseptique

Des convulsions peuvent survenir chez les personnes dont la fonction rénale est altérée ou qui reçoivent de fortes doses du produit.

#### Réactions gastro-intestinales

Des cas de diarrhée ont été signalés très couramment chez des adultes et couramment chez des enfants. Des nausées et vomissements ont été signalés couramment chez des adultes et des enfants. Des cas de candidose cutanéomuqueuse ont été couramment signalés. Des cas de crampes abdominales, flatulence, constipation, anorexie, colique, acidité gastrique, candidose intestinale et colite postantibiotique (y compris colite pseudo-membraneuse et colite

hémorragique) ont été rarement signalés. Si des réactions gastro-intestinales se présentent, il est possible que la prise de M-AMOXI CLAV au début d'un repas les atténue.

### **Systèmes sanguins et lymphatiques**

Les pénicillines, comme d'autres bêta-lactamines, ont été associées dans de rares cas aux réactions suivantes : anémie, anémie hémolytique, thrombocytopénie, purpura thrombocytopénique, éosinophilie, leucopénie, lymphocytopénie, basophilie, légère augmentation des plaquettes sanguines, neutropénie et agranulocytose. Ces réactions disparaissent habituellement à l'arrêt du traitement; elles s'inscriraient dans un phénomène d'hypersensibilité. Des cas de prolongation du temps de saignement et du temps de Quick ont aussi été signalés.

### **Système immunitaire**

Nota : En présence de toute réaction cutanée d'hypersensibilité (dermatite), cesser l'administration de M-AMOXI CLAV (voir [7 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Réactions d'hypersensibilité](#)).

**Réactions d'hypersensibilité générales :** Éruptions érythémateuses et maculopapuleuses, urticaire, anaphylaxie, vascularite allergique et prurit.

**Réactions indésirables cutanées sévères :** Des cas d'érythème polymorphe et de syndrome de Stevens-Johnson ont été rarement rapportés. Entre autres réactions rares, l'angio-œdème, l'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse, la dermatite bulleuse ou exfoliative et la pustulose exanthématique aiguë généralisée ont été observés, comme tel est le cas avec d'autres bêta-lactamines. Des réactions médicamenteuses s'accompagnant d'éosinophilie et de symptômes généraux (syndrome DRESS) ont également été rapportées.

**Autres troubles du système immunitaire :** Érythème morbilliforme chez les patients atteints de mononucléose. La néphrite interstitielle peut se produire dans de rares cas, ainsi que le syndrome de Kounis et un syndrome évoquant la maladie sérique.

### **Foie**

L'hépatite et l'ictère cholestatique transitoires ont été rarement signalés. Ces manifestations ont été observées avec d'autres pénicillines et céphalosporines. Des hausses modérées des taux d'AST (SGOT), de phosphatase alcaline, de déshydrogénase lactique et d'ALT (SGPT) ont été constatées chez des patients traités avec des antibiotiques du groupe des ampicillines. On en ignore toujours l'importance clinique.

### **Autres**

Vaginite, céphalée, arrière-goût, étourdissements, malaise, glossite et stomatite.

### **Troubles rénaux ou des voies urinaires**

Très rarement – cristallurie et néphrite interstitielle (voir [5 SURDOSAGE](#)).



## 9 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

### 9.4 Interactions médicament-médicament

Comme d'autres antibiotiques à large spectre, l'amoxicilline-acide clavulanique risque de réduire l'efficacité des contraceptifs oraux combinés en modifiant la flore intestinale, donnant lieu à une baisse de la réabsorption de l'œstrogène. L'administration simultanée de probénécide n'est pas recommandée. Elle peut entraîner des taux accrus et prolongés d'amoxicilline, mais pas d'acide clavulanique, dans le sang.

Une augmentation du temps de Quick, du RIN ou du temps de saignement ont été signalés chez des patients sous anticoagulants coumariniques tels l'acénocoumarol et la warfarine chez qui on a associé un traitement avec l'amoxicilline ou l'amoxicilline et clavulanate de potassium. Si la coadministration est nécessaire, le temps de Quick ou le RIN doivent être étroitement surveillés dès l'ajout ou le retrait de l'antibiotique.

Une réduction d'environ 54 % de la concentration médiane de l'acide mycophénolique, le métabolite actif du mycophénolate mofétil, mesurée avant la dose, a été signalée chez des receveurs de greffe de rein dans les jours suivant immédiatement l'instauration du traitement oral par l'amoxicilline-acide clavulanique.

Ces réductions de la concentration de l'acide mycophénolique, mesurée avant la dose, par rapport à la valeur initiale (le mycophénolate mofétil seul), avaient tendance à diminuer avec l'emploi continu d'un antibiotique et à cesser après la fin du traitement. Le changement de concentration mesurée avant la dose pourrait ne pas représenter fidèlement les changements dans l'exposition globale de l'acide mycophénolique; par conséquent, la pertinence clinique de ces observations n'est pas clairement établie.

### 9.5 Interactions médicament-aliment

Aucune interaction avec les aliments n'a été établie.

### 9.6 Interactions médicament-plante médicinale

Aucune interaction avec des produits à base de plantes médicinales n'a été établie.

### 9.7 Interactions médicament-tests de laboratoire

Aucune preuve selon laquelle le médicament nuirait aux épreuves de laboratoire n'a été établie.

## 10 PHARMACOLOGIE CLINIQUE

### 10.1 Mode d'action

L'amoxicilline exerce une action bactéricide sur les organismes sensibles pendant la phase de multiplication active, en inhibant la biosynthèse des mucopeptides de la paroi de la cellule bactérienne. L'acide clavulanique inhibe certaines  $\beta$ -lactamases de certains micro-organismes

et permet ainsi à l'amoxicilline d'inhiber les organismes qui lui résisteraient autrement (ou qui résistent à l'ampicilline) en produisant des  $\beta$ -lactamases sensibles à l'acide clavulanique.

### 10.3 Pharmacocinétique

Qu'ils soient administrés séparément ou sous forme d'amoxicilline et clavulanate de potassium, il n'y a pas de différence significative dans l'absorption de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique.

La demi-vie de l'amoxicilline est de 1,2 heure lorsqu'elle est administrée seule et de 1,3 heure lorsqu'elle est administrée sous forme d'amoxicilline et clavulanate de potassium. La demi-vie de l'acide clavulanique seul est de 1,0 heure. Le temps au-delà de la concentration minimale inhibitrice de 1,0 mcg/mL pour l'amoxicilline s'est avéré similaire après l'administration de schémas à 2 f.p.j. et à 3 f.p.j. correspondants d'amoxicilline et clavulanate de potassium chez des adultes et des enfants.

L'administration simultanée de probénécide retarde l'excrétion de l'amoxicilline, mais ne retarde pas celle de l'acide clavulanique.

Aucun des deux composants de M-AMOXI CLAV ne se lie fortement aux protéines; on a déterminé que seulement 30 % de l'acide clavulanique et 20 % de l'amoxicilline se lient aux protéines du sérum humain.

#### Populations et états pathologiques particuliers

##### Enfants

Les concentrations plasmatiques d'amoxicilline et d'acide clavulanique suivant l'administration orale d'une seule dose d'une suspension contenant de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique dans une proportion de 4:1 figurent au [tableau 4](#) ci-dessous.

**Tableau 4 Concentrations plasmatiques moyennes d'amoxicilline et d'acide clavulanique**

Nombre d'enfants	Âge moyen (ans)	Médicament	Dose* (mg/kg)	Concentrations plasmatiques moyennes (mg/mL) en fonction du temps écoulé (h) après l'ingestion d'une dose					
				1/3	2/3	1	2	3	4
17	3,5	amoxicilline	6,6	0,91	1,58	2,11	2,16	1,23	0,71
		acide clavulanique	1,7	0,29	0,72	0,67	0,47	0,20	0,04
17	4,1	amoxicilline	13,3	1,80	3,56	4,67	3,31	1,95	1,14
		acide clavulanique	3,3	0,42	1,12	1,45	1,02	0,52	0,25

\* Une dose unique contenant 6,6 mg/kg d'amoxicilline et 1,7 mg/kg d'acide clavulanique équivaut à un tiers de la dose journalière de 25 mg/kg de la suspension orale d'amoxicilline et clavulanate de potassium (proportion de 4:1). Une dose unique contenant 13,3 mg/kg d'amoxicilline et 3,3 mg/kg d'acide clavulanique équivaut à un tiers de la dose journalière de 50 mg/kg de la suspension orale d'amoxicilline et clavulanate de potassium (proportion de 4:1).

On peut voir au [tableau 5](#) ci-dessous quelques paramètres pharmacocinétiques pour ces enfants.

**Tableau 5 Paramètres pharmacocinétiques**

Nombre d'enfants	Médicament	Dose (mg/kg)	Demi-vie plasmatique (h)	ASC (mcg/mL-h)	Volume de distribution (mL/kg)	Volume de distribution (mL/min/1,73m <sup>2</sup> )
17	amoxicilline	6,6	1,25	6,11	1950	504
	acide clavulanique	1,7	1,10	1,66	1622	478
17	amoxicilline	13,3	1,46	12,90	2172	481
	acide clavulanique	3,3	1,17	3,54	1575	435

Les profils pharmacocinétiques de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique à l'état d'équilibre ont été comparés après l'administration de la suspension orale d'amoxicilline et clavulanate de potassium à raison de 45/6,4 mg/kg/j (proportion de 7:1) toutes les 12 heures et 40/10 mg/kg/j (proportion de 4:1) toutes les 8 heures chez des enfants âgés de 1 mois à 12 ans. La cinétique d'élimination de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique administrés à 2 f.p.j. et à 3 f.p.j. chez les enfants de 4 mois ou plus était semblable à celle notée chez les adultes. Cependant, chez les enfants de moins de 4 mois, la demi-vie était retardée en raison de l'immaturité relative de la fonction rénale chez ces nourrissons.

## 11 ENTREPOSAGE, STABILITÉ ET TRAITEMENT

Poudre : conserver dans le carton d'origine pour protéger de la lumière et de l'humidité à température ambiante (15°C à 30 °C). Ne l'employer que si sa couleur est blanc ou blanc cassé.

La suspension reconstituée de M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg par 5 mL) doit être conservée au réfrigérateur (2 à 8 °C) et utilisée dans les 10 jours. Jeter la suspension inutilisée après 10 jours.

La suspension reconstituée de M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg par 5 mL) doit être conservée au réfrigérateur (2°C à 8 °C) et utilisée dans les 7 jours. Jeter la suspension inutilisée après 7 jours.

Tenir le flacon bien fermé en tout temps.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

## 12 INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES DE MANIPULATION

Il n'y a pas d'exigences particulières pour la manipulation de ce produit.

## PARTIE II : INFORMATIONS SCIENTIFIQUES


### 13 INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

#### Substance pharmaceutique

##### Amoxicilline

Nom propre	Trihydrate d'amoxicilline
Nom chimique :	Acide 6-[-(-)- $\alpha$ -amino-4-hydroxyphénylacétamido]-pénicillanique trihydraté
Formule moléculaire et masse moléculaire:	$C_{16}H_{19}N_3O_5S \cdot 3H_2O$ 419,47 g/mol (forme trihydratée) 365,41 g/mol (forme anhydre)

Formule de structure:




Propriétés physicochimiques : Le trihydrate d'amoxicilline est une poudre cristalline blanche ou blanc cassé fortement hygroscopique. L'amoxicilline trihydratée est légèrement soluble dans l'eau, très légèrement soluble dans l'éthanol (96 %), pratiquement insoluble dans les huiles grasses. Il se dissout dans les acides dilués et les solutions diluées d'hydroxydes alcalins.

##### Clavulanate de potassium

Nom propre	Clavulanate de potassium
Nom chimique :	Z-(2R,5R)-3-(2-hydroxyéthylidène)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3,2,0]heptane-2-carboxylate de potassium
Formule moléculaire et masse moléculaire:	$C_8H_8NO_5K$ 199,16 g/mol (radical libre) 237,25 g/mol (sel de potassium)

Formule de structure:



Propriétés physicochimiques : Une poudre blanche ou presque blanche. Clavulanate de potassium est très soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol (96 %) et très légèrement soluble dans l'acétone.

## 14 ESSAIS CLINIQUES

Les renseignements sur les essais cliniques n'ont pas été inclus dans la monographie au moment de l'autorisation initiale.

### 14.2 Études de biodisponibilité comparatives

Une étude comparative de bioéquivalence orale à double insu, randomisée, à deux traitements, à deux périodes, à deux séquences, croisée et à dose unique de M-AMOXI CLAV 400 mg et 57 mg/5 mL poudre pour suspension orale (Mantra Pharma Inc.) et <sup>Pr</sup>CLAVULIN-400 poudre pour suspension orale (GlaxoSmithKline Inc.) a été menée chez 36 sujets sains adultes de sexe masculin à jeun. Les données comparatives de biodisponibilité de 33 sujets qui ont été inclus dans l'analyse statistique sont présentées dans le tableau suivant :

**TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES COMPARATIVES DE BIODISPONIBILITÉ**

<b>Amoxicilline</b> (5 mL × 400 mg d'amoxicilline/57 mg de clavulanate de potassium par 5 mL) Moyenne géométrique Moyenne arithmétique (% de CV)				
Paramètre	Test <sup>1</sup>	Référence <sup>2</sup>	Rapport de moyennes géométriques (%)	90 % Intervalle de confiance
AUC <sub>T</sub> (ng.hr/mL)	24134.76 24601.45 (19.85)	23918.43 24376.25 (20.47)	100.9	98.5 – 103.4
AUC <sub>I</sub> (ng.hr/mL)	24449.07 24914.62 (19.69)	24248.10 24699.05 (20.21)	100.8	98.5 – 103.2
C <sub>max</sub> (ng/mL)	7539.47 7782.98 (25.40)	7704.11 7962.79 (26.87)	97.9	93.8 – 102.0
T <sub>max</sub> <sup>3</sup> (h)	1.75 (0.75 - 3.00)	1.75 (0.75 - 2.50)		
T <sub>½</sub> <sup>4</sup> (h)	1.42 (16.22)	1.40 (14.14)		

<sup>1</sup> M-AMOXI CLAV (amoxicilline sous forme de trihydrate d'amoxicilline et acide clavulanique sous forme de clavulanate de potassium) poudre pour suspension orale, 400 mg/57 mg par 5 mL, (Mantra Pharma Inc.)

<sup>2</sup> PrCLAVULIN-400 (amoxicilline sous forme de trihydrate d'amoxicilline et acide clavulanique sous forme de clavulanate de potassium) poudre pour suspension orale, 400 mg/57 mg par 5 mL, (GlaxoSmithKline Inc.)

<sup>3</sup> Exprimé sous forme de médiane (Min-Max) uniquement

<sup>4</sup> Exprimé sous forme de moyenne arithmétique (CV%) uniquement

**TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES COMPARATIVES DE BIODISPONIBILITÉ**

<b>Acide clavulanique</b> (5 mL × 400 mg d'amoxicilline/57 mg de clavulanate de potassium par 5 mL) Moyenne géométrique Moyenne arithmétique (% de CV)				
Paramètre	Test <sup>1</sup>	Reference <sup>2</sup>	Rapport de moyennes géométriques (%)	90 % Intervalle de confiance
AUC <sub>T</sub> (ng.hr/mL)	4063.06 4386.21 (33.61)	3854.98 4190.57 (37.94)	105.4	95.4 – 116.4
AUC <sub>I</sub> (ng.hr/mL)	4136.59 4455.46 (33.15)	3931.91 4261.46 (37.39)	105.2	95.6 – 115.8
C <sub>max</sub> (ng/mL)	1613.55 1726.74 (32.29)	1590.19 1692.52 (34.49)	101.5	92.4 – 111.5
T <sub>max</sub> <sup>3</sup> (h)	1.75 (0.75 - 3.00)	1.75 (0.75 - 2.50)		
T <sub>½</sub> <sup>4</sup> (h)	1.42 (16.22)	1.40 (14.14)		

<sup>1</sup> M-AMOXI CLAV (amoxicilline sous forme de trihydrate d'amoxicilline et acide clavulanique sous forme de clavulanate de potassium) poudre pour suspension orale, 400 mg/57 mg par 5 mL, (Mantra Pharma Inc.)

<sup>2</sup> PrCLAVULIN-400 (amoxicilline sous forme de trihydrate d'amoxicilline et acide clavulanique sous forme de clavulanate de potassium) poudre pour suspension orale, 400 mg/57 mg par 5 mL, (GlaxoSmithKline Inc.)

<sup>3</sup> Exprimé sous forme de médiane (Min-Max) uniquement

<sup>4</sup> Exprimé sous forme de moyenne arithmétique (CV%) uniquement

Une étude de biodisponibilité comparative en chassé-croisé, randomisée, à deux périodes, à dose unique de M-AMOXI CLAV 250 mg/62,5 mg par 5 mL poudre pour suspension orale (Mantra Pharma Inc.) et de PrCLAVULIN-250F poudre pour suspension orale (GlaxoSmithKline Inc.) a été réalisée chez des sujets masculins adultes en bonne santé, à jeun. Les données comparatives de biodisponibilité de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique provenant de 43 et 42 sujets, respectivement, sont présentées dans les tableaux suivants.

**TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES COMPARATIVES DE BIODISPONIBILITÉ**

Amoxicilline (5 mL × 250 mg d'amoxicilline/62,5 mg de clavulanate de potassium par 5 mL) Moyenne géométrique Moyenne arithmétique (% de CV)				
Paramètre	Test <sup>1</sup>	Référence <sup>2</sup>	Rapport de moyennes géométriques (%)	90 % Intervalle de confiance
ASC <sub>T</sub> (ng·hr/mL)	13972,13 14439,80 (26,82)	14722,38 15184,16 (25,55)	94,9	91,4 – 98,5
ASC <sub>I</sub> (ng·hr/mL)	14286,76 14746,16 (26,22)	15042,81 15492,55 (24,93)	95,0	91,6 – 98,5
C <sub>max</sub> (ng/mL)	5533,48 5818,02 (31,77)	6131,53 6419,74 (30,45)	90,2	83,7 – 97,3
T <sub>max</sub> <sup>3</sup> (hr)	1,25 (0,50 – 3,00)	1,25 (0,50 – 2,25)		
T <sub>½</sub> <sup>4</sup> (hr)	1,16 (29,83)	1,16 (16,19)		

<sup>1</sup> M-AMOXI CLAV (amoxicilline sous forme de trihydrate d'amoxicilline et acide clavulanique sous forme de clavulanate de potassium) poudre pour suspension orale, 250 mg/62,5 mg par 5 mL, (Mantra Pharma Inc.)

<sup>2</sup> PrCLAVULIN-250F (amoxicilline sous forme de trihydrate d'amoxicilline et acide clavulanique sous forme de clavulanate de potassium) poudre pour suspension orale, 250 mg/62,5 mg par 5 mL, (GlaxoSmithKline Inc.)

<sup>3</sup> Exprimé sous forme de médiane (Min-Max) uniquement

<sup>4</sup> Exprimé sous forme de moyenne arithmétique (CV%) uniquement

**TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES COMPARATIVES DE BIODISPONIBILITÉ**

Acide clavulanique (5 mL × 250 mg d'amoxicilline/62,5 mg de clavulanate de potassium par 5 mL) Non corrigé pour la puissance Moyenne géométrique Moyenne arithmétique (% de CV)				
Paramètre	Test <sup>1</sup>	Référence <sup>2</sup>	Rapport de moyennes géométriques (%)	90 % Intervalle de confiance
ASC <sub>T</sub> (ng·hr/mL)	3483,76 3759,92 (37,64)	3853,85 4072,70 (29,91)	90,4	81,7 – 100,0
ASC <sub>I</sub> (ng·hr/mL)	3546,14 3819,11 (37,18)	3919,09 4138,98 (29,71)	90,5	81,8 – 100,1
C <sub>max</sub> (ng/mL)	1745,48 1871,92 (35,16)	1895,62 1992,25 (29,93)	92,1	82,9 – 102,3
T <sub>max</sub> <sup>3</sup> (hr)	1,00 (0,50 – 2,00)	1,00 (0,25 – 4,00)		
T <sub>½</sub> <sup>4</sup> (hr)	1,00 (27,91)	1,04 (19,88)		

Corrigé pour la puissance Moyenne géométrique				
Paramètre	Test <sup>1</sup>	Référence <sup>2</sup>	Rapport de moyennes géométriques (%)	90 % Intervalle de confiance
ASC <sub>T</sub> (ng·hr/mL)	3336,94	3333,78	100,1	90,4 – 110,8
ASC <sub>i</sub> (ng·hr/mL)	3396,69	3390,22	100,2	90,6 – 110,8
C <sub>max</sub> (ng/mL)	1671,91	1639,81	102,0	91,8 – 113,3

<sup>1</sup> M-AMOXI CLAV (amoxicilline sous forme de trihydrate d'amoxicilline et acide clavulanique sous forme de clavulanate de potassium) poudre pour suspension orale, 250 mg/62,5 mg par 5 mL, (Mantra Pharma Inc.)

<sup>2</sup> PrCLAVULIN-250F (amoxicilline sous forme de trihydrate d'amoxicilline et acide clavulanique sous forme de clavulanate de potassium) poudre pour suspension orale, 250 mg/62,5 mg par 5 mL, (GlaxoSmithKline Inc.)

<sup>3</sup> Exprimé sous forme de médiane (Min-Max) uniquement

<sup>4</sup> Exprimé sous forme de moyenne arithmétique (CV%) uniquement

## 15 MICROBIOLOGY

Dans la liste ci-dessous, les organismes sont classés selon leur sensibilité *in vitro* à l'amoxicilline-clavulanate principalement en fonction des études publiées entre 2001 et 2011.

**Tableau 6 Sensibilité *in vitro* des micro-organismes à l'amoxicilline-clavulanate**

Un astérisque (*) indique qu'une efficacité clinique à l'amoxicilline-clavulanate a été démontrée dans le cadre d'essais cliniques.
Les organismes qui ne produisent pas de bêta-lactamase sont suivis du symbole (†). Si un isolat est sensible à l'amoxicilline, il peut être considéré comme étant sensible à l'amoxicilline-clavulanate.
<b>Espèces généralement sensibles</b>
<b><u>Micro-organismes aérobies Gram positif :</u></b>
<i>Enterococcus faecalis</i>
<i>Streptococcus bovis</i>
<i>Streptococcus pyogenes</i> <sup>†</sup>
<i>Streptococcus agalactiae</i> <sup>†</sup>
Esp. <i>Streptococcus</i> (autre bêta -hémolytique) <sup>†</sup>
<i>Staphylococcus aureus</i> (sensible à la méthicilline)*
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> (sensible à la méthicilline)
Staphylocoque négatif quant à la coagulase (sensible à la méthicilline)



**Micro-organismes aérobies Gram négatif :**

*Haemophilus influenzae\**  
*Haemophilus parainfluenzae*  
*Moraxella catarrhalis\**  
*Pasteurella multocida*  
*Proteus mirabilis*

**Micro-organismes anaérobies Gram positif :**

Esp. *Clostridium*  
Esp. *Peptostreptococcus*

**Micro-organismes anaérobies Gram négatif :**

*Eikenella corrodens*  
Esp. *Fusobacterium*  
Esp. *Porphyromonas*  
Esp. *Prevotella*

**Espèces pour lesquelles une résistance acquise peut s'avérer problématique**

**Micro-organismes aérobies Gram positif :**

*Streptococcus pneumoniae*<sup>†</sup>  
Streptocoques du groupe viridans

**Micro-organismes aérobies Gram négatif :**

*Escherichia coli\**  
*Klebsiella oxytoca*  
*Klebsiella pneumoniae\**  
Esp. *Klebsiella*  
*Proteus vulgaris*  
Esp. *Salmonella*  
Esp. *Shigella*

**Micro-organismes anaérobies Gram négatif :**

*Bacteroides fragilis*  
Esp. *Bacteroides*  
*Bacteroides thetiotamicron*

**Micro-organismes intrinsèquement résistants**

**Aérobies Gram positif :**

*Enterococcus faecium*

**Aérobies Gram négatif :***Esp. Acinetobacter**Esp. Aeromonas**Esp. Citrobacter**Esp. Enterobacter**Hafnia alvei**Morganella morganii**Providencia rettgeri**Providencia stuartii**Esp. Pseudomonas**Serratia marcescens***Épreuve de sensibilité****Critères d'interprétation des épreuves de dilution et de diffusion sur disque**

La détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) et les résultats des épreuves de diffusion sur disque doivent être interprétés selon le [tableau 7](#) et sont fondés sur les méthodes CLSI (CLSI M7-A9<sup>10</sup> et M2-A10<sup>11</sup>). Le mode de dilution recommandé utilise une proportion constante d'amoxicilline-clavulanate de potassium de 2 :1 dans tous les tubes à essai contenant diverses quantités d'amoxicilline. La CMI est exprimée sous forme de concentration d'amoxicilline en présence d'acide clavulanique et à une constante de 2 parties d'amoxicilline pour 1 partie d'acide clavulanique. La méthode du disque consiste à utiliser des disques de papier imprégnés de 30 mcg d'amoxicilline-clavulanate de potassium (20 mcg d'amoxicilline plus 10 mcg de clavulanate de potassium).

Un rapport S (sensibilité) indique que l'agent antimicrobien est susceptible d'inhiber la croissance de l'agent pathogène si le composé antimicrobien dans le sang atteint la concentration généralement réalisable. Un rapport I (intermédiaire) indique que le résultat devrait être considéré comme étant équivoque et, si le micro-organisme n'est pas entièrement sensible à d'autres agents antimicrobiens cliniquement possibles, le test devrait être répété. Cette catégorie laisse supposer une applicabilité clinique au niveau des parties du corps où le médicament se concentre physiologiquement ou dans les situations où de fortes doses d'antimicrobien peuvent être utilisées. Cette catégorie fournit également une zone tampon empêchant de petits facteurs non contrôlés de causer d'importantes divergences d'interprétation. Un rapport R (résistant) indique que l'agent antimicrobien n'est pas susceptible d'inhiber la croissance de l'agent pathogène si le composé antimicrobien dans le sang atteint la concentration généralement réalisable; on devrait alors opter pour un autre traitement.

**Tableau 7 Critères d'interprétation des résultats d'épreuves de sensibilité pour l'amoxicilline-clavulanate de potassium**

Agent pathogène	Concentration minimale inhibitrice (mcg/mL)			Diffusion sur disque (diamètre de la zone en mm)		
	S	I	R	S	I	R
<i>Haemophilus influenzae</i> (Note 1)	≤ 4/2	Sans objet (s.o.)	≥ 8/4	≥ 20	s.o.	≤ 19
<i>Enterobacteriaceae</i>	≤ 8/4	16/8	≥ 32/16	≥ 18	14 à 17	≤ 13
<i>Staphylococcus aureus</i> (Note 2)	≤ 4/2	s.o.	≥ 8/4	≥ 20	s.o.	≤ 19
<i>Streptococcus pneumoniae</i> (isolats non associés à la méningite)	≤ 2/1	4/2	≥ 8/4	(Note 3)		

Note 1 : β-lactamase négatif, les isolats *H. influenzae* résistants à l'ampicilline doivent être considérés comme étant résistants à l'amoxicilline-clavulanate de potassium.

Note 2 : Les staphylocoques qui sont sensibles à l'amoxicilline-clavulanate de potassium, mais résistants à la méthicilline ou à l'oxacilline doivent être considérés comme étant résistants.

Note 3 : La sensibilité de *S. pneumoniae* doit être déterminée au moyen d'un disque de 1 mcg d'oxacilline. Les isolats d'oxacilline de tailles ≥ 20 mm sont sensibles à l'amoxicilline-clavulanate de potassium. Une CMI d'amoxicilline-clavulanate de potassium devrait être déterminée sur les isolats de *S. pneumoniae* avec des zones d'oxacilline de tailles ≤ 19 mm.

### Valeurs de référence du contrôle de la qualité

Les tests de sensibilité normalisés nécessitent l'utilisation de micro-organismes de contrôle de la qualité afin de déterminer le rendement de ces épreuves. Les résultats du contrôle de la qualité prévus fondés sur la CMI CLSI et les méthodes de diffusion sur disque font l'objet du [tableau 8](#) (CLSI M100-S21).

**Tableau 8 Valeurs de référence du contrôle de la qualité acceptables pour l'amoxicilline-clavulanate de potassium**

Micro-organisme de contrôle de la qualité	Concentration minimale inhibitrice (mcg/mL)	Diffusion sur disque (diamètre de la zone en mm)
<i>Escherichia coli</i> ATCC 35218 [ <i>H. influenzae</i> – contrôle de la qualité (Note 1)]	4/2 à 16/8	17 à 22
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	2/1 à 8/4	18 à 24
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	2/1 à 16/8	15 à 23
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213	0,12/0,06 à 0,5/0,25	Sans objet (s. o.)
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	s. o.	28 à 36
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	0,03/0,015 à 0,12/0,06	s. o.

ATCC est une marque déposée de l'ATCC (American Type Culture Collection).

Note 1 : Au cours de l'utilisation du milieu d'essai *Haemophilus* (HTM)

## 16 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

### Toxicologie générale

#### Dose unique

Les niveaux de toxicité aiguë du trihydrate d'amoxicilline et du clavulanate de potassium, dans des proportions de 2:1 et de 4:1, ont été déterminés chez des souris et des rats à qui l'on a administré le médicament par voie orale et par voie intraveineuse. Le [tableau 9](#) ci-dessous indique les doses létales.

**Tableau 9 Toxicité aiguë**

Espèces	Voie	Sexe	Proportion des composés	DL <sub>50</sub> (mg/kg)**
Rats	Orale	M	2:1	> 5000
		F	2:1	> 5000
Souris	Orale	M	2:1	> 5000
		F	2:1	> 5000
Rats	Orale	M	4:1	> 5000
		F	4:1	> 5000
	i.v.	M	4:1	1850
		F	4:1	1960
Souris	Orale	M	4:1	> 5000
		F	4:1	> 5000
	i.v.	M	4:1	1715-2450*
		F	4:1	1715-2450*

\*Quantité estimée

\*\*Dose létale calculée en fonction de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique

Tous les animaux sont restés en observation pendant 14 jours. Au début, les fèces des rats avaient une consistance molle, mais elles sont redevenues normales avant la fin de la période d'observation. Toutes les souris ont manifesté des réactions légères et reliées à la dose, qui ont duré jusqu'à 72 heures dans certains cas, mais leur état est resté satisfaisant pendant le reste de l'étude. Les animaux traités par voie intraveineuse qui ont survécu ont eu de légères convulsions et un comportement anormal 2 à 3 minutes après l'injection. Ceux qui n'ont pas survécu sont entrés immédiatement en convulsions et sont morts en moins d'une minute.

La toxicité aiguë du clavulanate de potassium administré par voie orale a été déterminée chez des rats âgés de 4 jours. La DL<sub>50</sub> a été de 1360 mg/kg. Cette dernière se compare à une DL<sub>50</sub> de plus de 10 000 mg/kg pour les rats adultes. Une perte de poids, de la diarrhée et de la distension abdominale ont été souvent observées chez ces rats nouveau-nés.

#### Doses répétées

## Chez le rat

Pendant quatre semaines, trois groupes de rats, chacun composé de 10 mâles et de 10 femelles, ont reçu par gavage oral du trihydrate d'amoxicilline et du clavulanate de potassium formulé dans une proportion de 2:1 et à des doses de 20/10, 60/30 ou 180/90 mg/kg par jour. Un quatrième groupe a servi de témoin. On a surveillé l'état général des animaux et procédé aux analyses de laboratoire. On a fait des observations post-mortem et des analyses histopathologiques. Aucun décès n'est survenu pendant l'étude. Mise à part l'observation de fèces molles chez tous les groupes traités, les rats n'ont manifesté aucun signe clinique particulier. Les groupes traités et le groupe témoin ont pris du poids de façon similaire et ont consommé une quantité comparable de nourriture. Dans le groupe des mâles qui recevaient la dose la plus forte, la consommation d'eau a augmenté (8 %, 16,3 %, 16,8 % et 12,2 % lors des semaines 1, 2, 3 et 4 respectivement). Les rats femelles ont augmenté leur consommation d'eau de 22 %, 11 % et 13 % respectivement dans les groupes recevant les doses faibles, intermédiaires et fortes. Les paramètres sanguins des groupes testés ont été comparables à ceux du groupe témoin et se sont situés dans les limites normales acceptables. Il y a eu une augmentation statistiquement significative de la diurèse entre le groupe témoin et le groupe des mâles traités à des doses faibles ou à des doses élevées. L'examen macroscopique a révélé une incidence accrue d'agrandissement du cæcum chez tous les groupes traités, et qui était légèrement plus élevée chez ceux soumis à des doses fortes. Il y a eu une diminution statistiquement significative du poids relatif du foie chez les animaux des deux sexes (-9 %, -14 % et -9 % respectivement pour les groupes mâles traités à des doses élevées, intermédiaires et faibles et -12 %, -16 % et -6 % pour les groupes correspondants de femelles). Le poids relatif moyen du thymus des mâles traités à de fortes doses a également chuté de façon significative de 21 % et le poids relatif du cœur des femelles traitées à des doses intermédiaires a subi une baisse significative de 12 %, en comparaison des témoins. L'examen histologique des reins a révélé une infiltration cellulaire inflammatoire chronique minime chez un certain nombre d'animaux de tous les groupes; elle était associée à la dilatation de certains tubules et à la coloration basophile de l'épithélium cellulaire des tubules.

Du trihydrate d'amoxicilline et du clavulanate de potassium dans une proportion de 2:1 ont été administrés par gavage oral, en doses quotidiennes de 20/10, 40/20, 100/50 et 800/400 mg/kg pendant 26 semaines, à quatre groupes de rats Sprague-Dawley, chacun composé de 15 mâles et de 15 femelles. Un cinquième groupe a servi de témoin. Cinq mâles et cinq femelles ont été ajoutés au groupe témoin et au groupe traité à des doses élevées afin d'observer l'effet produit par la suppression du médicament. Après la période de traitement, on a cessé pendant 4 semaines d'administrer de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique aux 5 mâles et 5 femelles du groupe témoin et à ceux du groupe traité à des doses élevées, puis on les a sacrifiés. On a surveillé l'état général des animaux et les résultats des analyses de laboratoire. On a effectué des observations post-mortem et des analyses histopathologiques.

Il y a eu quatre décès pendant la période de traitement : un mâle et deux femelles appartenant au groupe qui recevait une dose quotidienne de 20/10 mg/kg et une femelle du groupe dont la dose était de 40/20 mg/kg par jour. Aucun décès n'est survenu pendant la période de suppression du médicament. Immédiatement après le traitement, on a observé une réaction de

salivation chez les mâles et les femelles traités à des doses élevées. Chez les mâles à qui on a administré une dose quotidienne de 800/400 mg/kg, on a enregistré un gain de poids de 21 % inférieur à partir de la 3<sup>e</sup> semaine et un gain de poids de 10 % inférieur pour le groupe de mâles qui recevait une dose quotidienne de 100/50 mg/kg. Le groupe de femelles qui recevait une dose quotidienne de 800/400 mg/kg a connu un gain de poids de 62 % inférieur à partir de la 13<sup>e</sup> semaine.

Une diminution du volume urinaire (de 30 % chez les mâles et de 54 % chez les femelles) a été observée dans le groupe qui a reçu la dose quotidienne à 800/400 mg/kg. On a remarqué une augmentation statistiquement significative de l'osmolalité chez les femelles traitées à la dose la plus élevée par rapport au groupe témoin.

Les analyses de sang ont démontré une augmentation du nombre de leucocytes accompagnée d'une augmentation des lymphocytes chez les mâles du groupe recevant des doses élevées. Ce même groupe a montré une diminution du temps de céphaline activée alors qu'on a observé, à différents moments du traitement chez les mâles traités à des doses de 800/400, 100/50 et 40/20 mg/kg par jour et après 24 semaines chez tous les mâles traités, une baisse, non liée à la dose, du temps de Quick. À la fin de la période de suppression du médicament, tous les paramètres avaient des valeurs semblables à celles notées dans le groupe témoin. Chez les mâles traités à des doses quotidiennes de 800/400 mg/kg, les analyses du sang ont révélé une baisse de l'albumine sérique (5-16 %) et une augmentation du taux de globulines (16-30 %) au cours des 12<sup>e</sup> et 24<sup>e</sup> semaines, s'accompagnant d'une baisse du rapport A/G.

Un effet semblable a été observé pendant la 24<sup>e</sup> semaine chez les mâles traités à des doses quotidiennes de 100/50 mg/kg. Les femelles qui ont reçu des doses élevées ont eu des taux de globulines et un rapport A/G comparables à ceux enregistrés dans le groupe témoin. Cependant, le taux de protéines totales ainsi que le taux d'albumine sérique ont été plus bas que dans le groupe témoin. À la fin de la période de suppression du médicament, la seule différence entre les groupes traités et le groupe témoin était la réduction des protéines sériques totales, observée seulement chez les femelles.

Lors de l'autopsie, on a remarqué dans l'estomac un renflement important en forme de crête chez presque tous les rats qui ont reçu des doses élevées et chez un mâle du groupe traité avec une dose quotidienne de 100/50 mg/kg. On a constaté aussi chez tous les groupes traités une dilatation du cæcum en fonction de la dose reçue. On n'a pas observé ces changements morphologiques chez les animaux autopsiés à la fin de la période de suppression du traitement. Chez tous les rats traités à des doses élevées, une augmentation sensible du poids du foie (de 40 % chez les mâles et de 22 % chez les femelles) a été enregistrée, accompagnée, dans le cas des femelles, d'une augmentation de 23 % du poids de la rate et, dans le cas des mâles, d'une augmentation de 10 % du poids des reins. Dans le groupe traité avec la dose quotidienne la plus élevée, une augmentation de 30 % du poids du foie chez les femelles et une augmentation de 26 % du poids des reins chez les mâles ont été notées à la fin de la période de suppression du traitement.

Chez les rats des deux sexes traités à des doses élevées, on a pu observer au microscope des effets liés au traitement tels que l'hypertrophie des hépatocytes dans la région centrale du foie et au centre des lobes hépatiques, l'hyperplasie de l'épithélium non glandulaire de l'estomac au

site du renflement en forme de crête et l'élargissement de la lumière du cæcum. Le seul changement qui a persisté après la période de suppression du traitement a été l'hypertrophie des hépatocytes chez tous les mâles traités.

Une étude semblable a démontré qu'en utilisant seulement l'acide clavulanique on arrivait, avec des doses identiques, aux mêmes résultats que ceux que nous venons de décrire.

### **Chez le chien**

Du trihydrate d'amoxicilline et du clavulanate de potassium dans une proportion de 2:1 ont été administrés par gavage oral en doses quotidiennes de 20/10, 60/30 et 180/90 mg/kg pendant 28 jours, à trois groupes de chiens beagle, chacun composé de 2 mâles et de 2 femelles. Un quatrième groupe a servi de témoin. On a surveillé l'état général des animaux et procédé aux analyses de laboratoire. On a fait des observations post-mortem et des analyses histopathologiques. Aucun décès n'est survenu pendant l'étude. Les animaux traités avec des doses élevées ont aussitôt souffert de salivation excessive et, dans certains cas, de vomissements graves jusqu'à 2 heures et demie après le gavage. Des vomissements moins graves sont apparus également chez les femelles traitées avec des doses intermédiaires. L'augmentation du poids, la consommation de nourriture et d'eau et les paramètres sanguins n'ont pas été modifiés par le traitement. La glycémie des mâles qui recevaient une dose de 60/30 mg/kg par jour de médicament était plus élevée de 25 % le 13<sup>e</sup> jour et de 11 % le 27<sup>e</sup> jour. À la dernière prise de sang, ces deux chiens montraient une augmentation de l'azote uréique du sang moyen (70 %), des concentrations des protéines totales (5 %) et de l'albumine (10 %). Chez les chiens traités à des doses élevées, les niveaux de protéines totales et d'albumine étaient réduits (de 11 % et 10 % respectivement) le 27<sup>e</sup> jour. Chez les chiennes traitées avec des doses de 180/90 mg/kg par jour, les prises de sang intermédiaires et finales ont révélé une réduction de 4 % des protéines totales et une réduction de 12 % et 10 % respectivement du taux d'albumine.

Tous les groupes traités présentaient une légère baisse des SGOT les 13<sup>e</sup> et 27<sup>e</sup> jours. Un mâle traité à de faibles doses a montré une forte enzymurie et une légère protéinurie. Chez tous les groupes traités, une légère élévation de l'osmolalité et une perte des électrolytes ont été enregistrées. Le groupe des femelles traitées à des doses faibles a montré une légère élévation des phosphatases alcalines urinaires alors que la capacité de concentration urinaire des animaux testés s'est accrue légèrement. Les observations macroscopiques post-mortem n'ont mis en évidence aucun changement lié au traitement. L'examen histologique a révélé que, dans le côlon des deux femelles traitées à des doses élevées, des glandes dilatées étaient devenues manifestes et étaient accompagnées d'une réaction inflammatoire chronique. Ces glandes dilatées, pour l'un des deux chiens, étaient de plus localisées dans la muqueuse duodénale. Aucun autre changement n'a été observé qui aurait pu être lié au médicament testé.

Pendant 26 semaines, quatre groupes de chiens beagle, chacun composé de 4 mâles et de 4 femelles, ont reçu par gavage oral du trihydrate d'amoxicilline et du clavulanate de potassium dans une proportion de 2:1, en doses de 10/5, 20/10, 40/20 et 100/50 mg/kg par jour. Un cinquième groupe a servi de témoin. Trois mâles et trois femelles ont été ajoutés au groupe témoin et au groupe traité à des doses élevées afin d'observer l'effet produit par la suppression du médicament. Après la période de traitement, on a cessé d'administrer de l'amoxicilline et de

l'acide clavulanique pendant 30 jours aux deux groupes, puis on les a sacrifiés. On a surveillé l'état général des animaux et les résultats des analyses de laboratoire. On a effectué des observations post-mortem et des analyses histopathologiques.

Aucun décès n'a été signalé pendant l'étude. De la salivation et des vomissements parfois teintés de sang (1 mL) ont été observés dans les groupes soumis à la dose élevée. Une faible incidence de sang dissimulé dans les selles a été observée tant chez les animaux du groupe témoin que chez les animaux traités, mais l'incidence la plus élevée est apparue dans le groupe traité depuis trois mois à l'aide d'une dose quotidienne élevée. La présence de granulations anormales dans des neutrophiles a été remarquée le plus souvent chez les animaux ayant reçu des doses élevées.

Pendant le traitement, on pouvait observer à certaines occasions une élévation de 8 % à 29 % du glucose sérique chez tous les mâles traités et chez les femelles recevant des doses faibles ou fortes, comparativement au groupe témoin. Pareillement, chez les mâles et les femelles traités avec de fortes doses, une baisse de 9 % à 13 % des protéines totales a été enregistrée occasionnellement pendant le traitement. La valeur absolue de ces deux derniers paramètres est demeurée dans les limites normales pour les chiens beagles. Plus souvent chez les groupes traités que chez le groupe témoin, on a remarqué des rougeurs et des pétéchies sur la muqueuse de l'antra pylorique, des taches blanches dans le foie et des filets blancs le long des jonctions entre le cortex et la partie médullaire des reins. À la fin de la période de rétablissement, les changements rénaux et quelques effets gastro-intestinaux persistaient. Les analyses histopathologiques ont révélé des changements hépatiques et rénaux caractérisés par la disparition totale ou partielle du glycogène cytoplasmique ou par la vacuolisation des tubules. Les changements hépatiques et rénaux remarqués chez les chiens sacrifiés après un traitement de 6 mois n'ont pas été observés chez les animaux auxquels on a alloué une période de suppression du traitement. L'examen histopathologique du tractus gastro-intestinal a révélé une congestion des capillaires et une extravasation plus ou moins prononcée des érythrocytes dans la muqueuse superficielle du fundus et du pylore chez tous les chiens traités et chez le groupe témoin.

Une étude similaire a démontré qu'en utilisant seulement l'acide clavulanique on obtenait, avec des doses identiques, des effets semblables à ceux mentionnés ci-dessus.

## **Toxicologie pour la reproduction et le développement**

### **Fertilité et capacité reproductrice en général**

Du trihydrate d'amoxicilline et du clavulanate de potassium dans une proportion de 2:1 ont été administrés par gavage oral à trois groupes de rats, chacun composé de 24 mâles et 24 femelles, en doses quotidiennes de 20/10, 100/50 et 800/400 mg/kg. Un quatrième groupe a servi de témoin. Les rats mâles ont reçu une dose quotidienne pendant au moins 63 jours avant l'accouplement et jusqu'au moment du sevrage des petits, soit 21 jours après leur naissance. Les rats femelles ont reçu le traitement pendant 15 jours avant l'accouplement et jusqu'au moment du sevrage ou jusqu'à la fin de leur gestation si elles ont subi une césarienne. Au 20<sup>e</sup> jour de gestation, on a sacrifié 10 femelles par groupe après leur avoir fait subir une césarienne et on a permis aux 14 femelles qui restaient dans chaque groupe de mettre bas d'une façon



normale. Deux mâles traités à des doses élevées sont décédés, l'un dans la 11<sup>e</sup> semaine d'étude et l'autre dans la 15<sup>e</sup>. L'autopsie a révélé une occlusion du cæcum pour le premier et une hémorragie pulmonaire pour le second. Chez les mâles traités avec de fortes doses, des effets tels qu'un léger accroissement de la respiration sifflante et de la chute des poils, une baisse de 21 % de l'augmentation du poids corporel moyen et une augmentation modérée de la fréquence des selles molles ont pu être reliés au traitement.

Les femelles recevant une dose quotidienne de 100/50 mg/kg ou de 800/400 mg/kg ont subi une légère augmentation de la chute des poils. D'après le taux de gestation et la durée de la gestation, le traitement ne semble pas avoir altéré la fertilité et la capacité reproductrice générale. Le poids moyen des petits des deux sexes des rats traités avec une dose quotidienne de 100/50 mg/kg était statistiquement plus élevé en comparaison du groupe témoin. On a observé pour chaque mère une diminution non statistiquement significative du nombre de fœtus viables, du nombre de nidations et de la taille des corps jaunes, qui semblait dépendre de la dose de médicament. Deux fœtus de la première génération de rats ayant reçu une dose de 800/400 mg/kg par jour ont eu des malformations : l'un, une omoplate mal formée et l'autre une queue filiforme et un petit anus. Le traitement n'a pas provoqué d'effets indésirables quant au nombre de petits par portée, aux pertes fœtales, au développement et au comportement des petits.

Une étude semblable a démontré qu'en utilisant seulement l'acide clavulanique on arrivait, avec des doses identiques, à des résultats semblables à ceux cités plus haut, à l'exception de deux fœtus, issus du groupe traité avec une dose quotidienne de 400 mg/kg, qui souffraient de scoliose.

### **Tératologie**

On a fait s'accoupler trois groupes de 30 femelles. Du 6<sup>e</sup> au 15<sup>e</sup> jour de gestation, elles ont reçu du trihydrate d'amoxicilline et du clavulanate de potassium dans une proportion de 2 :1, en doses quotidiennes de 20/10, 100/50 et 800/400 mg/kg. Un quatrième groupe a servi de témoin. Au 20<sup>e</sup> jour de gestation, on a sacrifié 20 femelles par groupe et on a procédé à une césarienne; on a laissé les 10 femelles restantes par groupe mettre bas d'une façon normale. On a constaté le décès d'une mère du groupe traité avec une dose quotidienne de 100/50 mg/kg, pourtant sa morphologie interne était normale. L'observation des femelles en gestation a révélé que tous les groupes traités subissaient une chute des poils liée à la dose reçue, une réduction (11-23 %) du gain pondéral moyen entre les 6<sup>e</sup> et 20<sup>e</sup> jours de gestation, et une diminution de la consommation de nourriture. On a observé chez tous les groupes traités une légère augmentation des cas où la nidation ne s'est pas produite, mais celle-ci n'était ni statistiquement significative ni reliée à la dose reçue. Le taux de gestation, le nombre de petits par portée, le nombre de fœtus perdus et le poids moyen des petits n'ont pas été modifiés par le traitement.

L'incidence de la déviation des côtes est liée à la dose et on a observé trois cas de scoliose dans les groupes traités avec des doses quotidiennes de 100/50 et 800/400 mg/kg. Parmi les autres anomalies notées chez les petits, citons des sternèbres surnuméraires (1 petit), de nombreuses pétéchies sur l'estomac et des sternèbres déplacées (1 petit), des lèvres fendues et plusieurs anomalies du squelette (vertèbres, côtes, boîte crânienne et sternum) (1 petit).

Une étude semblable a démontré qu'en utilisant seulement l'acide clavulanique on observait, avec des doses identiques, des résultats semblables aux résultats susmentionnés de même qu'une réduction de l'ossification liée à la dose reçue et une baisse statistiquement significative du poids corporel moyen des petits.

### **Études périnatales et postnatales**

À partir du 15<sup>e</sup> jour de gestation, pendant la lactation et jusqu'au 21<sup>e</sup> jour après la mise bas, trois groupes de 20 rates en gestation ont reçu par gavage oral du trihydrate d'amoxicilline et du clavulanate de potassium dans une proportion de 2:1 en doses quotidiennes de 20/10, 100/50 et 800/400 mg/kg. Un quatrième groupe a servi de témoin. Aucun décès n'a été observé chez les mères, mais, du 15<sup>e</sup> au 20<sup>e</sup> jour de gestation et du 1<sup>er</sup> au 4<sup>e</sup> jour de lactation, il y a eu une légère diminution (17 %) du poids corporel moyen des mères du groupe traité avec des doses quotidiennes de 800/400 mg/kg. On a observé 6 décès : 5 dont les mères étaient traitées à des doses quotidiennes de 100/50 mg/kg et 1 dont la mère était traitée à des doses quotidiennes de 800/400 mg/kg. Une réduction significative sur le plan statistique du nombre moyen des nouveau-nés viables par portée a été enregistrée dans le groupe traité avec des doses élevées. Les 4<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup>, 12<sup>e</sup> et 21<sup>e</sup> jours de lactation, une augmentation de la mortalité significative sur le plan statistique a été observée chez les petits des rates traitées avec des doses quotidiennes de 100/50 mg/kg et une légère augmentation de la mortalité non significative sur le plan statistique a été enregistrée aussi chez les petits des rates qui recevaient des doses de 800/400 mg/kg par jour. L'accouplement des animaux de la première génération, issus des mères traitées par des doses quotidiennes de 800/400 mg/kg, a révélé une diminution statistiquement significative du nombre de nidations et de la taille des corps jaunes par rapport au groupe témoin. Chez tous les groupes traités et chez le groupe témoin, les paramètres des petits de la première génération n'ont révélé aucune autre différence biologique importante ni aucune tendance reliée à la dose quant aux observations des portées, aux indices de comportement et de développement, aux réactions neuropharmacologiques ou à la capacité reproductrice.

Une étude semblable a démontré qu'en administrant seulement l'acide clavulanique, on obtenait, avec des doses identiques, des effets semblables sur la maternité. Dans la première génération, un petit, issu d'animaux du groupe traité à des doses de 50 mg/kg par jour, et un petit, issu d'animaux traités à des doses de 400 mg/kg par jour, ont eu des côtes rudimentaires bilatérales et un petit, issu d'animaux du groupe traité avec des doses de 400 mg/kg par jour, était hydrocéphale et avait des côtes rudimentaires bilatérales.

## **17 MONOGRAPHIES DE PRODUIT DE SOUTIEN**

1. CLAVULIN (comprimés, suspension orale, CLAVULIN -500F, CLAVULIN -875, CLAVULIN -125F, CLAVULIN -200, CLAVULIN-250F et CLAVULIN-400), numéro de contrôle de la présentation 235606, Monographie de produit, GlaxoSmithKline Inc. (2022, 11, 28)

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

### LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

#### PrM-AMOXI CLAV

#### Amoxicilline et clavulanate de potassium pour suspension orale, Norme maison

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre **M-AMOXI CLAV** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **M-AMOXI CLAV**.

#### Pour quoi utilise-t-on M-AMOXI CLAV?

M-AMOXI CLAV est un antibiotique utilisé pour traiter des infections bactériennes.

#### Comment M-AMOXI CLAV agit-il?

Les ingrédients contenus dans M-AMOXI CLAV agissent de deux façons : l'amoxicilline tue les bactéries et l'acide clavulanique aide l'amoxicilline à tuer les bactéries.

#### Quels sont les ingrédients de M-AMOXI CLAV?

Ingrédients médicinaux : amoxicilline (sous forme de trihydrate) et acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium).

Ingrédients non médicinaux : acide citrique anhydre, arôme tutti frutti, arôme vanille, carmellose sodique, cellulose microcristalline, citrate de sodium anhydre, dioxyde de silicium, gomme xanthane, mannitol, silice colloïdale anhydre, sucralose.

#### M-AMOXI CLAV est disponible sous les formes posologiques suivantes:

Poudre pour suspension orale M-AMOXI CLAV : 250/62,5 mg et 400/57 mg d'amoxicilline et d'acide clavulanique par 5 mL (après reconstitution avec de l'eau purifiée).

#### Ne pas utiliser M-AMOXI CLAV si:

- vous ou votre enfant êtes allergique :
  - à l'amoxicilline;
  - aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (comme les pénicillines et les céphalosporines);

- à l'un des autres ingrédients de M-AMOXI CLAV (voir **Quels sont les ingrédients de M-AMOXI CLAV?**).
- vous ou votre enfant avez déjà été atteint :
  - de jaunisse (jaunissement de la peau et/ou du blanc des yeux) ou d'une maladie du foie après avoir pris M-AMOXI CLAV.
- vous êtes atteint de mononucléose.

**Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre M-AMOXI CLAV, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si vous :**

- avez déjà eu une réaction allergique (une éruption cutanée, par exemple) pendant un traitement par un antibiotique.
- commencez à avoir une éruption cutanée durant votre traitement par M-AMOXI CLAV.  
Dans ce cas :
  - cessez de prendre M-AMOXI CLAV;
  - parlez-en à votre professionnel de la santé sur-le-champ.
- êtes atteint de mononucléose.
- avez des problèmes de foie ou de reins.
- êtes enceinte ou planifiez une grossesse.
- allaitez ou prévoyez le faire.
  - L'amoxicilline contenue dans M-AMOXI CLAV passe dans le lait maternel humain. Parlez-en avec votre professionnel de la santé.
- prenez une pilule contraceptive, car elle pourrait ne pas être aussi efficace si vous prenez M-AMOXI CLAV.

#### **Autres mises en garde :**

- M-AMOXI CLAV traite seulement les infections bactériennes, pas les infections virales comme le rhume.
- Même si votre état s'améliore au début du traitement, utilisez M-AMOXI CLAV exactement comme il vous a été prescrit.
- L'utilisation de M-AMOXI CLAV en trop grande quantité ou de la mauvaise façon pourrait se traduire par :
  - la croissance d'un plus grand nombre de bactéries;
  - des bactéries qui ne seront pas détruites (résistance);
  - une inefficacité du médicament dans l'avenir.

Ne partagez pas votre médicament.

**Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.**

**Les produits suivants pourraient interagir avec M-AMOXI CLAV :**

- l'allopurinol ou le probénécide (pour le traitement de la goutte);
- les anticoagulants (utilisés pour prévenir les caillots sanguins), comme la warfarine; ou
- le mofétilmycophénolate (un immunosuppresseur).

**Comment prendre M-AMOXI CLAV?**

Vous devez prendre le médicament de la façon expliquée par votre professionnel de la santé. Il décidera de la quantité de médicament que vous ou votre enfant devez prendre chaque jour et du nombre de jours de traitement.

Le traitement dure normalement de 7 à 10 jours. Votre professionnel de la santé pourrait vous demander de prendre M-AMOXI CLAV pendant 48 à 72 heures de plus, selon les effets qu'aura le traitement sur vous.

Il est préférable de prendre M-AMOXI CLAV en même temps qu'un repas, mais il fait quand même effet si vous le prenez sans nourriture.

Pour la suspension orale :

- agitez avant l'utilisation.
- Veuillez utiliser la seringue fournie par votre pharmacien afin d'assurer l'exactitude de la dose à administrer.

Si vous avez besoin de clarifications pour quoi que ce soit, veuillez consulter votre professionnel de la santé.

**Dose habituelle :**Enfants :

Pour un enfant âgé de 12 semaines (3 mois) et plus, suivez les directives du professionnel de la santé.

Infection	Sévérité	Posologie	
		2 fois par jour*	3 fois par jour
		200 mg d'amoxicilline et 28,5 mg d'acide clavulanique***	125 mg d'amoxicilline et 31,25 mg d'acide clavulanique***
		400 mg d'amoxicilline et 57 mg d'acide clavulanique	250 mg d'amoxicilline et 62,5 mg d'acide clavulanique
Voies urinaires	Légère à modérée	25 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 12 heures	20 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 8 heures
Peau et tissus mous	Sévère	45 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 12 heures	40 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 8 heures
Voies respiratoires inférieures, Sinusite		45 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 12 heures	40 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 8 heures
Otite moyenne (infection à l'intérieur de l'oreille)**			40 mg/kg/jour en doses fractionnées toutes les 8 heures

\* La posologie à 2 fois par jour est recommandée parce qu'elle est associée à beaucoup moins de diarrhée.

\*\* La durée de traitement étudiée et recommandée pour l'otite moyenne aiguë est de 10 jours.

\*\*\* M-AMOXI-CLAV n'est disponible qu'en concentration de 250 mg d'amoxicilline / 62,5 mg d'acide clavulanique et de 400 mg d'amoxicilline / 57 mg d'acide clavulanique

#### Nourrissons et enfants âgés de moins de 12 semaines (3 mois) :

La dose de M-AMOXI CLAV recommandée est de 30 mg par kg par jour en doses fractionnées toutes les 12 heures, suivant les directives de votre professionnel de la santé. La suspension orale de 125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique par 5 mL est recommandée. M-AMOXI CLAV n'est PAS disponible à la concentration de 125 mg d'amoxicilline / 31,25 mg d'acide clavulanique ou de 200 mg d'amoxicilline / 28,5 mg d'acide clavulanique.

La posologie pour un enfant ne doit pas dépasser celle recommandée pour les adultes. L'enfant pesant plus de 38 kg doit recevoir la posologie recommandée pour les adultes.

#### Patients présentant des problèmes de rein :

Si vous éprouvez des problèmes de rein, votre médecin pourrait ajuster votre dose.

## Surdosage:

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de M-AMOXI CLAV, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

## Dose oubliée :

Si vous ou votre enfant oubliez une dose de M-AMOXI CLAV, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, sautez la dose omise et reprenez l'horaire habituel. Ne doublez pas la dose suivante pour compenser votre oubli.

## Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à M-AMOXI CLAV?

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez M-AMOXI CLAV. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

- Un effet secondaire très fréquent chez les adultes peut être la diarrhée (selles molles ou liquides).
- Les effets secondaires fréquents peuvent être les suivants :
  - infection aux levures des ongles, de la peau, de la bouche, du vagin, de l'estomac ou des voies urinaires;
  - nausées ou vomissements;
  - diarrhée (selles molles ou liquides) chez les enfants.
- Les effets secondaires peu fréquents peuvent être les suivants :
  - indigestion et maux de tête;
  - légère éruption cutanée ou démangeaisons.
- Les effets secondaires très rares peuvent être les suivants :
  - jaunissement, brunissement ou noircissement de la langue, qui peut aussi avoir une apparence velue (ou pileuse);
  - coloration possible des dents;
    - pour réduire ou prévenir cet effet, brossez-vous bien les dents;
    - consultez votre dentiste ou votre médecin si la coloration ne disparaît pas.

Effets secondaires graves et mesure à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
<b>RARE</b>			
<b>Troubles sanguins</b> accompagnés de symptômes tels que saignements ou ecchymoses (bleus) survenant plus facilement qu'à la normale			✓
<b>Érythème polymorphe</b> (réaction cutanée allergique) : plaques violacées ou rougeâtres accompagnées de démangeaisons surtout sur la paume des mains ou la plante des pieds			✓
<b>TRÈS RARE</b>			
<b>Réactions allergiques</b> : difficulté à respirer, fièvre, urticaire (bosses rouges qui démangent), démangeaisons, éruption cutanée, enflure de la langue ou de la gorge			✓
<b>Troubles du système nerveux central (crises convulsives ou épileptiques)</b> problèmes tels que convulsions <b>(méningite aseptique)</b> inflammation de la membrane protectrice entourant le cerveau			✓
<b>Colite à <i>Clostridium difficile</i></b> (inflammation intestinale) : accompagnée de symptômes tels que diarrhée sévère (selles liquides ou sanglantes) avec ou sans fièvre, douleurs abdominales ou sensibilité abdominale			✓
<b>Réaction médicamenteuse s'accompagnant d'éosinophilie</b>			✓



Effets secondaires graves et mesure à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
<b>et de symptômes généraux (syndrome DRESS)</b> (réaction sévère pouvant mettre la vie en danger) : symptômes ressemblant à ceux de la grippe accompagnés de fièvre, d'une éruption cutanée, d'enflure du visage ou des ganglions			
<b>Problèmes de reins</b> accompagnés de symptômes tels que présence de sang dans l'urine pouvant être associée à une éruption cutanée, de la fièvre, des douleurs articulaires ou une réduction de la quantité d'urine éliminée			✓
<b>Problèmes de foie</b> accompagnés de symptômes tels que jaunissement de la peau et/ou du blanc des yeux, urine foncée, nausées, vomissements, douleurs abdominales, fièvre ou fatigue inhabituelle			✓
<b>Réactions cutanées sévères : (syndrome de Stevens-Johnson et érythrodermie bulleuse avec épidermolyse)</b> ampoules et peau qui pèle, particulièrement autour de la bouche, du nez, des yeux et des organes génitaux; ou, dans les cas plus sévères, ampoules et peau qui pèle sur une grande partie du corps; douleurs ou fièvre <b>(dermatite bulleuse ou exfoliative)</b> éruption cutanée rouge et écaillée avec			✓

Effets secondaires graves et mesure à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
démangeaisons, accompagnée d'ampoules et de bosses sous la peau <b>(pustulose exanthématique)</b> éruption cutanée généralisée accompagnée de rougeur et de petites ampoules contenant du pus			
<b>Vascularite</b> (inflammation d'un vaisseau sanguin) : plaques rouges ou violacées surélevées sur la peau, fatigue, fièvre, engourdissement ou faiblesse			✓
<b>FRÉQUENCE INCONNUE</b>			
<b>Troubles cardiovasculaires</b> <b>Syndrome de Kounis</b> : douleur à la poitrine qui peut être le signe d'une réaction allergique potentiellement grave			✓

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

#### Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur;

ou

- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

**Entreposage :**

Poudre :Conservez à température ambiante (15 à 30 °C) dans son carton d'origine pour protéger de la lumière et de l'humidité. Ne l'utilisez que si sa couleur est blanc ou blanc cassé.

La suspension reconstituée de M-AMOXI CLAV (250 mg / 62,5 mg par 5 mL) doit être conservée au réfrigérateur (2 à 8 °C) et utilisée dans les 10 jours. Jetez toute suspension inutilisée 10 jours après sa reconstitution initiale.

La suspension reconstituée de M-AMOXI CLAV (400 mg / 57 mg par 5 mL) doit être conservée au réfrigérateur (2 à 8 °C) et utilisée dans les 7 jours. Jetez toute suspension inutilisée 7 jours après sa reconstitution initiale.

Gardez le flacon bien fermé en tout temps.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

**Pour en savoir davantage au sujet de M-AMOXI CLAV:**

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), ou en contactant Mantra Pharma Inc. au [medinfo@mantrapharma.ca](mailto:medinfo@mantrapharma.ca) ou au 1-833-248-7326.

Le présent feuillet a été rédigé par  
Mantra Pharma Inc.  
1000 rue du Lux, Suite 201  
Brossard, Quebec  
J4Y 0E3

Dernière révision : 2023, 10, 06