

One label panel



## **BARDOX**

### **HYDROGEN PEROXIDE AND L-LACTIC ACID TEAT SOLUTION/ SOLUTION POUR TRAYONS À BASE DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET D'ACIDE L-LACTIQUE**

**Pre- and Post-Milking Antiseptic Teat Solution/Solution antiseptique pour trayons à utiliser avant et après la traite**

**DIN 02482096**

**ACTIVE INGREDIENTS:** Hydrogen peroxide 0.5% w/w, L-Lactic acid 1.7% w/w

**EMOLLIENT:** Glycerin 5% w/w

**INDICATIONS:** **BARDOX** is a pre- and post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

#### **DIRECTIONS FOR USE:**

**Pre-Milking:** Use at full strength. Do not dilute. Before milking, apply **BARDOX** to each teat, ensuring complete coverage of all teats with the solution. After 15 to 30 seconds, dry each teat thoroughly. If the udder and teats are heavily soiled, clean with an antiseptic udder wash and dry thoroughly before application of **BARDOX**.

**Post-Milking:** Use at full strength. Do not dilute. Apply **BARDOX** to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0°C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. When a cow is being dried off, continue the application of **BARDOX** to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of **BARDOX** to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving. A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

**CAUTIONS:** For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

**WARNINGS:** No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

**STORAGE CONDITIONS:** Store between 4°C and 25°C (39 – 77 °F). Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

**OTHER HAZARDS:** Please refer to the Material Safety Data Sheet

**INGRÉDIENTS ACTIFS:** Peroxyde d'hydrogène 0.5 % p/p, Acide L-lactique 1.7 % p/p

**ÉMOLLIENT:** Glycérine 5 % p/p

**INDICATIONS:** **BARDOX** est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons avant et après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches laitières.

**MODE D'EMPLOI:**

**Avant la traite:** Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Avant la traite, appliquer **BARDOX** sur chaque trayon de manière à ce que la solution couvre toute la surface des trayons. Laisser agir de 15 à 30 secondes, puis bien sécher les trayons. Si le pis et les trayons sont très sales, les nettoyer avec une solution antiseptique de lavage du pis, puis bien les sécher avant d'appliquer **BARDOX**.

**Après la traite:** Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer **BARDOX** sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0 °C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel. Quand une vache est tarie, continuer l'application de **BARDOX** sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de **BARDOX** sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage. Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rincé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.


**PRÉCAUTIONS:** Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

**MISES EN GARDE:** Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

**CONDITIONS D'ENTREPOSAGE:** Entreposer entre 4 °C et 25 °C (39 – 77 °F). Éviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la détérioration. Garder le contenant bien fermé.

**AUTRES DANGERS:** Veuillez consulter la fiche signalétique du produit

CONTAINS:



LOT NO:

FAIT AU CANADA / MADE IN CANADA

EXP DATE:

CODE PROD. / PROD. CODE: 104305

FABRIQUÉ PAR / MANUFACTURED BY: LIBERCHEM INC.

572 Avenue Orly, Dorval (Quebec) H9P 1E9 CANADA

NI