

**TEAT DEFENCE 110 POST DIP**  
**Iodine Teat Solution**  
**Post-Milking Antiseptic Teat Solution**  
**Veterinary Use Only**

**Indications:** TEAT DEFENCE 110 POST DIP is a post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

=====

**ACTIVE INGREDIENTS:** Iodine 1.0% w/w (from polyethoxy polypropoxy polyethoxy ethanol iodine complex)

**Emollients:** Glycerin 10.0% w/w

**DIRECTIONS FOR USE:**

**Post-Milking:** Use at full strength. Do not dilute. Apply TEAT DEFENCE 110 POST DIP to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0°C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing.

When a cow is being dried off, continue the application of TEAT DEFENCE 110 POST DIP to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of TEAT DEFENCE 110 POST DIP to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving.

A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

**CAUTIONS:**

For external use only. If cow's teats are sore, irritated, or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

**WARNINGS:**

- No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label.
- Avoid contact with food. Do not take internally.
- If accidentally ingested, drink large volumes of water.
- Avoid contact with skin and eyes.
- If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes.
- Avoid breathing vapours.
- Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

**STORAGE CONDITIONS:**

- Store at room temperature (15-30°C).
- Avoid freezing.
- Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

=====

ProducersAgriSupply.com  
Producers Agri-Supply Ltd.  
1884 Fairmeadow Cres., Ottawa ON K1H 7B9

18.9 L/56.78 L/208.2 L/1041 L

LOT:  
EXP.  
DIN: 02369397

**TEAT DEFENCE 110 POST DIP**  
**Solution pour trayons à base d'iode**  
**Solution antiseptique pour trayons à utiliser après la traite**  
**Usage vétérinaire seulement**

**Indications :** TEAT DEFENCE 110 POST DIP est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches laitières.

=====

**INGRÉDIENTS ACTIFS :** Iode à 1,0% p/p (d'un complexe iodé de polyéthoxy polypropoxy polyéthoxy éthanol)

**Émoullissants:** Glycérine 10,0% p/p

**MODE D'EMPLOI :**

**Après la traite:** Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer TEAT DEFENCE 110 POST DIP sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0 °C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel.

Quand une vache est tarie, continuer l'application de TEAT DEFENCE 110 POST DIP sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de TEAT DEFENCE 110 POST DIP sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage.

Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rincé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.

**PRÉCAUTIONS :**

Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

**MISES EN GARDE :**

Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

**CONDITIONS D'ENTREPOSAGE :**

Entreposer à température ambiante (entre 15 °C et 30 °C). Éviter le gel. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la détérioration. Garder le contenant bien fermé.

=====

ProducersAgriSupply.com  
Producers Agri-Supply Ltd.  
1884 Fairmeadow Cres., Ottawa ON K1H 7B9

18,9 L/56,78 L/208,2 L/1041 L

LOT :  
EXP.  
DIN: 02369397