

Label, front panel (bilingual) Buzone Conc.

DIN 02105748



# Buzone Conc.

PHENYLBUTAZONE POWDER / POUDRE DE PHENYLBUTAZONE

Veterinary Use Only/Usage vétérinaire seulement

Flavoured / Aromatisé

Net 225 g

Nonsteroidal anti-inflammatory drug / Anti-inflammatoire non stéroïdien

**WARNINGS:** Do not use this product in food producing animals including horses that are to be slaughtered for use in food. Keep out of reach of children.

**MISES EN GARDE:** Ne pas utiliser ce produit chez les animaux destinés à la production d'aliments, incluant les chevaux devant être abattus à des fins alimentaires. Garder hors de portée des enfants.

Can-Vet Animal Health Supplies Ltd.  
4-61 Malcolm Rd.  
Guelph, ON  
N1K1A7  
519-822-5333

Label, left panel (English version) Buzone Conc

**Active Ingredients:** **per g**  
Phenylbutazone.....266.66 mg

**INDICATIONS:**

**Buzone Conc.** is a nonsteroidal anti-inflammatory drug indicated as an aid in the treatment of arthritis, myositis and rheumatism in horses.

**DOSAGE and ADMINISTRATION:**

Administer orally 1 to 2 g of phenylbutazone per 227 kg of body weight, daily, in at least 2 divided doses. Daily dosage should not exceed 4 g. As symptoms regress, reduce dosage to a level able to control the condition. In some cases treatment should be given only while symptoms are evident with no need for continuous medication.

**NOTES:**

Using the enclosed spoon, 1 level spoon of powder contains approximately 1 g of phenylbutazone.

**CAUTIONS:**

If no significant clinical improvement is noted in 5 days, the diagnosis and treatment should be re-evaluated. Discontinue medication if signs of gastrointestinal upset, jaundice or blood dyscrasia appear. When inflammatory conditions are caused by micro-organisms, adequate therapy should be given simultaneously with phenylbutazone.

**CONTRAINDICATIONS:**

This treatment is contraindicated in horses with cardiac, renal or hepatic insufficiency and in cases with signs or history of anemia or other haemocytological disorders. The use of this product or any other NSAID is contraindicated in horses with preexisting gastrointestinal ulcers or if bleeding is suspected. Do not administer concurrently with corticosteroids or other NSAIDs. Do not administer to dehydrated animals.

**ADVERSE REACTIONS:**

Oral and gastrointestinal erosions and ulcers, hypoalbuminemia, diarrhea, anorexia, renal effects (azotemia, renal papillary necrosis, sodium and water retention), and blood dyscrasias have been reported with the use of phenylbutazone.

**STORAGE CONDITIONS:**

Store between 15°C and 25°C. Protect from moisture.

Label, right panel (French version) Buzone Conc.

**Ingrédients actifs :** **par g**  
Phénylbutazone.....266,66 mg

**INDICATIONS:**

**Buzone Conc.** est un anti-inflammatoire non stéroïdien indiqué pour aider au traitement de l'arthrite, la myosite et du rhumatisme chez les chevaux.

**POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION:**

Administrer par voie orale 1 à 2 g de phénylbutazone par 227 kg de poids corporel, par jour, administré à raison d'au moins 2 prises fractionnées. La dose quotidienne ne doit pas excéder 4 g. À mesure que les symptômes s'atténuent, réduire la dose au niveau nécessaire pour contrôler la condition. Dans certains cas, le traitement doit être administré seulement quand les symptômes sont visibles, sans besoin de médication continue.

**REMARQUE:**

En utilisant la cuillère incluse, 1 cuillerée rase de poudre contient environ 1 g de phénylbutazone.

**PRÉCAUTIONS:**

Si aucune amélioration clinique significative n'est observée après 5 jours de traitement, le diagnostic et le traitement devraient être reconsidérés. Cesser le traitement si des signes de dérangement gastro-intestinal, de jaunisse ou de dyscrasie sanguine apparaissent. Si les conditions inflammatoires sont causées par des micro-organismes, une thérapie appropriée doit accompagner le traitement avec la phénylbutazone.

**CONTRE-INDICATIONS :**

La phénylbutazone est contre-indiquée chez les chevaux souffrant d'insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale et dans les cas d'anémie ou d'antécédents d'anémie ou de d'autres désordres hématologiques. L'utilisation de ce produit ou de tout autre AINS est contre-indiquée chez les chevaux présentant des ulcères gastro-intestinaux ou si des saignements sont suspectés. Ne pas administrer en concomitance avec des corticostéroïdes ou autres médicaments AINS. Ne pas administrer aux animaux déshydratés.

**RÉACTIONS INDÉSIRABLES :**

Érosions et ulcères oraux et gastro-intestinaux, hypoalbuminémie, diarrhée, anorexie, effets rénaux (azotémie, nécrose papillaire rénale, rétention d'eau et de sodium) et dyscrasies sanguines ont été rapportés avec l'usage de la phénylbutazone.

**CONDITIONS D'ENTREPOSAGE:**

Entreposer entre 15°C et 25°C. Protéger contre l'humidité.

Lot :

Exp. :