

## MONOGRAPHIE DE PRODUIT

**Pr Eugia-Sunitinib**

Capsules de sunitinib

12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg et 50 mg  
Sunitinib ( sous forme de malate de sunitinib)

Inhibiteur de tyrosine kinases, antinéoplasique

**Eugia Pharma Inc.**

3700 Steeles Avenue West, Suite # 402  
Woodbridge, Ontario, L4L 8K8,  
Canada

**Date de préparation:**

27 mai 2024

Numéro de contrôle de la présentation: 286388

## Table des matières

<b>PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ .....</b>	<b>3</b>
RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT .....	3
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE .....	3
CONTRE-INDICATIONS.....	4
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS.....	4
EFFETS INDÉSIRABLES.....	19
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES .....	35
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION .....	37
SURDOSAGE .....	38
MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE .....	38
STABILITÉ ET CONSERVATION .....	42
DIRECTIVES PARTICULIÈRES DE MANIPULATION.....	42
PRÉSENTATION, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT .....	43
<b>PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES .....</b>	<b>44</b>
RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES .....	44
ESSAIS CLINIQUES.....	45
PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE.....	57
MICROBIOLOGIE.....	60
TOXICOLOGIE .....	60
RÉFÉRENCES.....	67
<b>PARTIE III: RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR .....</b>	<b>69</b>

**Pr Eugia-Sunitinib**  
Capsules de sunitinib

**PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ**

**RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT**

<b>Voie d'administration</b>	<b>Forme posologique / teneur</b>	<b>Tous les ingrédients non médicinaux</b>
Orale	Capsules en gélatine dure dosées à 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg et 50 mg	Mannitol, croscarmellose sodique, povidone et stéarate de magnésium

**INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE**

Eugia-Sunitinib (malate de sunitinib) est indiqué pour :

- le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI, ou *GIST*, pour *gastrointestinal stromal tumor* ) après l'échec du traitement par le mésylate d'imatinib pour cause de résistance ou d'intolérance.  
L'approbation de malate de sunitinib est fondée sur le temps écoulé avant la reprise évolutive du cancer. Le bienfait sur le plan de la survie globale n'a pas pu être confirmé (*voir* ESSAIS CLINIQUES).
- le traitement de l'adénocarcinome rénal métastatique (ARM, ou *MRCC*, pour *metastatic renal cell carcinoma*) à cellules claires.  
L'approbation de malate de sunitinib dans le traitement de l'ARM est fondée sur les résultats statistiquement significatifs qui ont été obtenus pour la survie sans évolution chez des patients présentant un indice fonctionnel favorable (ECOG 0-1). On a noté une tendance favorable sur le plan de la survie globale (*voir* ESSAIS CLINIQUES).
- le traitement des tumeurs neuroendocrines pancréatiques bien différenciées, non résécables et évolutives, à un stade avancé ou métastatique.  
L'approbation de malate de sunitinib dans le traitement des tumeurs neuroendocrines pancréatiques se fonde sur la survie sans évolution chez des patients présentant un indice fonctionnel favorable (ECOG 0-1) (*voir* ESSAIS CLINIQUES).

**Enfants :**

L'innocuité et l'efficacité de malate de sunitinib chez l'enfant n'ont pas été établies (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS *et* TOXICOLOGIE).

**Personnes âgées (> 65 ans) :**

Parmi les 825 patients atteints d'une TSGI ou d'un ARM qui ont reçu malate de sunitinib dans les essais cliniques, 277 (34 %) avaient 65 ans ou plus. Dans l'essai de phase III sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques, 22 patients (27 %) du groupe malate de sunitinib avaient 65 ans

ou plus. Dans l'ensemble, on n'a pas décelé de différence sur le plan de l'innocuité ou de l'efficacité entre les sujets âgés et les plus jeunes.

## CONTRE-INDICATIONS

Eugia-Sunitinib (malate de sunitinib) est contre-indiqué dans les cas d'hypersensibilité au malate de sunitinib ou à l'un des autres ingrédients d'Eugia-Sunitinib. Voir PRÉSENTATION, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT pour connaître la liste complète des ingrédients.

Eugia-Sunitinib est contre-indiqué chez la femme enceinte.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

### Mises en garde et précautions importantes

Les patients traités par Eugia-Sunitinib doivent être sous la surveillance d'un médecin qualifié ayant de l'expérience dans l'administration des antinéoplasiques.

- Hémorragie tumorale (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hémorragie).
- Baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG), y compris des cas mortels (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Dysfonctionnement ventriculaire gauche).
- Hypertension (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hypertension).
- Prolongation de l'intervalle QT, y compris des cas mortels (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Prolongation de l'intervalle QT et INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES).
- Cardiomyopathie, y compris des cas mortels (voir EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit).
- Manifestations cérébrovasculaires et cardiovasculaires, y compris des cas mortel (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Manifestations thromboemboliques artérielles).
- Embolie pulmonaire, y compris des cas mortels (voir EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit).
- Microangiopathie thrombotique, y compris des cas mortels (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Microangiopathie thrombotique).
- Malate de sunitinib n'a pas été étudié chez des patients souffrant de dysfonctionnement hépatique sévère.
- Hépatotoxicité mortelle (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction hépatique/biliaire/pancréatique et Dysfonctionnement thyroïdien et EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit).
- Myopathie et/ou rhabdomyolyse, y compris des cas mortels (voir EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit).
- Insuffisance rénale, y compris des cas mortels (voir EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit).
- Syndrome réversible de leucoencéphalopathie postérieure, y compris des cas mortels (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Convulsions et EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit).
- Épanchement pleural, y compris des cas mortels (voir EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit).

## **Carcinogénèse et mutagenèse**

On a évalué le potentiel carcinogène du malate de sunitinib chez des souris transgéniques rasH2 et des rats Sprague-Dawley.

Chez les souris transgéniques rasH2, des cas de cancer gastroduodéal et d'hyperplasie de la muqueuse gastrique de même qu'une incidence d'hémangiosarcomes supérieure à celle attendue ont été observés après 1 et 6 mois de traitement à des doses  $\geq 25$  mg/kg/jour ( $\geq 7,3$  fois l'ASC obtenue chez les patients traités à la dose quotidienne recommandée [DQR]). Il n'y a pas eu d'altérations prolifératives chez ces souris à la dose de 8 mg/kg/jour ( $\geq 0,7$  fois l'ASC obtenue chez les patients traités à la DQR).

Dans une étude de cancérogénicité de 2 ans menée chez le rat, l'administration du malate de sunitinib (0, 0,33, 1 ou 3 mg/kg/jour) selon des cycles de 28 jours suivis de périodes de 7 jours sans médicament a été associée à des carcinomes des glandes de Brunner et à une augmentation de la fréquence d'hyperplasie et de phéochromocytomes médullosurrénaux chez les rats mâles qui avaient reçu 3 mg/kg/jour pendant plus d'un an ( $\geq 7,8$  fois l'ASC obtenue chez les patients traités à la dose quotidienne recommandée [DQR]).

La pertinence pour l'homme des résultats néoplasiques observés dans les études de cancérogénicité chez la souris (transgénique rasH2) et le rat avec le traitement par le malate de sunitinib n'est pas claire. (voir **TOXICOLOGIE, Cancérogénicité**).

On a évalué le potentiel mutagène du malate de sunitinib au cours d'une série d'essais in vitro (mutation bactérienne [épreuve d'Ames], aberration chromosomique de lymphocytes humains) et in vivo (test du micronoyau dans les cellules de moelle osseuse du rat); le malate de sunitinib n'a pas causé de lésion chromosomique.

## **Systeme cardiovasculaire**

### **Hypertension**

La tension artérielle des sujets a été surveillée de façon systématique au cours des essais cliniques. L'hypertension a été très fréquemment signalée comme effet indésirable chez les sujets présentant des tumeurs solides, notamment des TSGI et des adénocarcinomes rénaux réfractaires aux cytokines<sup>1</sup>. Dans un essai sur l'ARM mené chez des patients jamais traités, 2 sujets ont dû abandonner en cours de route en raison d'une hypertension liée au traitement, y compris un cas d'hypertension maligne. Dans l'essai sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques, un sujet a dû abandonner en cours de route en raison d'une hypertension de grade 3 liée au traitement.

Dans l'étude sur les TSGI (essai A), l'hypertension (tous grades confondus) a été signalée comme effet indésirable chez 51/257 patients (19 %) sous malate de sunitinib et 7/102 patients (7 %) sous

---

<sup>1</sup> Lors des essais cliniques initiaux dont les principaux participants étaient atteints de TSGI et d'ARM réfractaires aux cytokines.

placebo; elle était sévère (TAS > 200 mmHg ou TAD > 110 mmHg) chez 9/237 patients (4 %) sous malate de sunitinib, mais chez aucun patient sous placebo. L'hypertension n'a entraîné aucun report de traitement ni réduction de la dose de malate de sunitinib lors de l'essai déterminant sur les TSGI.

Dans l'essai sur l'ARM jamais traité, environ 30 % des patients sous malate de sunitinib et 2 % des patients sous interféron- $\alpha$  ont présenté une hypertension liée au traitement; elle était sévère (TAS > 200 mmHg ou TAD > 110 mmHg) chez 9 % des patients sous malate de sunitinib et 1 % des patients sous IFN- $\alpha$ .

Dans les essais sur l'ARM réfractaire aux cytokines, une hypertension (tous grades confondus) a été signalée en tant qu'effet indésirable chez 47/169 patients (28 %) sous malate de sunitinib. Une élévation de la tension artérielle (TAS > 150 mmHg ou TAD > 100 mmHg) a été observée au moins 1 fois chez 86 des 165 patients (52 %), et elle était sévère (TAS > 200 mmHg ou TAD > 110 mmHg) chez 10 des 165 patients (6 %). Elle a nécessité un report du traitement ou une réduction de dose chez 8 des 165 patients (4 %).

Dans l'essai de phase III sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques, une hypertension liée au traitement a été signalée chez 19/83 patients (23 %) sous malate de sunitinib et 3/82 patients (4 %) sous placebo. Cette hypertension était de grade 3 chez 8/83 patients (10 %) sous malate de sunitinib et 0/82 patient (0 %) sous placebo. Dans le groupe malate de sunitinib, l'hypertension a nécessité un report du traitement ou une réduction de dose chez 6/83 patients (7 %). L'hypertension était sévère (TAS > 200 mmHg ou TAD > 110 mmHg) chez 8/80 patients (10 %) sous malate de sunitinib et 2/76 patients (3 %) sous placebo.

Il faut surveiller la tension artérielle des patients qui reçoivent Eugia-Sunitinib et traiter l'hypertension, le cas échéant, au moyen d'un antihypertenseur standard. Un arrêt temporaire du traitement par Eugia-Sunitinib est recommandé dans les cas d'hypertension sévère. Le traitement peut être repris une fois l'hypertension maîtrisée.

Les patients dont l'hypertension n'est pas maîtrisée malgré une médication ne doivent pas être traités par Eugia-Sunitinib.

De graves cas de dissection artérielle ont été signalés chez des patients traités par un inhibiteur de tyrosine kinases ciblant le VEGFR, dont malate de sunitinib, même en l'absence d'hypertension.

### **Dysfonctionnement ventriculaire gauche**

Des complications cardiovasculaires (insuffisance cardiaque, troubles du myocarde [voir la sous-section Manifestations thromboemboliques artérielles] et cardiomyopathie), parfois mortelles, ont été signalées dans le cadre du programme de pharmacovigilance. Durant un traitement par malate de sunitinib, on a observé une baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG)  $\geq 20$  % et sous la limite inférieure de la normale (LIN) chez environ 2 % des patients ayant une TSGI, 4 % des patients ayant un ARM réfractaire aux cytokines et 2 % des témoins sous placebo.

Dans la phase de traitement à double insu de l'essai A sur les TSGI, 22 patients (11 %) sous malate de sunitinib et 3 témoins (3 %) sous placebo ont présenté une baisse de la FEVG sous la LIN pendant le traitement. Chez 9 des 22 sujets du groupe malate de sunitinib, la FEVG est revenue à la normale spontanément; chez 5 autres, elle est revenue à la normale à la suite d'une intervention notée au dossier (réduction de la dose chez 1 patient, ajout d'un antihypertenseur ou d'un diurétique chez les 4 autres); 6 sujets ont abandonné l'étude avant qu'on puisse noter un retour à la normale; enfin, 2 sujets d'un sous-groupe de 3 (1 %) ayant présenté une réduction de la fonction systolique ventriculaire gauche de grade 3 menant à une FEVG < 40 % sont morts avant la reprise du traitement à l'étude.

Durant l'étude sur l'ARM jamais traité, 27 % et 15 % des patients sous malate de sunitinib et sous IFN- $\alpha$ , respectivement, ont présenté une FEVG inférieure à la LIN. Une insuffisance cardiaque a été diagnostiquée chez 2 patients (< 1 %) sous malate de sunitinib. L'un des patients souffrant d'insuffisance cardiaque a interrompu l'étude.

Dans les études 1 et 2 sur l'ARM réfractaire aux cytokines, 24 patients en tout (14 %) ont eu des valeurs de la FEVG sous la LIN durant le traitement par malate de sunitinib. La FEVG est revenue à la normale spontanément chez 5 d'entre eux; chez 5 autres, elle est revenue à la normale après une intervention notée au dossier (diminution de la dose chez 3 patients; ajout d'un antihypertenseur ou d'un diurétique chez 2 patients); 8 patients ont abandonné l'étude sans qu'on note de retour à la normale, et 6 patients poursuivent l'étude sans que leur FEVG se soit rétablie.

Dans l'essai de phase III sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques, une insuffisance cardiaque mortelle a été signalée chez 2 patients (2 %) sous malate de sunitinib, mais aucun patient sous placebo.

Les patients ayant subi une complication ou une intervention cardiovasculaire (infarctus du myocarde, y compris l'angine sévère/instable, pontage coronarien ou pontage d'une artère périphérique, insuffisance cardiaque symptomatique, accident vasculaire cérébral ou accident ischémique transitoire, embolie pulmonaire) moins de 12 mois avant l'administration du malate de sunitinib ont été exclus des essais cliniques sur malate de sunitinib. On ne sait donc pas si de tels patients sont plus exposés au dysfonctionnement ventriculaire gauche associé à malate de sunitinib. Il est conseillé aux médecins de soupeser le risque en regard des bienfaits potentiels du traitement. **Durant un traitement par Eugia-Sunitinib, il faut surveiller étroitement ces patients, afin de déceler tout signe ou symptôme d'insuffisance cardiaque, et procéder à des évaluations initiales et périodiques de la FEVG. Chez les patients exempts de facteurs de risque cardiaque, il est conseillé d'évaluer la fraction d'éjection au départ.**

**En présence de signes cliniques d'insuffisance cardiaque, il est recommandé de mettre fin au traitement par Eugia-Sunitinib.** Chez les patients exempts de signes d'insuffisance cardiaque, mais dont la fraction d'éjection est < 50 % et inférieure de > 20 % à sa valeur initiale, il faut interrompre l'administration d'Eugia-Sunitinib ou réduire la dose du médicament.

### **Prolongation de l'intervalle QT**

Une prolongation de l'intervalle QT, parfois mortelle, associée à l'emploi de malate de sunitinib a été rapportée dans les essais cliniques. Il existe des données cliniques démontrant que malate de sunitinib prolonge les intervalles QT et PR et diminue la fréquence cardiaque (*voir PHARMACOLOGIE CLINIQUE*). Les patients qui accusaient une prolongation de l'intervalle QTc ou un bloc auriculoventriculaire ou qui prenaient des médicaments pouvant altérer le rythme cardiaque ont été exclus des essais déterminants. On ne connaît donc pas l'innocuité de malate de sunitinib dans ces populations. Comme la prolongation excessive de l'intervalle PR peut provoquer un bloc auriculoventriculaire, il faut faire preuve de prudence lorsqu'on prescrit Eugia-Sunitinib en association avec d'autres médicaments qui peuvent entraîner une prolongation de l'intervalle PR, par exemple les bêtabloquants, les bloqueurs des canaux calciques, les digitaliques et les inhibiteurs de la protéase du VIH.

D'après les résultats des essais précliniques (in vitro et in vivo), malate de sunitinib entraîne une prolongation de l'intervalle QT (*voir PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE*).

Il faut être particulièrement vigilant lorsqu'on administre Eugia-Sunitinib à des patients dont le risque de torsades de pointes, sous l'effet de médicaments pouvant prolonger l'intervalle QTc, est plus élevé que la normale, de même qu'à ceux qui, outre malate de sunitinib, prennent un médicament pouvant prolonger l'intervalle QTc (*voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES*).

La bradycardie et le bloc auriculoventriculaire sont des facteurs de risque reconnus de torsades de pointes. Pour cette raison, et puisque malate de sunitinib provoque une prolongation de l'intervalle QTc accompagnée d'une prolongation des intervalles PR et RR, le risque d'altération du rythme cardiaque est particulièrement préoccupant. Le risque de torsades de pointes est accru en cas de prolongation de l'intervalle QT. Des torsades de pointes ont été observées chez moins de 0,1 % des patients exposés à malate de sunitinib.

Le traitement par Eugia-Sunitinib doit être interrompu en présence de symptômes évocateurs d'une arythmie.

### **Microangiopathie thrombotique**

Des cas de microangiopathie thrombotique (MAT), y compris de purpura thrombocytopénique thrombotique (PTT) et de syndrome hémolytique et urémique (SHU), ayant parfois évolué vers une insuffisance rénale ou la mort, sont survenus durant les essais cliniques et dans le cadre du programme de pharmacovigilance chez des patients traités par malate de sunitinib en monothérapie ou en association avec le bevacizumab (*voir EFFETS INDÉSIRABLES*, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit). Il faut cesser définitivement le traitement par Eugia-Sunitinib chez les patients qui présentent une MAT. Une inversion des effets de la MAT a été observée après l'arrêt du traitement, ce qui concorde avec un rôle décrit des inhibiteurs de la voie du VEGF dans une telle situation. Eugia-Sunitinib n'est pas indiqué en association avec d'autres agents.

### **Manifestations thromboemboliques veineuses/embolie pulmonaire**

Dans la phase de traitement à double insu d'une étude de phase III sur les TSGL, 7 patients (3 %)



du groupe malade de sunitinib ont présenté un trouble thromboembolique veineux (aucun patient dans le groupe placebo); les manifestations, en l'occurrence des thromboses veineuses profondes, ont été de grade 3 chez 5 d'entre eux, et de grade 1 ou 2 chez les 2 autres. Le traitement a été cessé chez 4 de ces 7 patients après la détection des premiers signes de thrombose veineuse profonde. En outre, 4 patients traités par malade de sunitinib ont subi une embolie pulmonaire de grade 3 ou 4; leur médication a été interrompue ou espacée, pour être reprise plus tard; 2 témoins sous placebo ont également subi une embolie pulmonaire. Aucun cas de mortalité attribuable à une embolie pulmonaire n'a été rapporté.

Une manifestation thromboembolique veineuse s'est produite pendant le traitement chez 13 (3 %) des patients recevant malade de sunitinib pour un ARM jamais traité et 4 (2 %) des sujets des 2 études sur l'ARM réfractaire aux cytokines. Sept (7) des patients non traités auparavant pour un ARM ont subi une embolie pulmonaire de grade 2 (1 cas) ou 4 (6 cas), et 6 ont subi une thrombose veineuse profonde, dont 3 de grade 3. Le traitement a dû être interrompu chez un des sujets de l'étude sur les ARM réfractaires aux cytokines ayant souffert d'une embolie pulmonaire. Dans le groupe recevant l'IFN- $\alpha$  pour un ARM jamais traité, des manifestations thromboemboliques veineuses ont touché 6 patients (2 %) : thrombose veineuse profonde de grade 3 dans 1 cas (< 1 %) et embolie pulmonaire dans 5 cas (1 %), tous de grade 4.

Un patient (1 %) ayant reçu malade de sunitinib pour traiter une tumeur neuroendocrine pancréatique a subi une manifestation thromboembolique, comparativement à 5 patients (6 %) ayant reçu un placebo. Le patient sous malade de sunitinib a présenté une thrombose de grade 2. Chez les 5 patients sous placebo qui ont présenté une manifestation thromboembolique, 2 patients ont subi une thromboembolie veineuse profonde (de grade 3 chez l'un et de grade 2 chez l'autre), 2 patients ont subi une embolie pulmonaire (de grade 3 chez l'un et de grade 4 chez l'autre) et 1 patient a subi une thrombose de la veine jugulaire.

### **Manifestations thromboemboliques artérielles**

Des manifestations thromboemboliques artérielles, parfois mortelles, ont été signalées chez des patients traités par le malade de sunitinib. L'accident vasculaire cérébral, l'accident ischémique transitoire et l'infarctus cérébral comptaient parmi les manifestations les plus fréquentes. Les facteurs de risque associés à ce type de manifestation, outre l'affection maligne sous-jacente et l'âge ( $\geq 65$  ans), incluaient l'hypertension, le diabète et des antécédents de maladie thromboembolique.

Des cas d'ischémie myocardique et d'infarctus du myocarde, parfois mortels, ont été signalés dans le cadre du programme de pharmacovigilance. Par conséquent, la prudence est mise lorsque l'on emploie Eugia-Sunitinib chez des patients qui sont exposés à un risque d'ischémie myocardique ou d'infarctus du myocarde ou qui ont des antécédents de telles manifestations thromboemboliques artérielles.

Durant les essais cliniques qui visaient à obtenir l'approbation des indications de malade de sunitinib pour le traitement des TSGI et de l'ARM, on n'a observé aucun cas d'ischémie ni d'infarctus du myocarde chez les patients ayant une TSGI, qu'ils aient reçu malade de sunitinib ou un placebo. Deux (2) patients atteints d'un ARM jamais traité ont subi un infarctus du myocarde

de grade 4 lié au traitement, et 2 patients ont présenté une ischémie myocardique de grade 3. Deux (2) patients ayant un ARM réfractaire aux cytokines ont eu une ischémie du myocarde de grade 3, 1 patient a subi un effet « toxique cardiovasculaire » de grade 2 déclaré en tant qu'effet indésirable et 1 patient est mort d'un infarctus du myocarde durant le traitement.

Il est ressorti de l'analyse des données groupées de 10 essais cliniques sur l'emploi du malate de sunitinib pour le traitement de l'ARM, des TSGI et des tumeurs neuroendocrines pancréatiques menés auprès de 7115 sujets que la fréquence de l'ischémie myocardique/l'infarctus du myocarde avait été de 2,0 %.

### **Interactions médicamenteuses**

Le malate de sunitinib est principalement métabolisé par l'isoenzyme CYP3A4. Il existe un risque d'interactions avec les médicaments inhibiteurs ou inducteurs de cette isoenzyme (*voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES*).

### **Système endocrinien/métabolisme**

#### **Effets sur la fonction surrénale**

Durant les études précliniques où l'on a administré le malate de sunitinib de façon répétée à des rats et à des singes pendant 14 jours à 9 mois, on a observé un effet toxique sur les glandes surrénales à une concentration plasmatique à peine supérieure (1,1 fois) à l'ASC mesurée durant les essais cliniques. Hémorragie, nécrose, congestion, hypertrophie et inflammation constituent les altérations histologiques observées dans les glandes surrénales. Au cours des essais cliniques, les examens d'imagerie (TDM ou IRM) de 336 patients traités par malate de sunitinib n'ont révélé aucun signe d'hémorragie ni de nécrose des surrénales. On a soumis plus de 400 sujets à des épreuves de stimulation par l'hormone corticotrope (ACTH) durant de nombreux essais cliniques sur malate de sunitinib. Pendant les essais sur les TSGI, 13 patients, dont le résultat de ces épreuves était normal au départ, ont obtenu des résultats anormaux par la suite : taux maximal de cortisol post stimulation inférieur à la normale (497 nmol/L ou 18 pg/dL), absence de hausse normale du taux de cortisol en réponse à la stimulation (193 nmol/L ou 7 pg/dL) ou taux de cortisol non multiplié par deux en réponse à un test au gel d'ACTH. On n'a rapporté aucune manifestation d'insuffisance surrénale chez ces patients. Au cours des études sur l'ARM réfractaire aux cytokines, 28 patients dont le résultat des épreuves était normal au départ ont eu des résultats anormaux par la suite, et 3 patients ont présenté une insuffisance surrénale en cours de traitement, mais qui, de l'avis de l'investigateur, n'était pas liée à l'emploi de malate de sunitinib.

On doit surveiller les patients traités par Eugia-Sunitinib, afin de déceler toute insuffisance surrénale quand ils sont soumis à diverses situations stressantes telles qu'une intervention chirurgicale, un trauma ou une infection sévère.

#### **Hypoglycémie**

Des diminutions de la glycémie, parfois symptomatiques sur le plan clinique et ayant de graves conséquences, ont été signalées lors du traitement par malate de sunitinib, tant chez des patients diabétiques que non diabétiques. Il est donc recommandé de vérifier régulièrement la glycémie

chez tous les patients. Dans le cas de ceux recevant des antidiabétiques, il est possible que la dose doive être ajustée pour réduire au minimum le risque d'hypoglycémie.

### **Dysfonctionnement thyroïdien**

Dans les cas de TSGL, une hypothyroïdie est apparue durant le traitement chez 4 % des patients traités par malate de sunitinib vs 1 % des témoins sous placebo. Même si elle n'a fait l'objet d'aucune analyse prospective dans le cadre des essais cliniques, l'hypothyroïdie liée au traitement a été déclarée à titre d'effet indésirable chez 15 % des patients du groupe malate de sunitinib et 2 patients (0,6 %) du groupe IFN- $\alpha$ , au cours de l'étude sur l'ARM jamais traité, de même que chez 4 % des sujets des deux essais sur l'ARM réfractaire aux cytokines. Par ailleurs, on a signalé des hausses du taux de l'hormone thyroïdienne (TSH) chez 2 % des patients atteints d'un ARM réfractaire aux cytokines. L'hypothyroïdie liée au traitement a été déclarée à titre d'effet indésirable chez 5/83 patients (6 %) sous malate de sunitinib dans l'essai de phase III sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques et chez 1/82 patient (1 %) des patients sous placebo.

Des cas d'hyperthyroïdie, quelquefois suivie d'une hypothyroïdie, et des cas de thyroïdite ont été signalés peu souvent dans le cadre des essais cliniques et après le lancement du produit.

On recommande une évaluation de la fonction thyroïdienne en laboratoire chez tous les patients avant la mise en route du traitement, puis tous les 3 mois durant le traitement par le malate de sunitinib. Il faut surveiller de près les patients afin de déceler les signes et symptômes d'un dysfonctionnement thyroïdien pendant le traitement par le malate de sunitinib. Les patients qui présentent des signes ou des symptômes évocateurs d'un dysfonctionnement thyroïdien, tels que la fatigue, doivent être soumis à des examens de laboratoire permettant d'évaluer la fonction thyroïdienne et recevoir, s'il y a lieu, les soins standard qui s'imposent. Une hormonothérapie thyroïdienne substitutive devrait être mise en route et poursuivie conformément aux recommandations contenues dans les lignes directrices en vigueur. La posologie devrait être réglée avec soin afin de réduire le risque d'insuffisance hépatique rapide et imprévisible inhérent à l'administration conjointe de sunitinib. Une surveillance attentive des fonctions hépatique et thyroïdienne s'impose chez les patients sous hormonothérapie thyroïdienne substitutive qui reçoivent Eugia-Sunitinib (*voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Surveillance et épreuves de laboratoire*).

### **Appareil digestif**

#### **Œsophagite**

Des cas d'œsophagite ont été signalés dans le cadre des essais cliniques et après la commercialisation du produit.

#### **Perforation du tube digestif**

Des cas de complications gastro-intestinales graves, parfois même mortelles, y compris une perforation du tube digestif (probablement attribuable à une nécrose tumorale), sont survenus chez des patients porteurs de tumeurs abdominales traités par malate de sunitinib.

#### **Troubles gastro-intestinaux**

Dans le cadre de 6 essais cliniques regroupant principalement des patients atteints de TSGI et d'ARM, et dont les données ont été groupées, les nausées, la diarrhée, la stomatite, la dyspepsie et les vomissements ont été les effets indésirables de nature gastro-intestinale liés au traitement les plus couramment signalés. Au besoin, les soins de soutien à fournir dans les cas d'effets indésirables gastro-intestinaux peuvent comprendre un antiémétique ou un antidiarrhéique.

### **Hémorragie**

Parmi les complications hémorragiques signalées depuis la mise en marché de malate de sunitinib, dont certaines ont été mortelles, mentionnons les hémorragies digestives, pulmonaires, tumorales, cérébrales et des voies urinaires. Au cours de la phase de traitement à double insu de l'étude déterminante (essai A) sur les TSGI, des complications hémorragiques sont survenues chez 20 % (41/202) des patients recevant malate de sunitinib et 11 % (11/102) des témoins sous placebo; elles étaient de grade 3 ou 4 chez 7 % (14/202) des sujets traités par malate de sunitinib et 9 % (9/102) des témoins. En outre, 1 sujet sous placebo est mort d'une hémorragie digestive durant le 2<sup>e</sup> cycle de traitement.

Dans l'étude sur l'ARM jamais traité, 28 % des patients recevant malate de sunitinib et 3 % des patients sous IFN- $\alpha$  ont connu des complications hémorragiques liées au traitement. Le nombre de patients touchés par des complications hémorragiques de grade 3 ou plus liées au traitement a été de 11 (2,1 %) sous malate de sunitinib et de 1 (0,3 %) sous IFN- $\alpha$ .

Dans le traitement de l'ARM réfractaire aux cytokines, des complications hémorragiques se sont produites chez 26 % (50/169) des patients sous malate de sunitinib; la plupart étaient de grade 1 ou 2, mais il y a eu un cas d'hémorragie de grade 3 (plaie à un pied). Deux (2) sujets qui avaient des métastases aux poumons ont présenté une hémoptysie que l'on a jugée attribuable à malate de sunitinib.

Le plus souvent, les complications hémorragiques ont pris la forme d'une épistaxis. Une épistaxis liée au traitement a été signalée chez 16/83 patients (19 %) ayant reçu malate de sunitinib pour traiter une tumeur neuroendocrine pancréatique et chez 2 patients (2 %) ayant reçu un placebo. Chez les patients ayant une TSGI, un ARM ou une tumeur neuroendocrine pancréatique, on a aussi observé des hémorragies rectales, gingivales, digestives hautes, génitales et des hémorragies de plaies, mais moins fréquemment.

Dans l'essai de phase III sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques, une épistaxis de grade 3 a été signalée chez 1/83 patient (1 %) sous malate de sunitinib, mais aucune complication hémorragique de grade 3 ou 4 n'a été signalée. Les patients sous placebo n'ont pas subi de complication hémorragique de grade 3 ou 4. Des complications hémorragiques (excluant l'épistaxis) liées au traitement sont survenues chez 16/83 patients (19 %) sous malate de sunitinib et 3/82 patients (4 %) sous placebo.

On a observé des cas d'hémorragie tumorale liée au traitement chez des patients traités par malate de sunitinib. Ces complications peuvent être soudaines; dans les cas de tumeurs pulmonaires, elles peuvent prendre la forme d'une hémoptysie ou d'une hémorragie pulmonaire sévères et potentiellement mortelles. Deux sujets traités par malate de sunitinib au cours d'un

essai clinique sont morts d'une hémorragie pulmonaire; ils étaient atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique. L'examen histologique a révélé la présence de cellules épidermoïdes chez les 2 sujets. Malate de sunitinib n'est pas indiqué contre le cancer du poumon non à petites cellules. Une hémorragie tumorale de grade 3 ou 4 liée au traitement s'est produite chez 4 des 257 patients (environ 2 %) ayant une TSGI traitée par malate de sunitinib. On a différé l'administration de malate de sunitinib chez 1 des sujets ayant subi une hémorragie tumorale, mais il n'y a eu aucun cas d'arrêt du traitement pour cause d'hémorragie tumorale.

L'évaluation systématique de cette complication devrait inclure une série d'hémogrammes et un examen physique.

### **Troubles sanguins**

Des cas de baisse du nombre absolu de neutrophiles de grades 3 et 4 ont été signalés chez 13,1 % et 0,9 % des patients, respectivement. Au cours de l'essai déterminant (essai A) sur les TSGI, on a signalé 1 cas de neutropénie avec fièvre chez un sujet traité par malate de sunitinib. Un cas mortel de coagulation intravasculaire disséminée consécutive à une septicémie a également été rapporté. Des cas de baisse de la numération plaquettaire de grades 3 et 4 ont été signalés chez 4 % et 0,5 % des patients, respectivement. Dans l'ensemble, ces manifestations n'ont pas été cumulatives, elles se sont révélées réversibles et n'ont pas nécessité l'arrêt du traitement. De rares cas mortels de pneumonie et de septicémie, avec ou sans neutropénie, ont aussi été signalés. Il est recommandé de procéder à un hémogramme au début de chaque cycle de traitement par Eugia-Sunitinib. Les soins prodigués en cas de troubles sanguins peuvent inclure l'administration de facteurs de stimulation des colonies.

### **Fonction hépatique/biliaire/pancréatique**

Malate de sunitinib a été associé à une hépatotoxicité, laquelle peut entraîner une insuffisance hépatique ou la mort. Des cas d'insuffisance hépatique ont été recensés pendant les essais cliniques (< 1 %) et après la commercialisation du produit. Ce type d'insuffisance se manifeste notamment par un ictère, une hausse du taux de transaminases et/ou une hyperbilirubinémie en association avec une encéphalopathie, une coagulopathie et/ou une insuffisance rénale. Il convient de procéder à des épreuves de la fonction hépatique (alanine aminotransférase [ALAT], aspartate aminotransférase [ASAT] et bilirubine) avant l'instauration du traitement, pendant chaque cycle de traitement et au besoin, selon le tableau clinique. On doit interrompre l'administration d'Eugia-Sunitinib en cas de réaction hépatique indésirable d'origine médicamenteuse de grade 3 ou 4, et l'abandonner définitivement si le problème persiste. Ne pas réinstaurer le traitement par Eugia-Sunitinib si le patient présente subséquemment des modifications sévères de la fonction hépatique ou encore des signes et des symptômes d'insuffisance hépatique.

L'innocuité de malate de sunitinib n'a pas été établie chez les patients dont le taux d'ALAT ou d'ASAT était 2,5 fois plus élevé que la limite supérieure de la normale (LSN) en l'absence de métastases au foie et 5,0 fois plus élevé en présence de métastases.

On a signalé des cas de pancréatite lors des essais cliniques sur le sunitinib. Dans l'étude sur les TSGI, on a observé des hausses du taux de lipase sérique de grades 3 et 4 chez 20 sujets (10 %)

traités par malate de sunitinib, versus 7 témoins (7 %) sous placebo, et des hausses du taux d'amylase de grades 3 et 4 chez 10 sujets (5 %) traités par malate de sunitinib, versus 3 témoins (3 %) sous placebo. Dans les études sur l'ARM jamais traité, des élévations de grade 3 ou 4 des taux d'amylase et de lipase ont été décelées à des fréquences respectives de 6 % et de 18 % dans le groupe malate de sunitinib et de 3 % et de 7 % dans le groupe IFN- $\alpha$ . Dans les études sur l'ARM réfractaire aux cytokines, des augmentations de grade 3 ou 4 de l'amylase et de la lipase ont été observées chez 4,8 % et 16,9 %, respectivement, des patients traités par malate de sunitinib. Tant dans le traitement des TSGI que dans celui de l'ARM, les hausses de la lipase ont été transitoires et n'ont généralement pas été associées à des signes ni à des symptômes de pancréatite. Une insuffisance hépatique a été signalée chez moins de 1 % des patients traités par malate de sunitinib pour une tumeur solide. En présence de symptômes de pancréatite ou d'insuffisance hépatique, il faut cesser d'administrer Eugia-Sunitinib et prodiguer les soins qui s'imposent.

Des cas de cholécystite, y compris de cholécystite alithiasique et de cholécystite emphysémateuse, dont certains d'issue fatale, ont été signalés chez des patients traités par le malate de sunitinib.

### **Troubles du métabolisme et de l'alimentation**

#### **Syndrome de lyse tumorale**

Des cas de syndrome de lyse tumorale, dont certains mortels, ont été observés, quoique rarement, au cours des essais cliniques et ont été signalés dans le cadre du programme de pharmacovigilance chez des patients traités par malate de sunitinib. Les patients prédisposés au syndrome de lyse tumorale sont généralement ceux dont la charge tumorale est élevée avant le traitement. Ces patients doivent faire l'objet d'une étroite surveillance et être traités en fonction des besoins cliniques.

### **Système nerveux**

#### **Convulsions**

Malate de sunitinib n'a pas fait l'objet d'une évaluation chez les patients porteurs de métastases avérées au cerveau. Au cours des essais cliniques sur malate de sunitinib, on a observé des épisodes de convulsions chez < 1 % des sujets porteurs de métastases au cerveau objectivées par radiographie.

En outre, de rares cas (< 1 %) de convulsions associées à des signes radiologiques d'un syndrome réversible de leucoencéphalopathie postérieure ont été rapportés, dont certains à l'issue mortelle. Les sujets ayant des convulsions accompagnées de signes ou de symptômes compatibles avec ce syndrome, tels qu'hypertension, céphalée, baisse de la vigilance, altération des facultés mentales et perte de vision, y compris la cécité d'origine corticale, doivent recevoir les soins nécessaires, dont une médication pour maîtriser l'hypertension. Il est recommandé d'interrompre le traitement par Eugia-Sunitinib, puis de décider de l'utilité de le reprendre une fois le sujet rétabli; les preuves en faveur d'une reprise du traitement sont cependant très limitées.

### **Ostéonécrose de la mâchoire**

Des cas d'ostéonécrose de la mâchoire ont été rapportés chez les patients prenant du malate de sunitinib. Par conséquent, l'administration de malate de sunitinib pourrait constituer un facteur de risque additionnel d'ostéonécrose de la mâchoire. La majorité des cas se sont manifestés chez les patients ayant reçu un traitement intraveineux antérieur ou concomitant par des bisphosphonates, l'ostéonécrose de la mâchoire étant un risque associé à un tel traitement. Il faut donc se montrer prudent lorsqu'on décide de prescrire du malate de sunitinib et des bisphosphonates par voie intraveineuse de façon simultanée ou successive.

Les interventions dentaires invasives constituent également un facteur de risque d'ostéonécrose de la mâchoire. Avant d'amorcer un traitement par le malate de sunitinib, on doit faire passer un examen dentaire au patient et envisager de lui faire subir des soins dentaires préventifs au besoin. Chez les patients traités par le malate de sunitinib qui ont déjà reçu ou qui reçoivent un traitement intraveineux par des bisphosphonates, on doit, autant que possible, éviter toute intervention dentaire invasive.

### **Fonction rénale**

Des cas d'altération de la fonction rénale et/ou d'insuffisance rénale, parfois mortelles, ont été signalés.

Des cas de protéinurie et de syndrome néphrotique ont été rapportés. On recommande d'effectuer une analyse d'urine au début du traitement, et il faut suivre de près les patients en demeurant à l'affût de toute apparition ou aggravation d'une protéinurie. L'innocuité d'un traitement continu par le malate de sunitinib n'a pas été évaluée systématiquement chez les patients présentant une protéinurie modérée ou sévère. Il faut mettre fin à l'administration de malate de sunitinib chez les patients atteints d'un syndrome néphrotique.

### **Peau et annexes cutanées**

Un changement de coloration de la peau, qui serait attribuable à la couleur jaune du principe actif, est un effet indésirable fréquent qui s'observe chez environ 30 % des patients. Il faut informer les patients qu'une dépigmentation des cheveux ou de la peau peut également se produire durant le traitement par Eugia-Sunitinib. L'assèchement, l'épaississement ou le fendillement de la peau, la formation de vésicules ou des éruptions sporadiques sur la paume des mains et la plante des pieds sont d'autres effets cutanés possibles.

Les effets ci-dessus ne se sont pas révélés cumulatifs; en général, ils ont été réversibles, n'ont pas nécessité l'arrêt du traitement et peuvent être soulagés par des agents topiques.

De rares cas de fasciite nécrosante, notamment du périnée, parfois mortels, ont été signalés (*voir EFFETS INDÉSIRABLES*, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit). Chez les patients qui présentent une fasciite nécrosante, il faut interrompre l'administration d'Eugia-Sunitinib, puis amorcer rapidement un traitement approprié.

Des cas de pyodermite gangréneuse (*pyoderma gangrenosum*) ont été signalés (*voir EFFETS*

INDÉSIRABLES, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit).

Des réactions cutanées sévères, mais rares, ont été signalées, y compris des cas d'érythème polymorphe et de syndrome de Stevens-Johnson, ainsi que des cas évocateurs de l'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse. Dans certains cas, ces réactions ont menacé le pronostic vital ou causé la mort. En présence de signes ou de symptômes de l'une ou l'autre de ces réactions (p. ex., apparition progressive d'une éruption cutanée souvent accompagnée de cloques ou de lésions des muqueuses), il faut interrompre le traitement par Eugia-Sunitinib. Si un diagnostic de syndrome de Stevens-Johnson ou d'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse est confirmé, le traitement ne doit pas être repris. Certains patients chez qui l'on soupçonnait un érythème polymorphe ont bien toléré la reprise du traitement par malate de sunitinib à une dose plus faible après leur rétablissement. Il revient au médecin traitant de décider de reprendre ou non le traitement par Eugia-Sunitinib après la disparition d'un érythème polymorphe soupçonné, les données en faveur d'une reprise du traitement étant limitées.

### **Cicatrisation des plaies et chirurgie**

Aucune étude clinique officielle n'a évalué les effets de malate de sunitinib sur la cicatrisation des plaies. Cela dit, un ralentissement de la cicatrisation a été signalé chez des patients traités par malate de sunitinib. On recommande d'interrompre l'administration d'Eugia-Sunitinib chez les patients appelés à subir une intervention chirurgicale majeure. Comme l'expérience clinique est limitée en ce qui concerne le moment approprié pour réinstaurer le traitement, la décision de reprendre l'administration d'Eugia-Sunitinib devrait s'appuyer sur le jugement clinique, compte tenu de la période de convalescence nécessaire par suite de l'intervention.

### **Populations particulières**

#### ***Femmes enceintes :***

Aucune étude comparative rigoureuse n'a été menée pour évaluer l'emploi de malate de sunitinib chez la femme enceinte. Des études chez l'animal, comportant l'administration du médicament à répétition, ont mis en évidence divers effets sur les organes reproducteurs, une mortalité embryonnaire et des malformations congénitales par suite d'une exposition générale des femelles gravides inférieure à celle observée chez l'être humain à la dose recommandée (*voir TOXICOLOGIE, Toxicologie de la reproduction et tératologie*). Il ne faut pas administrer Eugia-Sunitinib aux femmes enceintes ni à celles qui n'emploient pas une méthode contraceptive efficace. Si le médicament est administré durant la grossesse ou que la patiente devient enceinte durant un traitement par ce médicament, il faut la prévenir des dangers possibles pour le fœtus (*voir TOXICOLOGIE, Toxicologie de la reproduction et tératologie*). Il faut avertir les femmes capables de procréer d'éviter de devenir enceintes durant un traitement par Eugia-Sunitinib.

#### ***Femmes qui allaitent :***

Le malate de sunitinib et/ou ses métabolites sont excrétés dans le lait chez les rates, mais on ne sait pas s'ils le sont chez l'humain. Puisque les médicaments passent souvent dans le lait maternel humain et que les nourrissons risquent d'avoir des réactions indésirables graves, il faut déconseiller aux femmes d'allaiter durant un traitement par Eugia-Sunitinib.

#### ***Contraception masculine :***



Les patients de sexe masculin qui n'ont pas été stérilisés doivent employer une méthode de contraception efficace durant le traitement par Eugia-Sunitinib, car le médicament peut se trouver dans les spermatozoïdes et affecter le développement embryofœtal chez la partenaire sexuelle fécondée pendant le traitement.

***Fécondité :***

Dans l'étude déterminante sur la fécondité des rats, on n'a observé aucun effet chez les mâles et les femelles. Toutefois, comme on a décelé des effets sur l'appareil reproducteur aussi bien des mâles que des femelles à l'issue d'autres études non cliniques, il se pourrait que malade de sunitinib ait des effets indésirables sur la fonction reproductrice et la fécondité dans un contexte clinique. L'innocuité de malade de sunitinib sur la fonction reproductrice n'a pas été évaluée chez l'être humain.

***Enfants :***

On n'a pas établi l'innocuité ni l'efficacité de malade de sunitinib chez l'enfant (*voir INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE et TOXICOLOGIE*). Cependant, on a observé des cas de dysplasie pharyngée chez des macaques cynomolgus dont les cartilages de conjugaison n'étaient pas calcifiés, après un traitement de 3 mois par le malade de sunitinib à des doses équivalant à environ 0,4 fois la dose recommandée chez l'humain (DRH) d'après l'exposition générale (ASC) au médicament. La dysplasie, dont l'incidence et la gravité étaient fonction de la dose, s'est révélée réversible avec l'arrêt du traitement.

***Insuffisance hépatique :***

Une dose unique de 50 mg de malade de sunitinib a été administrée à des patients atteints d'insuffisance hépatique légère (classe A de Child-Pugh) ou modérée (classe B de Child-Pugh) et à un groupe témoin ayant une fonction hépatique normale. D'après les paramètres pharmacocinétiques évalués, aucun réglage posologique ne semble nécessaire dans les cas d'insuffisance hépatique légère ou modérée. Malade de sunitinib n'a toutefois pas été étudié dans les cas d'insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh). En outre, l'emploi de doses multiples n'a pas été étudié en présence d'une atteinte hépatique.

***Insuffisance rénale :***

L'innocuité et l'efficacité de malade de sunitinib n'ont pas été établies chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère ni chez les hémodialysés souffrant de néphropathie au stade terminal. Ont été exclus des études de phase III les sujets dont la créatininémie dépassait 2,0 fois la LSN. Cela dit, dans une étude de phase I de faible envergure, l'exposition générale après l'administration d'une dose unique de 50 mg de malade de sunitinib était comparable chez 8 sujets atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min) et 8 sujets dont la fonction rénale était normale (clairance de la créatinine > 80 mL/min). Elle variait toutefois davantage chez les premiers. Bien que l'hémodialyse n'ait pas éliminé le malade de sunitinib et son principal métabolite chez les 8 sujets souffrant de néphropathie au stade terminal, l'exposition générale totale de ces derniers au malade de sunitinib et à son principal métabolite était néanmoins 47 % et 31 % inférieure à celle des 8 sujets exempts de dysfonctionnement rénal, en raison vraisemblablement d'une absorption réduite du malade de sunitinib imputable à la néphropathie.

D'après les données pharmacocinétiques tirées de l'étude de phase I, il n'est pas nécessaire de régler la dose initiale de malate de sunitinib en présence d'insuffisance rénale (d'intensité légère à sévère) ou de néphropathie au stade terminal nécessitant une hémodialyse. Les modifications subséquentes de la dose seront fonction de l'innocuité et de la tolérabilité (*voir POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION*, Modification de la dose ). Aucune étude n'a porté sur l'administration répétée de malate de sunitinib chez des insuffisants rénaux.

Des cas d'altération de la fonction rénale et d'insuffisance rénale, parfois mortelles, ont été signalés lors de l'emploi de malate de sunitinib. La prudence et une surveillance attentive s'imposent pendant le traitement par Eugia-Sunitinib chez les patients souffrant d'insuffisance rénale sévère et les hémodialysés atteints de néphropathie terminale.

### **Surveillance et épreuves de laboratoire**

Un hémogramme et une analyse de la chimie sanguine (y compris un bilan hépatique et la mesure de la créatininémie, des taux d'électrolytes, de la magnésémie, de la calcémie, de la phosphatémie, de l'amylasémie et de la lipasémie) sont recommandés au début de chaque cycle de traitement par Eugia-Sunitinib. L'équilibre électrolytique doit être promptement rétabli en cas d'anomalie.

On recommande une évaluation initiale de la fonction thyroïdienne en laboratoire chez tous les patients. Avant la mise en route du traitement par Eugia-Sunitinib, l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie doit être prise en charge conformément aux pratiques médicales standard. Durant le traitement par Eugia-Sunitinib, il faut évaluer la fonction thyroïdienne tous les 3 mois. De plus, il faut surveiller de près les patients afin de déceler les signes et symptômes d'un dysfonctionnement thyroïdien pendant le traitement, et les patients qui présentent des signes ou des symptômes évocateurs d'un dysfonctionnement thyroïdien doivent être soumis à des examens de laboratoire permettant d'évaluer la fonction thyroïdienne et recevoir, s'il y a lieu, les soins standard qui s'imposent.

Des cas de protéinurie et de rares cas de syndrome néphrotique ont été rapportés. On recommande d'effectuer une analyse d'urine au début du traitement, et il faut suivre de près les patients en demeurant à l'affût de toute apparition ou aggravation d'une protéinurie.

Un électrocardiogramme de référence doit être réalisé avant le début du traitement par Eugia-Sunitinib; par la suite, cet examen doit être répété périodiquement en cours de traitement. En général, on ne doit pas prescrire Eugia-Sunitinib aux patients qui, au départ, présentent des intervalles QT ou QTc anormalement longs ou qui ont un bloc auriculoventriculaire. En présence de symptômes évoquant une arythmie ou si l'intervalle QT ou QTc s'allonge nettement durant le traitement par Eugia-Sunitinib, la prise du médicament doit être interrompue.

Il est recommandé de vérifier régulièrement la glycémie chez tous les patients. Dans le cas de ceux recevant des antidiabétiques, il est possible que la dose doive être ajustée pour réduire au minimum le risque d'hypoglycémie.

## EFFETS INDÉSIRABLES

### Aperçu

Les données présentées ci-après rendent compte de l'exposition à malate de sunitinib de 660 patients ayant pris part à un essai comparatif avec placebo (n = 202) sur le traitement des TSGI, à un essai avec agent de comparaison actif (n = 375) sur le traitement de l'ARM ou à un essai comparatif avec placebo (n = 83) sur le traitement des tumeurs neuroendocrines pancréatiques. Dans les essais sur le traitement des TSGI et de l'ARM, les patients ont reçu une dose initiale de 50 mg/jour par voie orale, selon un schéma 4/2 échelonné sur plusieurs cycles, et dans l'essai sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques, les patients ont reçu une dose initiale de 37,5 mg/jour par voie orale sans congé thérapeutique. La plupart des effets indésirables sont réversibles et ne nécessitent pas l'arrêt du traitement. Au besoin, ils peuvent être corrigés par un réglage posologique ou une interruption du traitement.

Les effets indésirables liés au traitement les plus fréquents ( $\geq 20\%$ ) chez les patients ayant une TSGI, un ARM ou une tumeur neuroendocrine pancréatique ont été les suivants : fatigue, asthénie, diarrhée, nausées, mucosite/stomatite, vomissements, dyspepsie, douleur abdominale, constipation, hypertension, éruption, syndrome mains-pieds, changement de coloration de la peau, sécheresse cutanée, changement de la couleur des cheveux, altération du goût, anorexie et saignement. Les effets indésirables potentiellement graves tels que le dysfonctionnement ventriculaire gauche, la prolongation de l'intervalle QT, les hémorragies, l'hypertension, le dysfonctionnement thyroïdien et les effets sur la fonction surrénale sont présentés dans la section **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**. D'autres effets indésirables signalés au cours des études portant sur les TSGI, l'ARM et les tumeurs neuroendocrines pancréatiques sont décrits ci-après.

Puisque les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières, les taux des effets indésirables qui sont observés peuvent ne pas refléter les taux observés en pratique et ne doivent pas être comparés aux taux observés dans le cadre des essais cliniques portant sur un autre médicament.

### **Effets indésirables observés durant l'essai comparatif avec placebo sur les TSGI (essai A)**

Au moment de l'analyse provisoire, la durée médiane du traitement a été de 2 cycles chez les sujets traités par malate de sunitinib (moyenne : 3; valeurs extrêmes : 0 et 9) et de 1 cycle chez les témoins ayant reçu un placebo (moyenne : 1,6; valeurs extrêmes : 0 et 6). On a réduit la dose chez 23 sujets (11 %) du groupe malate de sunitinib, mais aucun sujet du groupe placebo. On a interrompu le traitement chez 57 sujets (28 %) du groupe malate de sunitinib et 20 sujets (20 %) du groupe placebo. Le taux d'arrêts permanents pour cause d'effets indésirables non mortels associés au traitement a été de 9 % (19/202) avec malate de sunitinib vs 8 % (8/102) avec le placebo.

La plupart des effets indésirables liés au traitement étaient de grade 1 ou 2 dans les 2 groupes. Des effets indésirables de grade 3 ou 4 liés au traitement ont été signalés chez 48 % des sujets recevant malate de sunitinib et 29 % des témoins sous placebo, au cours de la phase de traitement

à double insu. De tous les effets indésirables liés au traitement et ayant atteint le degré maximal de gravité, la fatigue a été le plus fréquent; elle a été signalée par 42 % des sujets recevant malate de sunitinib et 36 % des témoins sous placebo. Les cas de diarrhée, de nausées, de stomatite, de dysgueusie, d'anomalies cutanées, d'hypertension et d'hémorragie ont tous été plus fréquents chez les sujets recevant malate de sunitinib que chez les témoins sous placebo. Durant l'essai A, 9 sujets (4,5 %) ayant reçu du malate de sunitinib et 1 sujet (1 %) du groupe placebo ont présenté une alopécie. Tous les effets étaient de grade 1 selon l'échelle de gravité NCI CTC. On a observé un changement de la couleur des cheveux chez 14 sujets (6,9 %) du groupe malate de sunitinib, et 2 témoins (2 %) du groupe placebo. Le tableau 1 énumère les effets indésirables fréquents, apparus durant le traitement ( $\geq 10$  % des sujets) durant l'essai A.

**Tableau 1 : Effets indésirables apparus durant le traitement chez au moins 10 % des sujets atteints d'une TSGI et ayant reçu malate de sunitinib ou un placebo durant la phase de traitement à double insu de l'essai A**

	Tumeur stromale gastro-intestinale (TSGI)			
	malate de sunitinib	(N = 202)	Placebo (N = 102)	
Effet indésirable, n (%)	Tous les grades	Grades 3/4	Tous les grades	Grades 3/4
<b>Tous</b>	<b>190 (94)</b>	<b>97 (48)</b>	<b>99 (97)</b>	<b>30 (29)</b>
<b>Troubles sanguins et lymphatiques</b>	60 (30)	34 (17)	9 (9)	3 (3)
Anémie SAP	39 (19)	16 (8)	7 (7)	2 (2)
<b>Troubles digestifs</b>	171 (85)	40 (20)	75 (74)	19 (19)
Diarrhée SAP	82 (41)	9 (5)	21 (21)	0 (0)
Nausées	66 (33)	2 (1)	23 (23)	3 (3)
Douleurs abdominales SAP	61 (30)	12 (6)	28 (29)	10 (10)
Vomissements SAP	50 (25)	3 (2)	18 (18)	3 (3)
Constipation	43 (21)	0 (0)	16 (16)	2 (2)
Stomatite	33 (16)	1 (1)	2 (2)	0 (0)
Dyspepsie	30 (15)	1 (1)	6 (6)	0 (0)
Douleur épigastrique	22 (11)	3 (2)	8 (8)	0 (0)
<b>Troubles du métabolisme et de l'alimentation</b>	81 (40)	15 (8)	26 (26)	1 (1)
Anorexie	62 (31)	1 (1)	19 (19)	1 (1)
<b>Atteintes des tissus ostéomusculaire ou conjonctif</b>	90 (45)	11 (5)	35 (34)	5 (5)
Arthralgie	24 (12)	2 (1)	10 (10)	0 (0)
Dorsalgie	21 (10)	1 (1)	13 (13)	3 (3)
<b>Troubles généraux et atteintes au point d'administration</b>	147 (73)	27 (13)	65 (64)	7 (7)
Fatigue	84 (42)	15 (7)	37 (36)	4 (4)
Asthénie	44 (22)	10 (5)	10 (10)	2 (2)
Pyrexie	32 (16)	2 (1)	9 (9)	1(1)

Inflammation des muqueuses SAP	30 (15)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
<b>Troubles du système nerveux</b>	89 (44)	8 (4)	29 (28)	3 (3)
Dysgueusie	40 (20)	0 (0)	2 (2)	0 (0)
Céphalées	38 (19)	2 (1)	17 (17)	0 (0)
<b>Troubles mentaux</b>	36 (18)	1 (1)	15 (15)	1 (1)
Insomnie	24 (12)	0 (0)	10 (10)	1 (1)
<b>Atteintes cutanées ou sous-cutanées</b>	125 (62)	12 (6)	31 (30)	0 (0)
Changement de coloration de la peau	52 (26)	0 (0)	8 (8)	0 (0)
Éruption SAP	30 (15)	2 (1)	6 (6)	0 (0)
EPP	28 (14)	9 (5)	2 (2)	0 (0)
<b>Troubles vasculaires</b>	50 (25)	17 (8)	12 (12)	0 (0)
Hypertension SAP	28 (14)	8 (4)	— 7(2) —	0 (0)

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), version 3.0. EPP : Érythrodysesthésie palmo-plantaire ou syndrome mains-pieds SAP : sans autres précisions

Le tableau 2 décrit les anomalies de laboratoire courantes ( $\geq 10\%$ ) apparues pendant le traitement.

**Tableau 2 : Anomalies des résultats d'analyse apparues durant le traitement chez  $\geq 10\%$  des sujets atteints d'une TSGI et ayant reçu malate de sunitinib ou un placebo durant la phase de traitement à double insu de l'essai A**

Effet indésirable, n (%)	malate de sunitinib (N = 202)		Placebo (N = 102)	
	Tous les grades	Grades 3/4 <sup>a</sup>	Tous les grades	Grades 3/4 <sup>b</sup>
<b>Tous</b>		68 (34)		22 (22)
<b>Appareil digestif</b>				
ASAT/ALAT	78 (39)		23 (23)	
Phosphatase alcaline	48 (24)		21 (21)	
Bilirubine totale	32 (16)	3 (2)	8 (8)	
Bilirubine - méthode indirecte	20 (10)	7 (4)	4 (4)	1 (1) 4 (4) 0
Amylase	35 (17)	2 (1) 0 (0) 10	12 (12)	(0) 0 (0) 3 (3)
Lipase	50 (25)	(5) 20 (10)	17 (17)	7 (7)
<b>Système cardiovasculaire</b>				
Baisse de la FEVG	22 (11)	2 (1)	3 (3)	0 (0)
<b>Fonction rénale / métabolique</b>	25 (12)		7 (7)	
Créatinine	24 (12)		4 (4)	0 (0) 0
Hypokaliémie Hypernatrémie Acide urique	20 (10)	1 (1) 1 (1) 0	4 (4)	(0) 1 (1)
	31 (15)	(0) 16 (8)	16 (16)	8 (8)
<b>Hématologie</b>	107 (53)			
Neutropénie	76 (38)	20 (10) 0 (0)	4 (4) 16	0 (0)
Lymphopénie Anémie Thrombopénie	52 (26)	6 (3)	(16) 22 (22)	0 (0)
	76 (38)	10 (5)	4 (4)	2 (2) 0 (0)

*\*Common Terminology Criteria for Adverse Events (CT CAE), version 3.0.*

- a. Effets de grade 4 chez les sujets traités par malate de sunitinib : taux de phosphatase alcaline (1 %), lipasémie (2 %), créatininémie (1 %), hypokaliémie (1 %), neutropénie (2 %), anémie (2 %) et thrombopénie (1 %).
- b. Effets de grade 4 chez les témoins ayant reçu un placebo : amylasémie (1 %), lipasémie (1 %), anémie (2 %) et thrombopénie (1 %).

Des anomalies des résultats d'analyse de grade 3 ou 4 sont apparues durant le traitement chez 68 sujets (34 %) ayant reçu malate de sunitinib et 22 témoins (22 %) ayant reçu un placebo. Les hausses des résultats du bilan hépatique, du taux d'enzymes pancréatiques et de la créatininémie ont été plus fréquentes chez les sujets du groupe malate de sunitinib que chez ceux du groupe placebo, de même que la baisse de la FEVG, l'aplasie médullaire et les anomalies électrolytiques. On a décelé une hypothyroïdie apparue durant le traitement chez 4 % des sujets sous malate de sunitinib et 1 % des témoins sous placebo.

Après l'obtention de résultats positifs lors de l'analyse provisoire, l'insu a été levé et on a offert aux patients sous placebo de poursuivre sans insu en recevant malate de sunitinib [voir **ESSAIS CLINIQUES**]. Chez 241 patients affectés au hasard au groupe malate de sunitinib, dont 139 qui ont reçu malate de sunitinib au cours des deux phases (à double insu et sans insu), la médiane de la durée du traitement par malate de sunitinib a été de 6 cycles (moyenne : 8,5; valeurs extrêmes : 1 et 44). Pour les 255 patients qui ont finalement reçu malate de sunitinib sans insu, la médiane de la durée du traitement à partir du moment où l'insu a été levé a été de 6 cycles (moyenne : 7,8; valeurs extrêmes : 1 et 37). Au cours de la phase sans insu, on a interrompu la médication chez 118 patients (46 %), et réduit la dose chez 72 patients (28 %). La fréquence des effets indésirables survenus pendant le traitement et ayant conduit à l'abandon définitif de celui-ci s'est établie à 20 %. Les plus fréquents effets indésirables de grades 3 et 4 liés au traitement par malate de sunitinib durant la phase sans insu ont été : neutropénie (11 %), fatigue (10 %), hypertension (8 %), asthénie (5 %), diarrhée (5 %), syndrome mains-pieds (5 %), nausées (4 %), douleurs abdominales (3 %), anorexie (3 %), mucosite (2 %), vomissements (2 %) et hypothyroïdie (2 %).

### **Effets indésirables observés chez les patients atteints d'un ARM**

#### ***Patients n'ayant jamais été traités pour un ARM***

Dans l'étude de phase III sur l'ARM, la population traitée retenue pour l'analyse provisoire de l'innocuité comptait 735 patients, dont 375 avaient été affectés au hasard à malate de sunitinib et 360, à l'IFN- $\alpha$ . La durée médiane du traitement a été de 11,1 mois (valeurs extrêmes : 0,4 et 46,1) dans le groupe malate de sunitinib et de 4,1 mois (valeurs extrêmes : 0,1 et 45,6) dans le groupe IFN- $\alpha$ . Le traitement a été interrompu chez 202 patients (54 %) du groupe malate de sunitinib et 141 patients (39 %) du groupe IFN- $\alpha$ . Les doses ont été réduites chez 194 patients (52 %) du groupe malate de sunitinib et 98 patients (27 %) du groupe IFN- $\alpha$ . Les taux d'abandons dus à des effets indésirables ont été de 20 % et de 23 % dans les groupes malate de sunitinib et IFN- $\alpha$ . La plupart des effets indésirables liés au traitement ont été de grade 1 ou 2 dans les 2 groupes. Des effets indésirables de grade 3 ou 4 liés au traitement ont été signalés chez 69 % et 38 % des patients sous malate de sunitinib et sous IFN- $\alpha$ , respectivement. Les principaux effets indésirables, tous grades confondus, associés à malate de sunitinib sont la fatigue, la diarrhée, les nausées, la

stomatite, l'hypertension, le syndrome mains -pieds et une baisse de la fraction d'éjection. Le tableau 3 contient une liste comparative des effets indésirables liés au traitement signalés couramment ( $\geq 10\%$ ) par les patients recevant malate de sunitinib ou l'IFN- $\alpha$ .

**Tableau 3 : Effets indésirables liés au traitement signalés chez au moins 10 % des sujets ayant reçu malate de sunitinib ou l'IFN- $\alpha$  pour un ARM jamais traité**

Effet indésirable, n (%)	malate de sunitinib N = 375)		IFN- $\alpha$ (N = 360)	
	Tous grades confondus n (%)	Grades 3/4 n (%)	Tous grades confondus n (%)	Grade 3/4 n (%)
<b>Tous</b>	<b>358 (95,5 %)</b>	<b>258 (68,8 %)</b>	<b>331 (91,9 %)</b>	<b>139 (38,6 %)</b>
<b>Troubles sanguins et lymphatiques</b>				
Thrombopénie	69 (18,4 %)	33 (8,8 %)	11 (3,1 %)	2 (0,6 %)
Neutropénie	70 (18,7 %)	40 (10,7 %)	31 (8,6 %)	12 (3,3 %) 7 (1,9 %)
Anémie	51 (13,6 %)	19 (5,1 %)	31 (8,6 %)	3 (0,8 %)
Leucopénie	40 (10,7 %)	12 (3,2 %)	14 (3,9 %)	
<b>Troubles du métabolisme et de l'alimentation</b>				
Anorexie	129 (34,4 %)	7 (1,9 %)	101 (28,1 %)	6 (1,7 %) 0 (0 %)
Perte d'appétit	37 (9,9 %)	1 (0,3 %)	38 (10,6 %)	
<b>Troubles du système nerveux</b>				
Dysgueusie	175 (46,7 %)	1 (0,3 %)	52 (13,9 %)	0 (0 %)
Céphalées	53 (14,1 %)	2 (0,5 %)	55 (15,3 %)	0 (0 %)
<b>Troubles vasculaires</b>				
Hypertension	113 (30,1 %)	46 (12,3 %)	6 (1,7 %)	1 (0,3 %)
<b>Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux</b>				
Épistaxis	67 (17,9 %)	3 (0,8 %)	5 (1,4 %)	0 (0 %)
<b>Troubles digestifs</b>				
Diarrhée	229 (61,1 %)	33 (8,8 %)	49 (13,6 %)	1 (0,3 %)
Nausées	195 (52,0 %)	17 (4,5 %)	124 (34,4 %)	4 (1,1 %)
Dyspepsie	118 (31,5 %)	7 (1,9 %)	13 (3,6 %)	0 (0 %)
Stomatite	110 (29,3 %)	5 (1,3 %)	10 (2,8 %)	1 (0,3 %)
Vomissements	117 (31,2 %)	14 (3,7 %)	41 (11,4 %)	2 (0,6 %)
Douleurs abdominales*	70 (18,7 %)	7 (1,9 %)	15 (4,2 %)	0 (0 %)
Sécheresse buccale	45 (12,0 %)	0 (0 %)	24 (6,7 %)	1 (0,3 %)
Constipation	44 (11,7 %)	1 (0,3 %)	14 (3,9 %)	0 (0,0 %)
Flatulence	43 (11,5 %)	0 (0,0 %)	6 (1,6 %)	0 (0,0 %)

<b>Atteintes cutanées ou sous-cutanées</b>				
Éruptions cutanées**				
Érythrodysesthésie palmo-plantaire ou syndrome mains -pieds	115 (30,7 %)	4 (1,1 %)	33 (9,2 %)	3 (0,8 %)
Sécheresse cutanée	108 (30,0 %)	32 (8,5 %)	2 (0,6 %)	0 (0 %)
Changement de coloration de la peau	79 (21,1 %)	1 (0,3 %)	19 (5,3 %)	0 (0 %)
Changement de la couleur des cheveux	89 (23,7 %)	1 (0,3 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Érythème	75 (20,0 %)	0 (0 %)	1 (0,3 %)	0 (0 %)
	39 (10,4 %)	2 (0,5 %)	3 (0,8 %)	0 (0,0 %)
<b>Atteintes des tissus ostéomusculaire ou conjonctif</b>				
Douleur aux extrémités	66 (17,6 %)	5 (1,3 %)	11 (3,1 %)	0 (0 %)
Arthralgie	43 (11,5 %)	1 (0,3 %)	49 (13,6 %)	0 (0 %)
Myalgie	32 (8,5 %)	1 (0,3 %)	60 (16,7 %)	2 (0,6 %)
<b>Troubles généraux et atteintes au point d'administration</b>				
Fatigue	206 (54,9 %)	43 (11,5 %)	186 (51,7 %)	48 (13,3 %)
Inflammation des muqueuses	98 (26,1 %)	7 (1,9 %)	6 (1,7 %)	1 (0,3 %)
Asthénie	76 (20,3 %)	28 (7,5 %)	67 (18,6 %)	14 (3,9 %)
Pyrexie	31 (8,3 %)	3 (0,8 %)	125 (34,7 %)	1 (0,3 %)
Frissons	28 (7,5 %)	2 (0,5 %)	105 (29,2 %)	0 (0 %)
<b>Résultats d'examen</b>				
Baisse de la fraction d'éjection	51 (13,6 %)	10 (2,7 %)	11 (3,1 %)	3 (0,8 %)
Perte pondérale	46 (12,3 %)	1 (0,3 %)	50 (13,9 %)	1 (0,3 %)

\* Les termes suivants ont été combinés : *douleur abdominale et douleur épigastrique*.

\*\* Les termes suivants ont été combinés : *éruption cutanée, éruption érythémateuse, éruption exfoliative, éruption folliculaire, éruption maculaire, éruption papulaire, éruption pruritique, éruption maculopapulaire, éruption psoriasiforme et éruption généralisée*.

Durant l'étude sur l'ARM jamais traité, des anomalies de grade 4 aux épreuves de laboratoire ont été décelées chez 75 patients (20 %) du groupe malade de sunitinib et 37 (10 %) du groupe IFN- $\alpha$ , les plus fréquentes étant une hyperuricémie (malade de sunitinib : 14 %; IFN- $\alpha$  : 8 %) et une élévation de la lipasémie (malade de sunitinib : 3 %; IFN- $\alpha$  : 1 %). Les principales anomalies de grade 3 observées dans les 2 groupes ont été une élévation de la lipasémie (malade de sunitinib : 15 %; IFN- $\alpha$  : 7 %) et une hypophosphatémie (malade de sunitinib : 6 %; IFN- $\alpha$  : 6 %); dans le groupe malade de sunitinib uniquement : une hyponatrémie (8 %) et une élévation de l'amylasémie (5 %); et dans le groupe IFN- $\alpha$  : une hyperglycémie (6 %). Le tableau 4 décrit les anomalies hématologiques relevées chez les patients atteints d'un ARM jamais traité.

Pendant l'étude de phase III sur l'ARM, les anomalies hématologiques de grade 4 ont été la neutropénie (malade de sunitinib : 2 %; IFN- $\alpha$  : 1 %) et l'anémie (malade de sunitinib : 2 %; IFN- $\alpha$  : < 1 %). Les anomalies hématologiques de grade 3 ont été la neutropénie (malade de sunitinib : 15 %; IFN- $\alpha$  : 8 %), la lymphopénie (malade de sunitinib : 16 %; IFN- $\alpha$  : 24 %), la thrombopénie (malade de sunitinib : 8 %; IFN- $\alpha$  : 1 %), la leucopénie (malade de sunitinib : 8 %; IFN- $\alpha$  : 2 %) et l'anémie



(malade de sunitinib : 6 %; IFN- $\alpha$  : 5 %).

**Tableau 4. Anomalies des résultats de laboratoire apparues durant le traitement chez au moins 10 % des patients ayant reçu malade de sunitinib ou l'IFN- $\alpha$  pour un ARM jamais traité**

Analyse de laboratoire n (%)	ARM jamais traité			
	malade de sunitinib (N = 375)		IFN- $\alpha$ (N = 360)	
	Tous les grades*	Grades 3/4 <sup>a</sup>	Tous les grades*	Grades 3/4 <sup>a,b</sup>
<b>Appareil digestif</b>				
ASAT	211 (56)	6 (2)	136 (38)	8 (2)
ALAT	192 (51)	10 (3)	144 (40)	9 (2)
Lipase	211 (56)	69 (18)	165 (46)	29 (8)
Phosphatase alcaline	171 (46)	7 (2)	132 (37)	6 (2)
Amylase	130 (35)	22 (6)	114 (32)	12 (3)
Bilirubine totale	75 (20)	3 (1)	8 (2)	0 (0)
Bilirubine - méthode indirecte	49 (13)	4 (1)	3 (1)	0 (0)
<b>Fonction rénale / Métabolisme</b>				
Créatinine				
Créatine kinase	262 (70)	2 (< 1)	183 (51)	1 (< 1)
Acide urique	183 (49)	9 (2)	40 (11)	4 (1)
Calcium - baisse	173 (46)	54 (14)	119 (33)	29 (8)
Phosphore	156 (42)	4 (1)	145 (40)	4 (1)
Albumine	116 (31)	22 (6)	87 (24)	23 (6)
Glucose - hausse	106 (28)	4 (1)	72 (20)	0 (0)
Sodium - baisse	86 (23)	21 (6)	55 (15)	22 (6)
Glucose - baisse	75 (20)	31 (8)	55 (15)	13 (4)
Potassium - hausse	65 (17)	0 (0)	43 (12)	1 (< 1)
Calcium - hausse	61 (16)	13 (3)	61 (17)	15 (4)
Potassium - baisse	50 (13)	2 (< 1)	35 (10)	5 (1)
Sodium - hausse	49 (13)		7 (2)	
	48 (13)	3 (1) 0 (0)	38 (10)	1 (< 1) 0 (0)
<b>Hématologie</b>				
Neutrophiles	289 (77)	65 (17)	178 (49)	31 (9)
Hémoglobine	298 (79)	29 (8)	250 (69)	18 (5)
Plaquettes	255 (68)	35 (9)	85 (24)	2 (1)
Lymphocytes	256 (68)	66 (18)	245 (68)	93 (26)
Leucocytes	293 (78)	29 (8)	202 (56)	8 (2)

\* *Common Terminology Criteria for Adverse Events (CT CAE), Version 3.0*

<sup>a</sup> Anomalies de grade 4 chez les patients sous malade de sunitinib : acide urique (14 %), lipase (3 %), neutrophiles (2 %), lymphocytes (2 %), hémoglobine (2 %), plaquettes (1 %), amylase (1 %), ALAT (< 1 %), créatine kinase (< 1 %), créatinine (< 1 %), glucose - hausse (< 1 %), calcium - baisse (< 1 %), phosphore (< 1 %), potassium - hausse (< 1 %) et sodium - baisse (< 1 %).

<sup>b</sup> Anomalies de grade 4 chez les patients sous IFN- $\alpha$  : acide urique (8 %), lymphocytes (2 %), lipase (1 %), neutrophiles (1 %), amylase (< 1 %), calcium - hausse (< 1 %), glucose - baisse (< 1 %), potassium - hausse (< 1 %) et hémoglobine (< 1 %).

### **Adénocarcinome rénal métastatique (ARM) réfractaire aux cytokines**

Les données ci-dessous portent sur 169 patients atteints d'un ARM réfractaire aux cytokines ayant été exposés à malate de sunitinib au cours des études 1 et 2. La durée médiane du traitement a été de 5,5 mois (valeurs extrêmes : 23 jours et 11,2 mois) dans l'étude 1 et de 7,9 mois (valeurs extrêmes : 6 jours et 1,3 an) dans l'étude 2. Des interruptions de traitement ont eu lieu chez 48 patients (45 %) de l'étude 1 et 45 patients (71 %) de l'étude 2; une réduction de la dose a été effectuée à une ou plusieurs reprises chez 23 patients (22 %) de l'étude 1 et 22 patients (35 %) de l'étude 2. La participation à l'étude a été interrompue de façon permanente en raison d'effets indésirables liés au traitement chez 7 patients (8 %) de l'étude 1 et 6 patients (10 %) de l'étude 2. Les effets indésirables liés au traitement chez au moins 10 % des patients atteints d'un ARM sont présentés dans le tableau 5, d'après le degré maximal de gravité atteint. Presque tous ces patients ont éprouvé des effets indésirables liés au traitement. Les effets les plus fréquents (signalés chez au moins 20 % des patients) ont été les suivants : fatigue; troubles digestifs tels que nausées, diarrhée, stomatite, dyspepsie, vomissements et constipation; dysgueusie; changement de coloration de la peau; anorexie; et éruption cutanée. La fréquence relative des effets indésirables les plus courants sans égard à la cause était semblable à celle des effets indésirables liés au traitement.

**Tableau 5 : Effets indésirables liés au traitement signalés chez au moins 10 % des patients traités par malate de sunitinib dans les 2 études sur l'ARM réfractaire aux cytokines**

Effet indésirable	Tous grades n (%)	Grade 3/4 n (%)
<b>Tous les effets indésirables liés au traitement signalés chez <math>\geq</math> 10 % des patients</b>	<b>166 (98,2)</b>	<b>91 (53,9)</b>
<b>Troubles sanguins et lymphatiques</b>	<b>57 (33,7)</b>	<b>30 (15,8)</b>
Anémie	21 (12,4)	6(3,6)
Leucopénie	24 (14,2)	10 (5,9)
Neutropénie	24 (14,2)	14 (8,3)
Thrombopénie	23 (13,6)	11 (6,5)
<b>Troubles oculaires</b>	<b>17 (10,1)</b>	<b>0 (0,0)</b>
<b>Troubles digestifs</b>	<b>156 (92,3)</b>	<b>15 (8,9)</b>
Constipation	34 (20,1)	0(0,0)
Diarrhée	83 (49,1)	5(3,0)
Dyspepsie	69 (40,8)	1 (0,6)
Glossodynie	25 (14,8)	0(0,0)
Nausées	84 (49,7)	2(1,2)
Stomatite	70 (41,4)	6(3,6)
Vomissements	52 (30,8)	2(1,2)
<b>Troubles généraux et atteintes au point d'administration</b>	<b>118 (69,8)</b>	<b>19 (11,2)</b>
Fatigue	102 (60,4)	18 (10,7)

Effet indésirable	Tous grades n (%)	Grade 3/4 n (%)
Inflammation des muqueuses	30 (17,8)	1 (0,6)
Infections et infestations	21 (12,4)	4 (2,4)
<b>Résultats d'examen*</b>	<b>65 (38,5)</b>	<b>31 (20,1)</b>
Baisse de la fraction d'éjection	24 (14,2)	4 (2,4)
Augmentation de la lipasémie	17 (10,1)	15(8,9)
<b>Troubles du métabolisme et de l'alimentation</b>	<b>68 (40,2)</b>	<b>9 (5,3)</b>
Anorexie	47 (27,8)	1 (0,6)
<b>Atteintes des tissus ostéomusculaire ou conjonctif</b>	<b>45 (26,6)</b>	<b>3 (1,8)</b>
Douleur aux extrémités	21 (12,4)	1 (0,6)
<b>Troubles du système nerveux</b>	<b>101 (59,8)</b>	<b>6 (3,6)</b>
Dysgueusie	71 (42,0)	0(0,0)
Céphalées	25 (14,8)	1 (0,6)
<b>Troubles mentaux</b>	<b>17 (10,1)</b>	<b>2 (1,2)</b>
<b>Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux</b>	<b>40 (23,7)</b>	<b>3 (1,8)</b>
<b>Atteintes cutanées ou sous-cutanées</b>	<b>122 (72,2)</b>	<b>12 (7,1)</b>
Sécheresse cutanée	22 (13,0)	0(0,0)
Érythème	20 (11,8)	0(0,0)
Changement de la couleur des cheveux	24 (14,2)	0(0,0)
EPP	21 (12,4)	6(3,6)
Éruption	44 (26,0)	1 (0,6)
Changement de coloration de la peau	54 (32,0)	0(0,0)
<b>Troubles vasculaires</b>	<b>40 (23,7)</b>	<b>1 1 (6,5)</b>
Hypertension	28 (16,6)	7(4,1)

Degrés de gravité attribués conformément au *Common Terminology Criteria for Adverse Events* (CTCAE), version 3.0

\* Un patient (0,6 %) était manquant.

Abréviations : n = nombre de sujets; EPP = érythrodysesthésie palmo-plantaire ou syndrome mains-pieds

Les anomalies des résultats d'analyse apparues durant le traitement chez au moins 10 % des sujets atteints d'un ARM sont présentées dans le tableau 6, d'après le degré maximal de gravité atteint. Les anomalies hématologiques relevées parmi les sujets atteints d'un ARM étaient comparables à celles qui ont été observées chez l'ensemble des sujets atteints d'une tumeur solide.

**Tableau 6. Anomalies des résultats d'analyse relevées après le début du traitement chez au moins 10 % chez des sujets atteints d'un ARM réfractaire aux cytokines (population traitée)**

	Total 50 mg, 1 f.p.j., schéma 4/2 (N = 169)	
	Grade 1-4 n (%)	Grade 3/4 n (%)
<b>Analyse de laboratoire</b>		

<b>Tous</b>		105 (62,1 %)
<b>Appareil digestif</b>		
Albumine (hypoalbuminémie)	47 (27,8)	0 (0,0)
Phosphatase alcaline	93 (55,0)	3(1,8)
Amylase	47 (27,8)	8 (4,7)
ASAT/ALAT	97 (57,4)	6(3,6)
Lipase	84 (49,7)	28 (16,6)
Bilirubine totale	20 (11,8)	1 (0,6)
<b>Fonction rénale / Métabolisme</b>		
Calcium (hypercalcémie)	19 (11,2)	1 (0,6)
Calcium (hypocalcémie)	72 (42,6)	1 (0,6)
Créatine-kinase	65 (38,5)	2(1,2)
Créatinine	100 (59,2)	2(1,2)
Glucose (hyperglycémie)	30 (17,8)	6(3,6)
Glucose (hypoglycémie)	34 (20,1)	0 (0,0)
Hypophosphatémie	37 (21,9)	15 (8,9)
Potassium (hyperkaliémie)	23 (13,6)	7(4,1)
Sodium (hypernatrémie)	22 (13,0)	1 (0,6)
Sodium (hyponatrémie)	17 (10,1)	6(3,6)
Acide urique	83 (49,1)	25 (14,8)
<b>Hématologie</b>		
Anémie	125 (74,0)	12(7,1)
Neutropénie	116 (68,6)	22 (13,0)
Lymphopénie	99 (58,6)	33 (19,5)
Thrombopénie	99 (58,6)	5 (3,0)

Degrés de gravité attribués conformément au *Common Terminology Criteria for Adverse Events* (CT CAE), version 3.0; il n'existe pas de critères de gravité pour toutes les analyses effectuées dans le cadre de l'étude; au besoin, on a résumé les résultats d'un patient une seule fois pour chaque analyse en utilisant le degré maximal observé après le début du traitement.

Abréviations : n = nombre de sujets; N = nombre total de sujets.

### **Effets indésirables observés dans l'essai de phase III sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques**

La médiane du nombre de jours de traitement a été de 139 (valeurs extrêmes : 13-532 jours) dans le groupe malade de sunitinib et de 113 (valeurs extrêmes : 1-614 jours) dans le groupe placebo. Dix-neuf patients (23 %) du groupe malade de sunitinib et 3 patients (4 %) du groupe placebo ont pris part à l'étude pendant > 1 an. Le traitement a été interrompu chez 25 patients (30 %) du groupe malade de sunitinib et 10 patients (12 %) du groupe placebo. Les doses ont été réduites chez 26 patients (31 %) du groupe malade de sunitinib et 9 patients (11 %) du groupe placebo. Le taux d'abandon imputable aux effets indésirables liés au traitement a été de 12 % dans le groupe malade de sunitinib et de 2 % dans le groupe placebo.

La plupart des effets indésirables liés au traitement ont été de grade 1 ou 2 dans les deux groupes. Des effets indésirables de grades 3 et 4 liés au traitement ont été signalés chez 43 % des patients du groupe malade de sunitinib et 20 % des patients du groupe placebo. Le tableau 7 contient une liste comparative des effets indésirables liés au traitement signalés couramment par les patients traités par malade de sunitinib ( $\geq 10\%$ ) et plus fréquemment que par les patients du groupe placebo.

**Tableau 7 – Effets indésirables liés au traitement signalés chez au moins 10 % des sujets traités par malade de sunitinib dans l’essai de phase III sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques et plus fréquemment que par les patients du groupe placebo**

Effet indésirable	Tumeurs neuroendocrines pancréatiques			
	malade de sunitinib (n = 83)		Placebo (n = 82)	
	Tous les grades n (%)	Grade 3/4 n (%)	Tous les grades n (%)	Grade 3/4 n (%)
<b>Tous</b>	81 (97,6 %)	36 (43,4 %)	64 (78,0 %)	16 (19,5)
<b>Troubles sanguins et lymphatiques</b>				
Neutropénie	24 (28,9 %)	10 (12,0 %)	3 (3,7 %)	0 (0,0 %)
Thrombocytopénie	14 (16,9 %)	3 (3,6 %)	4 (4,9 %)	0 (0,0 %)
<b>Troubles du métabolisme et de l’alimentation</b>				
Anorexie	17 (20,5 %)	2 (2,4 %)	11 (13,4 %)	0 (0,0 %)
<b>Troubles du système nerveux</b>				
Dysgueusie	16 (19,3 %)	0 (0,0 %)	3 (3,7 %)	0 (0,0 %)
Céphalées	10 (12,0 %)	0 (0,0 %)	5 (6,1 %)	1 (1,2 %)
<b>Troubles vasculaires</b>			3	
Hypertension	19 (22,9 %)	8 (9,6 %)	(3,7 %)	0 (0,0 %)
<b>Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux</b>			2	
Épistaxis	16 (19,3 %)	1 (1,2 %)	(2,4 %)	0 (0,0 %)
<b>Troubles digestifs</b>				
Diarrhée	44 (53,0 %)	4 (4,8 %)	25 (30,5 %)	1 (1,2 %)
Nausées	32 (38,6 %)	1 (1,2 %)	18 (22,0 %)	0 (0,0 %)
Vomissements	21 (25,3 %)	0 (0,0 %)	14 (17,1 %)	0 (0,0 %)
Stomatite	18 (21,7 %)	3 (3,6 %)	2 (2,4 %)	0 (0,0 %)
Douleurs abdominales	12 (14,5 %)	1 (1,2 %)	10 (12,2 %)	3 (3,7 %)
Dyspepsie	12 (14,5 %)	0 (0,0 %)	1 (1,2 %)	0 (0,0 %)

<b>Atteintes cutanées ou sous-cutanées</b>				
Changement de la couleur des cheveux				
Érythrodysesthésie palmo-plantaire ou syndrome mains-pieds	24 (28,9 %)	1 (1,2 %)	1 (1,2 %)	0 (0,0 %)
Éruptions cutanées	19 (22,9 %)	5 (6,0 %)	2 (2,4 %)	0 (0,0 %)
Sécheresse cutanée	13 (15,7 %)	0 (0,0 %)	4 (4,9 %)	0 (0,0 %)
	11 (13,3 %)	0 (0,0 %)	9 (11,0 %)	0 (0,0 %)
<b>Troubles généraux et atteintes au point d'administration</b>			18 (22,0 %)	
Asthénie	26 (31,3 %)	3 (3,6 %)	14 (17,1 %)	2 (2,4 %)
Fatigue	24 (28,9 %)	4 (4,8 %)	6 (7,3 %)	3 (3,7 %)
Inflammation des muqueuses	13 (15,7 %)	1 (1,2 %)		0 (0,0 %)
<b>Résultats d'examen</b>				
Perte pondérale	11 (13,3 %)	1 (1,2 %)	6 (7,3 %)	0 (0,0 %)

\* *Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 3.0*

Le tableau 8 énumère les anomalies des résultats d'analyse apparues durant le traitement à une fréquence  $\geq 10$  %.

**Tableau 8. Anomalies des résultats d'analyse apparues chez > 10 % des sujets traités par malate de sunitinib dans l'essai de phase III sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques**

Analyse de laboratoire, n (%)	Tumeurs neuroendocrines pancréatiques					
	malate de sunitinib			Placebo		
	N	Tous les grades*	Grade 3/4*a	N	Tous les grades*	Grade 3/4*b
<b>Appareil digestif</b>						
ASAT	82	59 (72)	4 (5)	80	56 (70)	2 (3)
ALAT	82	50 (61)	3 (4)	80	44 (55)	2 (3)
Phosphatase alcaline	82	52 (63)	8 (10)	80	56 (70)	9 (11)
Bilirubine totale	82	30 (37)	1 (1)	80	22 (28)	3 (4)
Amylase	74	15 (20)	3 (4)	74	7 (10)	1 (1)
Lipase	75	13 (17)	4 (5)	72	8 (11)	3 (4)
<b>Fonction rénale / Métabolisme</b>						
Glucose - hausse	82	58 (71)	10 (12)	80	62 (78)	14 (18)
Albumine	81	33 (41)	1 (1)	79	29 (37)	1 (1)
Phosphore	81	29 (36)	6 (7)	77	17 (22)	4 (5)
Calcium - baisse	82	28 (34)	0 (0)	80	15 (19)	0 (0)
Sodium - baisse	82	24 (29)	2 (2)	80	27 (34)	2 (3)
Créatinine	82	22 (27)	4 (5)	80	22 (28)	4 (5)
Glucose - baisse	82	18 (22)	2 (2)	80	12 (15)	3 (4)

Analyse de laboratoire, n (%)	Tumeurs neuroendocrines pancréatiques					
	malate de sunitinib			Placebo		
	N	Tous les grades*	Grade 3/4*a	N	Tous les grades*	Grade 3/4*b
Potassium - baisse	82	17 (21)	3 (4)	80	11 (14)	0 (0)
Magnésium - baisse	52	10 (19)	0 (0)	39	4 (10)	0 (0)
Potassium - hausse	82	15 (18)	1 (1)	80	9 (11)	1 (1)
<b>Hématologie</b>						
Neutrophiles	82	58 (71)	13 (16)	80	13 (16)	0 (0)
Hémoglobine	82	53 (65)	0 (0)	80	44 (55)	1 (1)
Plaquettes	82	49 (60)	4 (5)	80	12 (15)	0 (0)
Lymphocytes	82	46 (56)	<b>61Z</b>	80	28(35)	3(4)

\* *Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), version 3.0*

<sup>a</sup> Anomalies de grade 4 chez les patients sous malate de sunitinib : créatinine (4 %), lipase (4 %), glucose - baisse (2 %), glucose - hausse (2 %), neutrophiles (2 %), ALAT (1 %), ASAT (1 %), plaquettes (1 %), potassium - hausse (1 %) et bilirubine totale (1 %).

<sup>b</sup> Anomalies de grade 4 chez les patients sous placebo : créatinine (3 %), phosphatase alcaline (1 %), glucose - hausse (1 %) et lipase (1 %).

### Autres effets indésirables

#### **Appareil locomoteur**

Des cas de rhabdomyolyse ont été signalés chez certains sujets au cours d'essais cliniques non déterminants (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS *et* EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit).

#### **Système cardiovasculaire**

Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS.

#### **Épreuves de laboratoire**

Augmentation du taux sanguin d'acide urique.

#### **Embolie pulmonaire**

Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS.

#### **Fonctions hépatique et pancréatique**

En présence de symptômes de pancréatite ou d'insuffisance hépatique, il faut cesser d'administrer Eugia-Sunitinib. Cinq (5) patients (1 %) atteints d'un adénocarcinome rénal jamais traité ont fait une pancréatite alors qu'ils recevaient malate de sunitinib, comparativement à 1 patient (< 1 %) dans le groupe IFN- $\alpha$ . Une hépatotoxicité a été signalée chez des patients traités par malate de sunitinib (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

#### **Convulsions**

Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS.

### **Atteintes cutanées ou sous-cutanées**

De rares cas de syndrome de Stevens-Johnson ont été signalés.

### **Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit**

Les effets indésirables mentionnés ci-dessous ont été recensés après l'autorisation de mise en marché de malate de sunitinib. Comme ces effets sont déclarés volontairement par une population de taille incertaine, leur fréquence et leur lien causal avec l'exposition au médicament ne peuvent pas toujours être établis avec certitude.

#### **Manifestations thromboemboliques artérielles**

Des manifestations thromboemboliques artérielles, parfois mortelles, ont été signalées chez des patients traités par le sunitinib. L'accident vasculaire cérébral, l'accident ischémique transitoire et l'infarctus cérébral comptaient parmi les manifestations les plus fréquentes. Les facteurs de risque associés à ce type de manifestation, outre l'affection maligne sous-jacente et l'âge (> 65 ans), incluaient l'hypertension, le diabète et des antécédents de maladie thromboembolique. On a fait état de cas d'ischémie myocardique et d'infarctus du myocarde parfois mortels.

#### **Troubles sanguins et lymphatiques**

Des cas de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), de purpura thrombopénique idiopathique, d'anémie hémolytique et d'anémie microangiopathique ont été signalés. On recommande d'interrompre le traitement par malate de sunitinib dans de tels cas et de faire preuve de discernement, étant donné qu'il n'existe pas de données à l'appui de la reprise du traitement par suite de la résolution de ces troubles.

#### **Troubles cardiovasculaires**

Des cas d'insuffisance ventriculaire gauche, d'insuffisance cardiaque, de manifestations ischémiques cardiovasculaires (*voir* EFFETS INDÉSIRABLES, Effets indésirables signalés après la commercialisation du produit, Manifestations thromboemboliques artérielles ) et de troubles du rythme cardiaque ont été signalés chez des patients pré sentant une maladie et/ou des facteurs de risque cardiovasculaire. Il a toutefois été impossible d'établir un lien de causalité avec le malate de sunitinib.

On a signalé des cas de cardiomyopathie, dont l'issue parfois mortelle a été attribuée à malate de sunitinib. Des cas de microangiopathie thrombotique, y compris de purpura thrombocytopénique thrombotique et de syndrome hémolytique et urémique, ayant parfois évolué vers une insuffisance rénale ou la mort, ont été signalés. Il faut cesser définitivement le traitement par Eugia-Sunitinib chez les patients qui présentent une microangiopathie thrombotique.

#### **Troubles endocriniens**

Des cas de thyroïdite, d'hypothyroïdie et d'hyperthyroïdie, quelquefois suivie d'une



hypothyroïdie, ont été signalés dans le cadre des essais cliniques et après le lancement du produit (*voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Dysfonctionnement thyroïdien*).

Des diminutions de la glycémie, parfois symptomatiques sur le plan clinique et ayant de graves complications, ont été signalées lors du traitement par le sunitinib, tant chez des patients diabétiques que non diabétiques.

### **Hémorragie**

L'épistaxis est le type de complication hémorragique le plus souvent signalé chez les patients traités par le malate de sunitinib (*voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hémorragie*). La plupart des cas étaient légers et limités, mais des cas d'épistaxis grave ont été signalés après la commercialisation de malate de sunitinib.

Parmi les complications hémorragiques signalées depuis la commercialisation de malate de sunitinib, dont certaines ont été mortelles, mentionnons les hémorragies digestives, pulmonaires, tumorales, cérébrales et des voies urinaires. En outre, on a rapporté des cas d'hémorragie mortelle associée à une thrombopénie.

On a signalé des cas d'hémorragie pulmonaire, digestive, tumorale, cérébrale et des voies urinaires, dont certains d'issue fatale, chez des patients traités par malate de sunitinib.

### **Fonctions hépatique et biliaire**

Des cas d'hépatotoxicité ont été observés dans les essais cliniques et après la commercialisation du produit.

Des cas de cholécystite, y compris de cholécystite alithiasique et de cholécystite emphysémateuse, dont certains d'issue fatale, ont été signalés chez des patients traités par le sunitinib.

### **Troubles du système immunitaire**

Des réactions d'hypersensibilité telles que l'œdème angio-neurotique ont été signalées.

### **Infections et infestations**

Des cas d'infection grave (avec ou sans neutropénie), parfois mortelle, ont été signalés. Les infections observées le plus souvent lors du traitement par le malate de sunitinib sont les suivantes : infections respiratoires (p. ex., pneumonie, bronchite), infections des voies urinaires, infections cutanées (p. ex., cellulite), sepsis/choc septique, abcès (p. ex., génital, anorectal, cutané, viscéral, à un membre), infections virales (p. ex., nasopharyngite, herpès buccal) ou fongiques (p. ex., candidose buccale ou œsophagienne). Des cas de fasciite nécrosante, notamment du périnée, parfois mortels, ont été signalés.

### **Atteintes des tissus ostéomusculaire ou conjonctif**

Des cas de myopathie et/ou de rhabdomyolyse, dont certains s'accompagnaient d'insuffisance

rénale aiguë et ont parfois causé la mort, ont été rapportés. La plupart des patients touchés avaient des facteurs de risque préexistants et/ou prenaient en concomitance des médicaments ayant un lien connu avec de tels effets indésirables. Les patients présentant des signes ou des symptômes de toxicité musculaire doivent être pris en charge conformément aux pratiques médicales standard (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

Des cas d'ostéonécrose de la mâchoire ont été rapportés chez les patients traités par le sunitinib. La majorité des cas se sont manifestés chez les patients pour qui un facteur de risque élevé d'ostéonécrose de la mâchoire avait été identifié, en particulier chez ceux ayant été exposés à un traitement intraveineux par des bisphosphonates ou ayant subi des interventions dentaires invasives (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).

### **Troubles du système nerveux**

Des cas d'altération du goût, comme l'agueusie, ont été signalés.

### **Troubles rénaux et urinaires**

Des cas d'altération de la fonction rénale et/ou d'insuffisance rénale, parfois mortelles, ont été signalés.

Des cas de protéinurie et de syndrome néphrotique ont été rapportés (*voir* MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS). On recommande d'effectuer une analyse d'urine au début du traitement, et il faut suivre de près les patients en demeurant à l'affût de toute apparition ou aggravation d'une protéinurie. L'innocuité d'un traitement continu par le malade de sunitinib n'a pas été évaluée systématiquement chez les patients présentant une protéinurie modérée ou sévère. Il faut mettre fin à l'administration de malade de sunitinib chez les patients atteints d'un syndrome néphrotique.

### **Troubles respiratoires**

On a signalé des cas d'embolie pulmonaire, dont l'issue parfois mortelle a été attribuée à malade de sunitinib. Des cas d'épanchement pleural, qui ont parfois causé la mort, ont été signalés.

### **Troubles vasculaires**

On a signalé la survenue de dissections artérielles et d'anévrismes artériels (dont des cas de rupture) en association avec des inhibiteurs de tyrosine kinases ciblant le VEGFR, dont malade de sunitinib.

### **Troubles de l'appareil digestif**

Œsophagite.

### **Troubles neurologiques**

Des cas de syndrome réversible de leucoencéphalopathie postérieure ont été rapportés, dont certains à l'issue mortelle.

### **Autre**

Formation de fistules : Des cas de formation de fistules (anales, entérocutanées, gastro-intestinales, trachéo-œsophagiennes et pleurales), dont certains ont été associés à une nécrose

ou à une régression tumorale, et qui ont parfois causé la mort, ont été signalés.

#### **Atteintes cutanées ou *sous-cutanées***

Des réactions cutanées ont été signalées lors de l'emploi de malate de sunitinib en association avec la radiothérapie.

Des cas de pyodermite gangréneuse (*pyoderma gangrenosum*), de syndrome de Stevens-Johnson et d'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse, dont certains ayant menacé la vie ou entraîné la mort, ainsi que d'érythème polymorphe ont été signalés.

#### **Syndrome de lyse tumorale**

Des cas de syndrome de lyse tumorale, parfois mortels, ont été signalés chez des patients traités par malate de sunitinib. Certains cas sont survenus peu de temps après l'instauration du traitement.

#### **Innocuité à long terme dans le traitement de l'ARM**

Selon des données tirées de 9 études cliniques terminées auprès de patients atteints d'un ARM et traités par malate de sunitinib, le traitement prolongé par malate de sunitinib ( $\geq 2$  ans) n'a pas entraîné d'aggravation des effets indésirables liés au traitement ni de manifestations indésirables d'autres types, et son effet toxique n'a pas été cumulatif, mis à part pour l'hypothyroïdie.

### **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

#### **Aperçu**

Le malate de sunitinib est métabolisé principalement par l'isoenzyme CYP3A4. Il existe un risque d'interactions avec les médicaments, les aliments et les plantes médicinales qui sont des inhibiteurs ou des inducteurs de cette isoenzyme.

#### **Interactions médicament-médicament**

***Inhibiteurs de la CYP3A4*** : L'administration concomitante d'Eugia-Sunitinib et d'un inhibiteur de l'isoenzyme CYP3A4 peut faire augmenter la concentration de malate de sunitinib (*voir MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE*). On recommande d'éviter d'administrer Eugia-Sunitinib en concomitance avec des inhibiteurs de la CYP3A4, notamment les bloqueurs des canaux calciques non dihydropyridiniques (p. ex. diltiazem et vérapamil), les antifongiques (p. ex. kétoconazole, fluconazole, itraconazole et voriconazole), les antibiotiques de la famille des macrolides (p. ex. érythromycine, clarithromycine et télichromycine), les antibiotiques de la classe des fluoroquinolones (p. ex. ciprofloxacine et norfloxacine) et certains agents anti-VIH (p. ex. ritonavir et indinavir).

***Inducteurs de la CYP3A4*** : L'administration concomitante de malate de sunitinib et d'un inducteur de l'isoenzyme CYP3A4 peut faire baisser la concentration d'Eugia-Sunitinib (*voir MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE*). On recommande d'éviter d'administrer Eugia-Sunitinib en concomitance avec des inducteurs de la CYP3A4, notamment les barbituriques (p. ex.

phénobarbital), les anticonvulsivants (p. ex. carbamazépine et phénytoïne), la rifampine, les glucocorticoïdes, la pioglitazone et certains anti-VIH (p. ex. éfavirenz et névirapine).

**Médicaments prolongeant l'intervalle QT/QTc :** L'emploi concomitant d'Eugia-Sunitinib et d'un autre médicament prolongeant l'intervalle QT/QTc est à proscrire. Toutefois, si un tel traitement s'avère nécessaire, il faut être particulièrement vigilant. Les médicaments ayant été associés à une prolongation de l'intervalle QT/QTc et/ou à des torsades de pointes sont énumérés ci-dessous (liste non exhaustive).

Sont comprises dans cette liste les classes chimiques ou pharmacologiques dont certains médicaments, mais pas nécessairement tous, ont entraîné des prolongations de l'intervalle QT/QTc et/ou des torsades de pointes :

- antiarythmiques (classe IA, p. ex., quinidine, procainamide, disopyramide; classe III, p. ex., amiodarone, sotalol, ibutilide; classe IC, p. ex., flécaïnide, propafénone);
- antipsychotiques (p. ex., thioridazine, chlorpromazine, pimozide, halopéridol, dropéridol);
- antidépresseurs (p. ex., amitriptyline, imipramine, maprotiline, fluoxétine, venlafaxine);
- opiacés (p. ex., méthadone);
- macrolides (p. ex., érythromycine, clarithromycine, télichromycine);
- quinolones (p. ex., moxifloxacine, gatifloxacine, ciprofloxacine);
- antipaludéens (p. ex., quinine);
- pentamidine;
- antifongiques azolés (p. ex., kétoconazole, fluconazole, voriconazole);
- médicaments contre les troubles digestifs (p. ex., dompéridone, antagonistes des récepteurs 5-HT<sub>3</sub> tels que granisétron, ondansétron, dolasétron);
- agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques (p. ex., salmétérol, formotérol);
- tacrolimus.

**Médicaments qui prolongent l'intervalle PR :** Il faut faire preuve de prudence lorsqu'on prescrit Eugia-Sunitinib en association avec d'autres médicaments qui peuvent entraîner une prolongation de l'intervalle PR, par exemple les bêtabloquants, les bloqueurs des canaux calciques, les digitaliques et les inhibiteurs de la protéase du VIH (*voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Prolongation de l'intervalle QT*).

La liste ci-dessus de médicaments pouvant interagir avec malate de sunitinib n'est pas complète. On doit consulter la littérature scientifique courante pour obtenir plus d'information.

### **Interactions médicament-aliment**

Comme le jus de pamplemousse exerce un effet inhibiteur sur la CYP3A4, son ingestion durant un traitement par malate de sunitinib peut ralentir la biotransformation d'Eugia-Sunitinib et faire augmenter sa concentration plasmatique (*voir **Interactions médicament-médicament***). Le jus de pamplemousse est déconseillé durant le traitement par Eugia-Sunitinib.

### **Interactions médicament-herbe médicinale**

Le millepertuis est un puissant inducteur de la CYP3A4. Son administration à des patients traités par Eugia-Sunitinib peut accélérer la biotransformation de malate de sunitinib et faire diminuer sa concentration plasmatique (*voir Interactions médicament-médicament*). Le millepertuis est déconseillé durant le traitement par Eugia-Sunitinib.

## **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION**

### Dose recommandée pour le traitement des TSGI et de l'ARM

La dose recommandée d'Eugia-Sunitinib est de 50 mg 1 fois par jour par la voie orale, selon un schéma cyclique de 4 semaines suivies de 2 semaines de repos.

### Dose recommandée pour le traitement des tumeurs neuroendocrines pancréatiques

La dose recommandée d'Eugia-Sunitinib pour les tumeurs neuroendocrines pancréatiques est de 37,5 mg/jour par voie orale sans congé thérapeutique. Eugia-Sunitinib peut être pris avec ou sans nourriture.

### Modification de la dose

La dose quotidienne ne doit pas dépasser 50 mg ni être inférieure à 25 mg. Il est recommandé de modifier la dose par paliers de 12,5 mg, en fonction de la tolérance du patient.

***Inhibiteurs de la CYP3A4*** : L'administration concomitante de malate de sunitinib et de kétoconazole, un inhibiteur de la CYP3A4, a produit des hausses de 49 % de la  $C_{max}$  et de 51 % de l' $ASC_{0-\infty}$  du malate de sunitinib et de son métabolite actif combinés, après la prise d'une dose unique de malate de sunitinib par des volontaires sains. Chez les patients qui reçoivent un inhibiteur puissant de la CYP3A4 comme le kétoconazole, il peut être nécessaire de réduire la dose d'Eugia-Sunitinib jusqu'à un minimum de 25 mg par jour; il faut également surveiller de près la réponse et la tolérance du patient (*voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES et MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE*). Il est conseillé d'opter pour un médicament concomitant de rechange qui soit exempt ou presque d'effet inhibiteur sur la CYP3A4. **À NOTER** : Cette recommandation se fonde sur des données pharmacocinétiques obtenues chez des volontaires sains. L'innocuité et l'efficacité de malate de sunitinib pris en concomitance avec un inhibiteur de la CYP3A4 n'ont pas été établies dans les essais cliniques menés jusqu'ici. Au cours des 2 études sur l'ARM réfractaire aux cytokines, aucune modification de la dose initiale de malate de sunitinib n'a été apportée chez les 14 patients sur 169 qui prenaient aussi un puissant inhibiteur de la CYP3A4.

***Inducteurs de la CYP3A4*** : L'administration concomitante de malate de sunitinib et de rifampine, un inducteur puissant de la CYP3A4, a produit des réductions de plus de 23 % de la  $C_{max}$  et de 46 % de l' $ASC_{0-\infty}$  du malate de sunitinib et de son métabolite actif combinés, après la prise d'une dose unique de malate de sunitinib par des volontaires sains. Chez les patients qui reçoivent Eugia-Sunitinib en concomitance avec un inducteur puissant de la CYP3A4, comme la rifampine, il peut être nécessaire d'augmenter la dose d'Eugia-Sunitinib (dose maximale de 50 mg); il faut également surveiller de près la réponse et la tolérance du patient (*voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES et MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE*). Il est conseillé d'opter pour un médicament concomitant de rechange qui soit exempt ou presque d'effet inducteur sur

la CYP3A4. **À NOTER** : Cette recommandation se fonde sur des données pharmacocinétiques obtenues chez des volontaires sains. L'innocuité et l'efficacité de malate de sunitinib pris en concomitance avec un inducteur de la CYP3A4 n'ont pas été établies dans les essais cliniques menés jusqu'ici. Au cours des 2 études sur l'ARM réfractaire aux cytokines, aucune modification de la dose initiale de malate de sunitinib n'a été apportée chez les 33 patients sur 169 qui prenaient aussi un puissant inducteur de la CYP3A4.

**Populations particulières** : Il n'est pas nécessaire de régler la dose en fonction de l'âge, du poids, de la clairance de la créatinine, de la race, du sexe ou de l'indice fonctionnel ECOG du patient (*voir MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Populations particulières*).

## **SURDOSAGE**

Le traitement du surdosage par Eugia-Sunitinib consiste en des mesures générales de soutien. Il n'existe pas d'antidote propre à Eugia-Sunitinib en cas de surdosage. S'il y a lieu, on peut éliminer le médicament non absorbé en provoquant des vomissements ou par lavage d'estomac. Des cas de surdosage accidentel ont été signalés; certains ont été associés à des effets indésirables qui concordaient avec le tableau d'innocuité connu de malate de sunitinib. Un cas de surdosage intentionnel a été rapporté : un patient a pris intentionnellement 1500 mg de malate de sunitinib au cours d'une tentative de suicide; aucun effet indésirable n'a été observé.

En cas de surdosage soupçonné, communiquez avec le centre antipoison de votre région.
---

## **MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE**

Malate de sunitinib est une petite molécule qui inhibe de nombreux récepteurs tyrosine kinases (RTK), dont certains contribuent à la prolifération tumorale, à l'angiogenèse pathologique et à la métastatisation du cancer. On a évalué l'action inhibitrice du malate de sunitinib sur diverses kinases (> 80 kinases), ce qui a permis de constater sa puissante action inhibitrice des récepteurs du facteur de croissance dérivé des plaquettes ( PDGFRa et PDGFRP), des récepteurs du facteur de croissance endothéliale (VEGFR1, VEGFR2 et VEGFR3), du récepteur du facteur de croissance des cellules souches (KIT), du récepteur tyrosine kinase de classe 3 (FLT3), du récepteur du facteur de stimulation des colonies (CSF-1R) et du récepteur du facteur neurotrophique dérivé des cellules gliales (RET). La capacité du malate de sunitinib d'inhiber ces RTK a été mise en évidence à l'aide d'analyses biochimiques et d'essais sur cultures cellulaires ; quant à l'inhibition des effets de ces RTK, elle a été mise en évidence par des études sur la prolifération ou la viabilité cellulaires. Le métabolite principal du malate de sunitinib a une puissance d'action semblable, selon les analyses biochimiques et les essais sur cultures cellulaires (*voir PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE*).

Le malate de sunitinib a inhibé la phosphorylation de multiples RTK (PDGFRP, VEGFR2, KIT) dans des xénogreffes tumorales exprimant les RTK ciblés in vivo et, dans certains modèles expérimentaux de cancer, il a inhibé la prolifération tumorale, fait régresser la tumeur et/ou inhibé la métastatisation. In vitro, il s'est révélé capable d'inhiber la prolifération des cellules tumorales exprimant les RTK dérégulés ciblés (PDGFR, RET ou KIT) et, in vivo, d'inhiber l'angiogenèse tumorale régie par les récepteurs PDGFR0 et VEGFR2.

## **Pharmacocinétique**

On a évalué la pharmacocinétique du malate de sunitinib et de son principal métabolite actif chez 135 volontaires sains et 266 patients ayant des tumeurs solides.

### ***Absorption et distribution***

La concentration plasmatique maximale ( $C_{max}$ ) du malate de sunitinib est généralement atteinte de 6 à 12 heures ( $T_{max}$ ) après la prise du médicament. Les aliments n'altèrent pas la biodisponibilité du sunitinib. Après l'administration orale d'une seule dose à des volontaires sains, les demi-vies terminales du malate de sunitinib et de son principal métabolite actif ont varié entre 40 et 60 heures et 80 et 110 heures, respectivement. Après une administration quotidienne répétée de doses variant entre 25 et 100 mg, l'aire sous la courbe de la concentration plasmatique en fonction du temps (ASC) et la  $C_{max}$  du malate de sunitinib et du médicament total augmentent proportionnellement à la dose. Lorsque le malate de sunitinib est administré quotidiennement de façon répétée, sa concentration est multipliée par 3 à 4 et celle de son principal métabolite actif, par 7 à 10 sous l'effet de l'accumulation. Les concentrations de malate de sunitinib et de son principal métabolite actif atteignent l'équilibre en 10 à 14 jours. Le 14<sup>e</sup> jour, la concentration plasmatique minimale du malate de sunitinib et de son principal métabolite actif combinés se situe entre 62,9 et 101 ng/mL. Après une administration quotidienne répétée et plusieurs cycles des schémas thérapeutiques évalués, on n'a décelé aucune variation notable de la pharmacocinétique du malate de sunitinib et de son principal métabolite actif. Le volume apparent de distribution (Vd/F) du malate de sunitinib s'est chiffré à 2230 L.

La pharmacocinétique s'est avérée semblable chez les volontaires sains et les cohortes évaluées, porteuses de tumeurs solides, y compris les sujets ayant une TSGI, un ARM ou une tumeur neuroendocrine pancréatique (*voir* ESSAIS CLINIQUES).

In vitro, le malate de sunitinib s'est lié aux protéines plasmatiques humaines dans une proportion de 95 % et son principal métabolite actif, dans une proportion de 90 %, selon un mode apparemment indépendant de la concentration.

### ***Métabolisme et élimination***

La biotransformation du sunitinib, qui s'effectue principalement sous la médiation de la CYP3A4, une isoenzyme du cytochrome P450, produit son principal métabolite actif, lequel est métabolisé à son tour par la CYP3A4. Le principal métabolite actif représente 23 à 37 % de l'exposition totale au médicament. Le médicament est principalement éliminé dans les selles. Dans une étude du bilan de masse chez l'humain à l'aide de [<sup>14</sup>C] sunitinib, 61 % de la dose radioactive est passée dans les selles, et 16 % a été éliminée par les reins sous forme inchangée et sous forme de métabolites. Le malate de sunitinib et son principal métabolite actif sont les principales molécules retrouvées dans le plasma, l'urine et les selles, représentant 91,5 %, 86,4 % et 73,8 % de la radioactivité dans l'ensemble des échantillons, respectivement. Dans l'urine et les selles, on a retrouvé des métabolites secondaires qui n'étaient généralement pas présents dans le plasma. La clairance totale après administration orale (CL/F) a varié entre 34 et 62 L/h, la variabilité d'un sujet à l'autre étant de 40 %.

### **Populations particulières**

Selon les analyses démographiques des données pharmacocinétiques, l'âge, le poids, la clairance de la créatinine, la race, le sexe et l'indice fonctionnel ECOG ne semblent pas avoir d'effets d'importance clinique sur la pharmacocinétique du malate de sunitinib et de son métabolite actif. On ne dispose d'aucune donnée pharmacocinétique chez l'enfant.

### **Insuffisance hépatique**

Une dose unique de 50 mg de malate de sunitinib a été administrée à des patients atteints d'insuffisance hépatique légère (classe A de Child-Pugh) ou modérée (classe B de Child-Pugh) et à un groupe témoin ayant une fonction hépatique normale. D'après les paramètres pharmacocinétiques évalués, aucun réglage de la dose initiale ne semble nécessaire dans les cas d'insuffisance hépatique légère ou modérée. Malate de sunitinib n'a toutefois pas été étudié dans les cas d'insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh). En outre, l'emploi de doses multiples de malate de sunitinib n'a pas été étudié en présence d'une atteinte hépatique.

### **Insuffisance rénale**

L'innocuité et l'efficacité de malate de sunitinib n'ont pas été établies chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère ni chez les hémodialysés souffrant de néphropathie au stade terminal. Ont été exclus des études de phase III les sujets dont la créatininémie dépassait 2,0 fois la LSN. Cela dit, dans une étude de phase I de faible envergure, l'exposition générale après l'administration d'une dose unique de 50 mg de malate de sunitinib était comparable chez 8 sujets atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min) et 8 sujets dont la fonction rénale était normale (clairance de la créatinine > 80 mL/min). Elle variait toutefois davantage chez les premiers. Bien que l'hémodialyse n'ait pas éliminé le malate de sunitinib et son principal métabolite chez les 8 sujets souffrant de néphropathie au stade terminal, l'exposition générale totale de ces derniers au malate de sunitinib et à son principal métabolite était néanmoins 47 % et 31 % inférieure à celle des 8 sujets exempts de dysfonctionnement rénal, en raison vraisemblablement d'une absorption réduite du malate de sunitinib imputable à la néphropathie.

D'après les données pharmacocinétiques tirées de l'étude de phase I, il n'est pas nécessaire de régler la dose initiale de malate de sunitinib en présence d'insuffisance rénale (d'intensité légère à sévère) ou de néphropathie au stade terminal nécessitant une hémodialyse. Les modifications subséquentes de la dose seront fonction de l'innocuité et de la tolérabilité (*voir* POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION, Modification de la dose). Aucune étude n'a porté sur l'administration répétée de malate de sunitinib chez des insuffisants rénaux.

Des cas d'altération de la fonction rénale et d'insuffisance rénale, parfois mortelles, ont été signalés lors de l'emploi de malate de sunitinib. La prudence et une surveillance attentive s'imposent pendant le traitement par malate de sunitinib chez les patients souffrant d'insuffisance rénale sévère et les hémodialysés atteints de néphropathie au stade terminal.

Une analyse de pharmacocinétique n'a révélé aucune relation entre la fonction rénale des sujets (mesurée d'après la clairance de la créatinine; valeurs extrêmes : 42 et 347 mL/min) et la



pharmacocinétique du sunitinib.

## Pharmacodynamie

### ***Prolongation de l'intervalle QT/QTc***

Lors d'un essai clinique de phase I sur l'intervalle QT, des patients atteints de tumeurs solides au stade avancé ont reçu malate de sunitinib à 150 mg les 3<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> jours de traitement et à 50 mg par jour du 4<sup>e</sup> au 8<sup>e</sup> jour (témoin actif administré le 1<sup>er</sup> jour et placebo administré le 2<sup>e</sup> jour). Des lectures manuelles d'ECG en série ont été réalisées conformément aux recommandations en vigueur. À des concentrations environ 2 fois plus élevées que les concentrations thérapeutiques, **malate de sunitinib a été associé à une prolongation de l'intervalle QTc**. Les 3<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> jours, **malate de sunitinib a été associé à une prolongation progressive de l'intervalle QTc qui s'est poursuivie durant toute la période d'observation de 24 heures, sans atteindre de pic, de plateau ou d'équilibre manifeste**. Par conséquent, l'effet maximal n'a pu être déterminé de façon certaine. À la dernière observation (24 h), la prolongation maximale moyenne corrigée en fonction du placebo était de 9,6 millisecondes (IC à 90 % de 4,1 à 15,1) le 3<sup>e</sup> jour et de 15,4 millisecondes (IC à 90 % de 8,4 à 22,4) le 9<sup>e</sup> jour (temps 0 à la même heure chaque jour et correction de Fridericia en fonction de la fréquence cardiaque). L'ampleur de ces prolongations est considérée comme préoccupante. Toutefois, aucun des sujets n'a présenté d'effet dépassant le grade 2 (CTCAE, version 3.0) ni d'arythmie cardiaque (*voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS*).

### ***Morphologie de l'onde T***

Le taux de sujets présentant des anomalies de l'onde T et la proportion d'ECG révélant de telles anomalies étaient déjà élevés au départ dans cette population de patients cancéreux, mais, après 7 jours de traitement par malate de sunitinib, ils avaient augmenté.

On a jugé que la prolongation de l'intervalle QTc associée aux changements de morphologie de l'onde T justifiait une surveillance étroite en raison du risque d'altération du rythme cardiaque.

### ***Intervalle PR et fréquence cardiaque***

Les variations moyennes de l'intervalle PR, corrigées en fonction du placebo, étaient positives à tous les temps d'évaluation; la prolongation maximale a été observée de 7 à 12 heures après l'administration, et le déclin, après 24 heures. Les analyses des valeurs de PR nettement divergentes (> 200 millisecondes) ont révélé une proportion accrue de celles-ci chez les patients traités par malate de sunitinib. La prolongation excessive de l'intervalle PR peut provoquer un bloc auriculoventriculaire. La progression du bloc auriculoventriculaire s'accompagne d'une augmentation de la morbi-mortalité.

Les 3<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> jours, la fréquence cardiaque a diminué progressivement durant les 24 heures ayant suivi l'administration de malate de sunitinib, mais elle n'a pas été influencée par le témoin actif. Durant l'étude, un cas de bradycardie a été jugé lié au traitement, et des étourdissements ont été signalés par 7 des 48 patients.

La bradycardie et le bloc auriculoventriculaire sont des facteurs de risque reconnus de torsades de pointes. Pour cette raison, un médicament qui provoque une prolongation de l'intervalle QTc

accompagnée d'une prolongation des intervalles PR et RR soulève des inquiétudes quant au risque d'altération du rythme cardiaque.

### **Interactions médicament-médicament**

Selon les études in vitro, le malate de sunitinib n'a pas d'effet inducteur ni inhibiteur sur les principales isoenzymes du cytochrome P450 (CYP).

**Études in vitro sur l'inhibition et l'induction du CYP :** Selon les études in vitro de l'activité des isoenzymes CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5 et CYP4A9/11 dans des microsomes hépatiques et des hépatocytes d'origine humaine, le malate de sunitinib et son principal métabolite actif risquent peu d'avoir des interactions d'importance clinique avec les médicaments qui peuvent être métabolisés par ces enzymes.

**Inhibiteurs de la CYP3A4 :** L'administration concomitante de malate de sunitinib et de kétoconazole, un inhibiteur puissant de la CYP3A4, a produit des hausses de 49 % de la Cmax et de 51 % de l'ASC<sub>0-∞</sub> du malate de sunitinib et de son métabolite actif combinés, après la prise d'une dose unique de malate de sunitinib par des volontaires sains.

L'administration d'Eugia-Sunitinib en même temps qu'un inhibiteur puissant de la CYP3A4 peut faire augmenter la concentration de malate de sunitinib. Il faut éviter d'administrer Eugia-Sunitinib et l'un de ces inhibiteurs en concomitance ou opter pour un médicament concomitant de rechange qui soit exempt ou presque d'effet inhibiteur sur la CYP3A4, sinon il faudra peut-être réduire la dose d'Eugia-Sunitinib (*voir* POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION). **À NOTER :** L'innocuité et l'efficacité de malate de sunitinib pris en concomitance avec un inhibiteur de la CYP3A4 n'ont pas été établies dans les essais cliniques menés jusqu'ici.

**Inducteurs de la CYP3A4 :** L'administration concomitante de malate de sunitinib et de rifampine, un inducteur puissant de la CYP3A4, a entraîné des réductions de 23 % de la Cmax et de 46 % de l'ASC<sub>0-∞</sub> du malate de sunitinib et de son métabolite actif combinés, après la prise d'une dose unique de malate de sunitinib par des volontaires sains.

L'administration d'Eugia-Sunitinib en même temps qu'un inducteur puissant de la CYP3A4 peut abaisser la concentration de malate de sunitinib. Il faut éviter d'administrer Eugia-Sunitinib et l'un de ces inducteurs en concomitance et opter pour un médicament de rechange exempt ou presque d'effet inducteur sur la CYP3A4, sinon il faudra peut-être augmenter la dose d'Eugia-Sunitinib (*voir* POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION). **À NOTER :** L'innocuité et l'efficacité de malate de sunitinib pris en concomitance avec un inducteur de la CYP3A4 n'ont pas été établies dans les essais cliniques menés jusqu'ici.

### **STABILITÉ ET CONSERVATION**

Conserver entre 15 et 30 °C.

### **DIRECTIVES PARTICULIÈRES DE MANIPULATION**

Sans objet.

## PRÉSENTATION, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

Forme posologique	Capsules			
Dosage	12,5 mg	25 mg	37,5 mg	50 mg
<b>Description</b>	Granules jaunes à orange remplis dans un capuchon rouge opaque et un corps rouge opaque portant l'inscription « S 12.5 » sur le corps à l'encre blanche et un capuchon uni, taille « 4 », capsules en gélatine dure.	Granules jaunes à oranges remplies dans un capuchon opaque vert olive et un corps opaque rouge imprimé « S25 » sur le corps à l'encre blanche et capuchon uni, taille 3 », capsules en gélatine dure.	Granules jaunes à oranges remplies dans un capuchon opaque vert clair et un corps opaque vert clair portant l'inscription « S37.5 » sur le corps à l'encre noire et un capuchon uni, taille « 3 », capsules en gélatine dure.	Granules jaunes à oranges remplies dans un capuchon opaque vert olive et un corps opaque vert olive imprimé « S50 » sur le corps à l'encre noire et un capuchon uni, taille « 2 », capsules en gélatine dure.
<b>Composition</b>	Chaque capsule contient du malate de sunitinib équivalent à 12,5 mg de sunitinib.  <b>Ingrédients non médicinaux</b> Mannitol, croscarmellose sodique, povidone et stéarate de magnésium.	Chaque capsule contient du malate de sunitinib équivalent à 25 mg de sunitinib.  <b>Ingrédients non médicinaux</b> Mannitol, croscarmellose sodique, povidone et stéarate de magnésium.	Chaque capsule contient du malate de sunitinib équivalent à 37,5 mg de sunitinib.  <b>Ingrédients non médicinaux</b> Mannitol, croscarmellose sodique, povidone et stéarate de magnésium.	Chaque capsule contient du malate de sunitinib équivalent à 50 mg de sunitinib.  <b>Ingrédients non médicinaux</b> Mannitol, croscarmellose sodique, povidone et stéarate de magnésium.
<b>Emballage</b>	Plaquette thermoformée de 1 x 7 et flacon de 28			

## PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

### RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

#### Substance pharmaceutique

##### Substance médicamenteuse


Nom commun : malate de sunitinib

Nom chimique : (Z)-N-[2-(Diéthylamino)éthyl]-5-[(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidène)méthyl]-2,4-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (S)-2-hydroxysuccinate.

Formule moléculaire : C<sub>22</sub>H<sub>27</sub>FN<sub>4</sub>O<sub>2</sub>·C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>5</sub>

Poids moléculaire : 398,5 g/mol (sunitinib), 532,6 g/mol (malate de sunitinib)

Formule structurelle :



Propriétés physico-chimiques : Le malate de sunitinib est une poudre jaune à orange. Le malate de sunitinib est soluble dans le diméthylsulfoxyde, peu soluble dans le diméthylformamide et légèrement soluble dans l'acétone, le méthanol, le dichlorométhane, l'éthanol, l'isopropanol, le n-butanol, l'heptane, l'hexane, le cyclohexane, le toluène, l'éther isopropylique, l'éther méthyltertiobutylique, la méthyléthylcétone, l'acétate d'éthyle, l'acétonitrile et l'eau. Le pKa du malate de Sunitinib est de 8,95. Le malate de sunitinib est un médicament hydrophobe dont le LogP est de 5,2.

## ESSAIS CLINIQUES

### Études comparatives de biodisponibilité

Une étude comparative de biodisponibilité orale, randomisée, à deux traitements, à deux périodes, à dose unique, croisée, des capsules de 50 mg d'Eugia-Sunitinib (Eugia Pharma Inc.) et des capsules de 50 mg de SUTENT® (Pfizer Canada ULC) a été menée chez des sujets masculins adultes en bonne santé, à jeun. Un résumé des données de biodisponibilité comparative de 38 sujets inclus dans l'analyse statistique est présenté dans le tableau suivant :

**Tableau récapitulatif des données comparatives de biodisponibilité Données de disponibilité**

<b>Sunitinib (1 x 50 mg) A partir de données mesurées Moyenne géométrique Moyenne arithmétique (CV %)</b>				
<b>Paramètre</b>	<b>Test<sup>1</sup></b>	<b>Référence<sup>2</sup></b>	<b>rapport des moyennes géométriques (%)</b>	<b>intervalle de confiance à 90 %</b>
<b>ASC<sub>0-72</sub><sup>3</sup> (ng.h/mL)</b>	1210,2 1242,7 (21,2)	1275,6 1314,0 (24,2)	94,9	90,8 - 99,2
<b>AUCI<sup>3</sup> (ng.h/mL)</b>	1745,3 1804,6 (25,6)	1797,0 1901,5 (33,2)	97,1	92,1 - 102,4
<b>C<sub>max</sub> (ng/mL)</b>	32,6 33,4 (21,8)	34,4 35,3 (22,8)	94,7	91,4 - 98,1
<b>T<sub>max</sub><sup>4</sup> (h)</b>	7,0 (4,5 - 12,0)	6,5 (4,5 - 14,0)		
<b>T<sub>½</sub><sup>3,5</sup> (h)</b>	40,3 (21,8)	38,7 (26,5)		

<sup>1</sup> Eugia-Sunitinib (sunitinib sous forme de malate de sunitinib) capsules de 50 mg (Eugia Pharma Inc.).

<sup>2</sup> SUTENT® (sunitinib sous forme de malate de sunitinib) capsules de 50 mg (Pfizer Canada ULC).

<sup>3</sup> n = 28 sujets

<sup>4</sup> Exprimé uniquement en tant que médiane (plage).

<sup>5</sup> Exprimé uniquement en moyenne arithmétique (% CV).

### Population de patients atteints d'une tumeur stromale gastro-intestinale (TSGI) (ou GIST)

On a évalué l'innocuité et l'efficacité clinique de malate de sunitinib pour traiter les TSGI après l'échec d'un traitement par le mésylate d'imatinib pour cause de résistance ou d'intolérance.

#### **Essai A sur les tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI)**

Il s'agit d'un essai international de phase III, comparatif avec placebo, mené à double insu après répartition aléatoire, auprès de sujets atteints d'une TSGI et dont le cancer avait évolué en raison d'une résistance à un traitement antérieur par le mésylate d'imatinib (imatinib) ou encore, qui avaient mal toléré ce médicament. L'essai avait pour objectif principal de comparer le temps écoulé avant la reprise

évolutive du cancer entre les sujets recevant malate de sunitinib plus les meilleurs soins d'appoint et les témoins recevant un placebo plus les meilleurs soins d'appoint. Les paramètres d'évaluation secondaires incluaient la survie sans évolution du cancer, le taux de réponse objective et la survie globale. Les patients ont été répartis aléatoirement (2/1) pour recevoir soit 50 mg de malate de sunitinib soit un placebo par voie orale, 1 fois par jour, selon un schéma cyclique de 4 semaines de traitement suivies de 2 semaines de repos (cycle 4/2) jusqu'à la reprise évolutive du cancer ou au retrait de l'essai pour un autre motif. À la reprise évolutive du cancer, l'insu était levé, et les témoins sous placebo avaient la possibilité de poursuivre l'essai sans insu en recevant malate de sunitinib, alors que les sujets assignés au groupe malate de sunitinib avaient la possibilité de poursuivre le traitement s'ils en retiraient un bienfait notable.

Au moment de l'analyse provisoire planifiée, les sujets recrutés dans l'intention de les traiter étaient au nombre de 312; 207 provenaient du groupe malate de sunitinib et 105 du groupe placebo.

L'âge, le sexe, la race et l'indice fonctionnel ECOG étaient comparables entre le groupe malate de sunitinib et le groupe placebo. L'exposition préalable à l'imatinib était également similaire entre les 2 groupes : la dose médiane reçue était de 800 mg dans les 2 groupes, mais environ 60 % des patients seulement avaient reçu 800 mg d'imatinib par jour avant leur admission à l'essai.

Un comité indépendant de surveillance des données d'innocuité a recommandé la levée de l'insu d'après les résultats de l'analyse provisoire planifiée, effectuée après 149 cas de reprise évolutive (53 % du nombre requis pour l'analyse finale) parmi les 312 sujets (82 dans le groupe malate de sunitinib et 67 dans le groupe placebo). Avant la levée de l'insu, le nombre médian de cycles par groupe de traitement était de 2 (1 à 15) dans le groupe malate de sunitinib et de 1 (1 à 6) dans le groupe placebo. L'effet bénéfique de malate de sunitinib à 50 mg par rapport au placebo pour le paramètre principal (temps écoulé avant la reprise évolutive) était statistiquement significatif, et l'objectif principal était donc atteint. De même, le paramètre secondaire évaluant la survie sans évolution du cancer a également révélé une différence significative. Au moment de l'analyse provisoire, il était trop tôt pour déterminer s'il y avait un effet bénéfique sur la survie globale. Le tableau 9 résume les résultats concernant l'efficacité. La courbe de Kaplan-Meier du temps écoulé avant la reprise évolutive est illustrée à la figure 1.

**Tableau 9. Efficacité du traitement des TSG (analyse provisoire)**

Paramètres d'efficacité	Essai A			
	malate de sunitinib (N =	Placebo (N = 105)	p (test log. par rangs)	RRI (IC à 95 %)
Temps écoulé avant la reprise évolutive <sup>a</sup> {médiane, semaines [mois] (IC à 95 %)}	27,3 [6,4] (16,0-32,1)	6,4 [1,5] (4,4-10,0)	< 0,0001*	0,33 (0,23-0,47)
Survie sans évolution du cancer <sup>b</sup> {médiane, semaines [mois] (IC à 95 %)}	24,1 [5,6] (11,1-28,3)	6,0 [1,4] (4,4-9,9)	< 0,0001*	0,33 (0,24-0,47)
Taux de réponse objective (partielle) [%] (IC à 95 %)	6,8 (3,7-11,1)	0	0,006 <sup>c</sup>	

Abréviations : IC = intervalle de confiance; N = nombre de patients; RRI = rapport des risques instantanés; T SGI = tumeur stromale gastro-intestinale


\* Une comparaison est statistiquement significative quand  $p$  est < 0,00156 (selon le seuil d'arrêt d'O'Brien-Fleming)

a Intervalle entre la répartition aléatoire et la reprise évolutive; les cas de mortalité avant l'observation documentée d'une reprise évolutive ont été soustraits de l'analyse à partir de la dernière évaluation radiographique

b Intervalle entre la répartition aléatoire et la reprise évolutive ou la mort de toutes causes

c T est du  $\chi^2$

**Figure 1. Courbe de Kaplan-Meier du temps écoulé avant la reprise évolutive durant l'essai A sur les TSGI (population en intention de traiter)**



Abréviations : IC = intervalle de confiance; n=nombre de patients; TSGI = tumeur stromale gastro-intestinale

Au moment de l'analyse finale, la population en intention de traiter admise à la phase de traitement à double insu comptait 243 patients assignés à malade de sunitinib et 118 au placebo. Le tableau 10 présente les données démographiques et les caractéristiques des patients.


**Tableau 10. Données démographiques initiales des sujets de l'essai A sur les TSGI**

	malade de sunitinib (N)	Placebo (N = 118)
<b>Sexe [n (%)]</b>		
masculin	152 (63)	71 (60)
féminin	91 (37)	47 (40)
<b>Race (indiquée par le sujet) [n(%)]</b>		
blanche	209 (86)	98 (83)
asiatique	11 (5)	6 (5)
noire	8 (3)	5 (4)
non fournie	15 (6)	9 (8)
<b>Groupe d'âge [n (%)]</b>		
< 65 ans	170 (70)	81 (69)
≥ 65 ans	73 (30)	37 (31)

<b>Indice fonctionnel [n (%)]</b>		
0	109 (45)	53 (45)
1	131 (54)	63 (54)
2	3 (1)	2 (2)
<b>Traitement antérieur [n (%)]</b>		
Chirurgie (autre qu'une biopsie)	238 (98)	116 (98)
Radiothérapie	15 (6)	12 (10)
<b>Dose maximale médiane d'imatinib reçue antérieurement [mg (valeurs extrêmes)]</b>	800 (300-1600)	800 (400-1600)
<b>Motif de l'échec de l'imatinib [n (%)]</b>		
Intolérance	13 (5)	4 (3)
Résistance (reprise évolutive en moins de 6 mois)	42 (17)	20 (17)
Résistance secondaire (reprise évolutive après 6	188 (77)	94 (80)

Une fois le paramètre principal atteint lors de l'analyse provisoire, l'insu a été levé, et les patients sous placebo avaient la possibilité de poursuivre l'essai sans insu en recevant malate de sunitinib. En tout, 255 patients ont reçu malate de sunitinib au cours de la phase de traitement sans insu, dont 99 qui, au départ, avaient reçu le placebo. On a observé une réponse partielle chez 10 de ces 99 patients (taux de réponse objective : 10,1 % ; IC à 95 % : 5,0 à 17,8). Dans la population en intention de traiter, la médiane de la survie globale était de 72,7 semaines dans le groupe malate de sunitinib et de 64,9 semaines dans le groupe placebo, c'est-à-dire les patients qui avaient reçu le placebo durant la phase sans insu, puis malate de sunitinib en mode sans insu (rapport des risques instantanés : 0,876; IC à 95 % : 0,679 à 1,129;  $p = 0,306$ ). Parmi les patients affectés au hasard à malate de sunitinib, 62,7 % ont survécu plus d'un an, 35,5 % plus de 2 ans et 22,3 % plus de 3 ans.

Figure 2. Courbe de Kaplan-Meier de la survie globale durant l'essai A sur les TSGI (population en intention de traiter)



Abréviations : IC = intervalle de confiance; n=nombre de patients; TSGI = tumeur stromale gastro-intestinale



## **Essai B sur les tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI)**

Il s'agit d'un essai multicentrique avec augmentation de la dose de malate de sunitinib, mené sans insu chez un groupe de sujets souffrant d'une TSGI et ayant reçu un traitement par l'imatinib, lors duquel on a observé une reprise évolutive du cancer ou une intolérance à cet agent. Les 55 sujets de cet essai ont reçu le schéma posologique recommandé à l'issue des essais cliniques de phase II sur malate de sunitinib, soit 50 mg 1 fois par jour selon un schéma cyclique 4/2. On a observé une réponse partielle chez 5 des 55 sujets (9,1 %).

## **Population de patients atteints d'un adénocarcinome rénal métastatique (ARM) (ou MRCC)**

### **Adénocarcinome rénal métastatique (ARM) jamais traité**

Une étude de phase III avec répartition aléatoire visant à évaluer malate de sunitinib employé seul par rapport à l'IFN- $\alpha$  a été menée chez des patients atteints d'un ARM jamais traité. Le paramètre d'évaluation principal était la survie sans évolution du cancer. Les paramètres d'évaluation secondaires étaient le temps écoulé avant la reprise évolutive, le taux de réponse objective, la survie globale et l'innocuité. La survie sans évolution a été définie comme la durée de l'intervalle entre la répartition aléatoire et la première des deux occurrences suivantes : la première observation documentée d'une reprise évolutive du cancer ou la mort sans égard à la cause. Le temps écoulé avant la reprise évolutive a été défini comme la durée de l'intervalle entre la répartition aléatoire et la première observation d'une reprise évolutive du cancer. Le taux de réponse objective a été défini comme la proportion des patients chez qui, selon les critères RECIST (*Response Evaluation Criteria in Solid Tumors*), une réponse complète (RC) ou partielle (RP) était confirmée. La survie globale a été définie comme la durée de l'intervalle entre la répartition aléatoire et la mort, toutes causes confondues. L'innocuité a été évaluée selon le type, la fréquence, l'intensité et la gravité des effets indésirables et des anomalies de laboratoire, le moment où ils se sont manifestés et leur lien éventuel avec le traitement. Trois analyses ont été planifiées au cours de cette étude. Comme le paramètre d'évaluation principal (survie sans évolution du cancer) a été atteint au moment de la seconde analyse provisoire, on a modifié le protocole de l'étude pour permettre aux patients du groupe IFN- $\alpha$  de recevoir le malate de sunitinib après observation documentée d'une reprise évolutive, comme convenu avec le comité indépendant de surveillance des données d'innocuité.

### Analyse provisoire

Dans cette étude, 750 patients ont été répartis au hasard en 2 groupes égaux, l'un recevant 50 mg de malate de sunitinib, 1 fois par jour selon un schéma 4/2, et l'autre, l'IFN- $\alpha$ , administré par voie sous-cutanée, à raison de 9 MUI, 3 fois par semaine. Au cours du premier cycle, les patients du groupe IFN- $\alpha$  ont reçu des doses croissantes allant de 3 MU par dose durant la première semaine à 6 MU par dose durant la deuxième semaine, puis à 9 MU par dose par la suite. La tumeur a été évaluée le 28<sup>e</sup> jour des 4 premiers cycles, puis toutes les 12 semaines par la suite. Au terme du premier cycle, 65 des 375 patients sous IFN- $\alpha$  et 39 des 375 patients sous malate de sunitinib avaient vu leur maladie évoluer ou étaient morts. Les patients ont été traités jusqu'à une reprise évolutive du cancer ou jusqu'à leur retrait de l'étude, pour une autre raison.

La population en intention de traiter comptait 750 patients : 375 affectés à malate de sunitinib et 375 à l'IFN- $\alpha$ . Dans ce dernier groupe, 15 sujets ont retiré leur consentement avant le début du traitement; la population traitée comptait donc 375 patients sous malate de sunitinib et 360 sous IFN- $\alpha$ . Les examens histologiques ont révélé que 90 % des sujets des 2 groupes souffraient d'un ARM à cellules claires. L'âge,

le sexe, la race et l'indice fonctionnel ECOG des sujets étaient semblables, et les groupes malade de sunitinib et IFN- $\alpha$  ont été équilibrés à cet égard. Les caractéristiques démographiques et personnelles des sujets sont décrites dans le tableau 11. Les métastases présentes au début de l'étude siégeaient le plus souvent (groupe malade de sunitinib vs IFN- $\alpha$ ) aux poumons (78 % vs 80 %), aux ganglions lymphatiques (58 % vs 53 %) et aux os (30 % vs 30 %), et la majorité des patients présentaient des métastases à deux endroits ou plus (80 % vs 77 %).

**Tableau 11. Données démographiques initiales des sujets de l'étude sur l'ARM jamais traité**

	ARM jamais traité	
	malade de sunitinib (N)	IFN- $\alpha$ (N = 375)
<b>Sexe [n (%)]</b>		
masculin	267 (71)	269 (72)
féminin	108 (29)	106 (28)
<b>Race (indiquée par le sujet) [n (%)]</b>		
blanche	354 (94)	340 (91)
asiatique	7 (2)	12 (3)
noire	4 (1)	9 (2)
non fournie	10 (3)	14 (4)
<b>Groupe d'âge [n (%)]</b>		
< 65 ans	223 (59)	252 (67)
$\geq$ 65 ans	152 (41)	123 (33)
<b>Indice fonctionnel [n (%)]</b>		
0	231 (62)	229 (61)
1	144 (38)	142 (38)
2	0 (0)	4 (1) <sup>a</sup>
<b>Traitement antérieur [n (%)]</b>		
Néphrectomie	340 (91)	335 (89)
Radiothérapie	53 (14)	54 (14)

Abréviations : ARM = adénocarcinome rénal métastatique; N = nombre de sujets. a Ces patients avaient un indice fonctionnel de 1 à la visite de sélection et de 2 au début de l'étude

L'analyse provisoire a fait ressortir un avantage statistiquement significatif de malade de sunitinib sur l'IFN- $\alpha$  pour le paramètre d'évaluation principal, la survie sans évolution dans le groupe malade de sunitinib étant plus du double de celle du groupe IFN- $\alpha$  (47,3 vs 22,0 semaines) (voir le tableau 12). Comme les résultats d'ensemble pouvaient avoir été influencés par les résultats des patients du groupe IFN- $\alpha$  dont la maladie avait évolué ou qui étaient morts avant d'avoir atteint la dose de 9 MU (voir la page précédente'), on a réalisé une analyse supplémentaire de laquelle on a exclu les données de ces patients. Les résultats de cette analyse ont également fait ressortir une différence significative de la survie sans évolution entre les 2 groupes (RRI = 0,343, IC à 95 % : 0,24-0,48,  $p < 0,0001$ ). La survie médiane sans évolution a été estimée à 48,3 vs 31,3 semaines (malade de sunitinib vs IFN- $\alpha$ ).

Le taux de réponse objective, l'un des paramètres d'évaluation secondaires, était plus du quadruple dans le groupe malade de sunitinib par rapport au groupe IFN- $\alpha$ . Au moment de l'analyse provisoire, 374 des

750 sujets (50 %) participaient toujours à l'étude : 248/375 (66 %) dans le groupe malade de sunitinib et 126/375 (34 %) dans le groupe IFN- $\alpha$ . Les résultats sur l'efficacité sont résumés dans le tableau 12, et la courbe de Kaplan-Meier pour la survie sans évolution est illustrée à la figure 3. Les analyses complémentaires ont fourni des résultats similaires, qui ont résisté aux contrôles effectués en fonction des caractéristiques démographiques (âge, sexe, race et indice fonctionnel) et des facteurs de risque connus.

**Tableau 12. Efficacité contre l'ARM jamais traité\***

Paramètres d'efficacité	ARM jamais traité			
	malade de sunitinib (N = 375)	IFN- $\alpha$ (N = 375)	p (test log. par rangs)	RRI (IC à 95 %)
Survie sans évolution <sup>a</sup> [médiane, semaines (IC à 95 %)]	47,3 (42,6-50,7)	22,0 (16,4-24,0)	< 0,000001 <sup>b</sup>	0,415 (0,320-0,539)
Temps écoulé avant la reprise évolutive <sup>a</sup> [médiane, semaines (IC à 95 %)]	47,9 (45,9-50,7)	223 (17,3-31,3)	< 0,000001	0,416 (0,318-0,545)
Taux de réponse objective <sup>a</sup> [%; (IC à 95 %)]	38,7 (33,7-43,8)	7,7 (5,2-10,9)	< 0,001 <sup>c</sup>	s.o.

Abréviations : ARM = adénocarcinome rénal métastatique, IC = intervalle de confiance; IFN- $\alpha$  = interféron- $\alpha$ ; s.o. = sans objet; N = nombre de sujets.


<sup>a</sup> Évaluation avec insu par un laboratoire de radiologie central

<sup>b</sup> Une comparaison est statistiquement significative quand p est < 0,0042 (selon le seuil d'arrêt d'O'Brien-Fleming)

<sup>c</sup> T est du  $\chi^2$

\* Les résultats présentés proviennent de l'analyse provisoire, à l'exception du taux de réponse objective qui est tiré des données définitives.

**Figure 3. Courbe de Kaplan-Meier de la survie sans évolution durant l'essai sur l'ARM jamais traité (population en intention de traiter)**




Abréviations : ARM = adénocarcinome rénal métastatique, IC = intervalle de confiance; IFN -a = interféron-a;

N = nombre de sujets

L'influence des paramètres initiaux sur l'effet du traitement a été analysée plus en profondeur à l'aide d'un modèle de régression de Cox comprenant tous les paramètres initiaux et contrôlant chacun d'eux, un à la fois. Dans l'analyse principale, le rapport des risques instantanés (RRI) pour l'effet global du traitement, tous paramètres confondus, était de 0,415 (IC à 95 % : 0,320–0,539;  $p < 0,001$ ); il est demeuré sensiblement le même après contrôle de chaque paramètre initial. L'effet du traitement dans les sous-groupes définis en fonction de chacun des paramètres initiaux est illustré à la figure 4.


Les différences étaient statistiquement significatives ( $p < 0,01$ ) pour les paramètres initiaux suivants : indice fonctionnel ECOG (0 vs 1); taux de lactate-déshydrogénase (LDH) ( $\leq$  vs  $> 1,5$  fois la limite supérieure de la normale [LSN]); temps écoulé depuis le diagnostic ( $\geq$  vs  $< 1$  an); taux d'hémoglobine ( $\geq$  vs  $< \text{LIN}$ ); calcémie corrigée ( $\leq$  vs  $> 10$  mg/dL) et taux de phosphatases alcalines ( $\leq$  vs  $> \text{LSN}$ ). Les résultats des analyses fondées sur les évaluations effectuées par les investigateurs étaient similaires, sauf qu'ils se sont également révélés significatifs pour la néphrectomie antérieure ( $p = 0,0064$ ), le sexe ( $p = 0,0349$ ) et l'indice fonctionnel ECOG ( $p < 0,001$ ).

**Figure 4. Résultats de l'analyse selon le modèle de régression de Cox de la survie sans évolution déterminée par un laboratoire de radiologie central et comparaisons des traitements en fonction de chacun des paramètres initiaux - Essai sur l'ARM jamais traité (population en intention de traiter)**



Analyse finale Au moment de l'analyse finale, 190 (50,7 %) patients du groupe malade de sunitinib et 200 (53,3 %) du groupe IFN-α étaient décédés. Comme l'indique la figure 5, la survie tendait à être plus longue dans le groupe malade de sunitinib, selon l'analyse principale de la survie. La médiane de la survie globale était de 115 semaines dans le groupe malade de sunitinib (IC à 95 % : 100 à 143) et de 94,9 semaines dans le groupe IFN-α (IC à 95 % : 77,7 à 117,0) [rapport des risques instantanés : 0,821; IC à 95 % : 0,673 à 1,001; test logarithmique par rangs : p = 0,0510, analyse principale]. Dans l'analyse stratifiée (taux de lactate-déshydrogénase [LDH] > 1,5 fois la limite supérieure de la normale [LSN] vs ≤ 1,5 la LSN; indice fonctionnel ECOG 0 vs ≥ 1 et absence ou présence d'une néphrectomie antérieure), le rapport des risques instantanés s'établissait à 0,818 (IC à 95 % : 0,669 à 0,999; test logarithmique par rangs : p = 0,049, analyse secondaire). Dans l'analyse de la médiane de survie globale du groupe IFN-α sont inclus 25 patients qui ont interrompu le traitement par l'IFN-α en raison de l'évolution de leur cancer et qui sont passés à malade de sunitinib. Après l'abandon de l'étude, un traitement anticancéreux a été administré à 213 patients du groupe IFN-α, dont 32 % ont reçu malade de sunitinib, et à 182 patients du groupe malade de sunitinib, dont 11 % ont reçu malade de sunitinib.

**Figure 5. Courbe de Kaplan-Meier de la survie globale durant l'essai sur l'AR jamais traité (population en intention de traiter)**



**Abréviations : AR = adénocarcinome rénal; IC = intervalle de confiance; IFN-α = interféron-a; n=nombre de sujets**

### ***Adénocarcinome rénal métastatique (ARM) réfractaire aux cytokines***

L'emploi de malate de sunitinib en monothérapie dans le traitement de l'ARM réfractaire aux cytokines a été évalué aux États-Unis dans 2 études comportant chacune un seul groupe de traitement. Les patients ont reçu malate de sunitinib à une dose initiale de 50 mg, 1 fois par jour, selon un schéma de 4 semaines de traitement, suivies de 2 semaines de repos (schéma 4/2). Dans l'étude 1, étude déterminante, pour conclure à l'échec du traitement antérieur par les cytokines, les radiographies devaient avoir laissé apparaître des signes d'évolution de la maladie, selon les critères d'évaluation de la réponse des tumeurs solides (RECIST) ou ceux de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) durant le traitement par les cytokines (interféron-a [au moins 28 jours], interleukine 2 ou interféron-a et interleukine 2) ou dans les 9 mois suivants. Dans l'étude 2, étude de confirmation, on avait défini l'échec du traitement antérieur par les cytokines comme résultant d'une évolution de la maladie ou d'une toxicité inacceptable liée au traitement. Le paramètre principal était le taux de réponse objective, fondé, dans l'étude 1, sur laboratoire de radiologie indépendant et, dans l'étude 2, sur l'évaluation effectuée par les investigateurs. L'évaluation de la durée de la réponse figurait parmi les paramètres secondaires. L'étude 1 a fait l'objet d'un rapport précoce en raison des résultats prometteurs qui ont été obtenus; le suivi n'étant pas encore achevé, on ne peut rendre compte avec précision des résultats au chapitre de la durée de la réponse.

Cent six (106) patients ont pris part à l'étude 1, et 63, à l'étude 2. On arrêta le traitement quand les patients répondaient aux critères de retrait ou que leur maladie évoluait. La population des 2 études présentait au départ des caractéristiques semblables sur le plan de l'âge, du sexe, de la race et de l'indice fonctionnel ECOG. Environ 86 à 94 % des sujets des deux études étaient de race blanche et, dans les deux études réunies, 65 % des sujets étaient de sexe masculin. L'âge médian était de 57 ans (minimum et maximum : 24 et 87 ans). Tous les patients admis aux études présentaient un indice fonctionnel ECOG inférieur à 2 au moment de la visite de sélection, mais 2 d'entre eux avaient un indice de 2 lorsque le

traitement par malate de sunitinib s'est amorcé.

Sur le plan de la malignité et des antécédents de traitement, les patients des études 1 et 2 présentaient un tableau comparable. Dans l'ensemble, l'ARM comportait des cellules claires chez 95,3 % des patients des 2 études réunies; la présence de cellules claires était exigée pour être admis à l'étude 1, tandis que dans l'étude 2, 87 % des patients avaient un ARM à cellules claires. Le temps écoulé entre le diagnostic et l'admission aux études était d'environ 1,6 an. La plupart des patients admis (97 % dans les 2 études réunies) avaient subi une néphrectomie; cette intervention constituait un critère d'admissibilité à l'étude 1. Tous les patients avaient déjà reçu 1 cycle de traitement par les cytokines, et 9,5 % (16 patients) avaient obtenu une réponse objective. Au moment de l'admission, 81 % des patients avaient des métastases pulmonaires; le taux de métastases hépatiques était plus élevé dans l'étude 1 que dans l'étude 2 (27 % vs 16 %), et celui des métastases osseuses était plus élevé dans l'étude 2 que dans l'étude 1 (51 % vs 25 %); 52 % des patients des études 1 et 2 réunies avaient des métastases au moins à 3 endroits. Les patients qu'on savait atteints de métastases cérébrales ou de maladie leptoméningée ont été exclus des 2 études.

### Résultats des études 1 et 2

Les résultats des études 1 et 2 sont présentés au tableau 13.

**Tableau 13. Résultats sur l'efficacité du traitement de l'ARM réfractaire aux cytokines<sup>a</sup>**

Paramètre d'efficacité	Essai 1 (n = 106)	Essai 2 (n = 63)
Taux de réponse objective (RP), % (IC à 95 %)	25,5 (17,5-34,9)	36,5 (24,7-49,6)
Durée de la réponse, médiane en semaines [mois] (IC à 95 %)	Aucune estimation possible*	54 [12,5] (34,3-70,1)

Abréviations : IC = intervalle de confiance; RP=réponse partielle

<sup>a</sup> D'après la date limite de collecte des données, soit le 28 janvier 2005 pour l'étude 1 et le 1<sup>er</sup> décembre 2004 pour l'étude 2.

\* Il était trop tôt pour estimer la durée de la réponse dans l'étude 1, car seulement 4 des 27 patients ayant répondu au traitement ont vu leur maladie évoluer.

Le paramètre principal de l'étude 1 était le taux de réponse objective fondé sur l'évaluation d'un laboratoire de radiologie indépendant, et celui de l'étude 2, le taux de réponse objective fondé sur l'évaluation des investigateurs. Dans l'étude 1, on n'a pas noté de réponse complète, mais on a observé 27 réponses partielles, soit un taux de réponse objective de 25,5 % (IC à 95 % de 17,5 à 34,9). Dans l'étude 2, les investigateurs n'ont pas noté de réponse complète, mais ils ont observé 23 réponses partielles, soit un taux de réponse objective de 36,5 % (IC à 95 % de 24,7 à 49,6). La majorité des réponses objectives ont été observées entre le 2<sup>e</sup> et le 4<sup>e</sup> cycle, mais on en a même observées au 11<sup>e</sup> cycle. Les données concernant la durée de la réponse sont présentées ci-dessus pour l'étude 2; il est trop tôt pour présenter celles de l'étude 1, car seulement 4 des 27 patients (15 %) répondant au traitement ont vu leur maladie évoluer. Au moment de l'analyse, 41 % des patients poursuivaient toujours leur traitement par malate de sunitinib.

## **Tumeurs neuroendocrines pancréatiques**

### *Phase III*

Un essai international multicentrique de phase III sur un seul agent - malade de sunitinib - a été mené à double insu après répartition aléatoire de patients aux prises avec une tumeur neuroendocrine pancréatique non résécable. Les patients devaient avoir présenté une reprise évolutive de la maladie documentée selon les critères RECIST dans les 12 mois précédant l'étude. Ils ont été répartis au hasard en deux groupes égaux, l'un recevant malade de sunitinib à 37,5 mg 1 f.p.j. sans congé thérapeutique (n = 86) et l'autre, un placebo (n = 85). La dose a été portée à 50 mg chez 8 patients. L'essai avait pour objectif principal de comparer la survie sans progression entre les deux groupes. Parmi les autres paramètres d'évaluation, on comptait la survie globale, le taux de réponse objective, les résultats signalés par les patients et l'innocuité. L'emploi d'analogues de la somatostatine était permis durant l'étude.

Les caractéristiques démographiques étaient comparables entre le groupe malade de sunitinib et le groupe placebo. En outre, 49 % des patients du groupe malade de sunitinib avaient une tumeur non fonctionnelle, comparativement à 52 % des patients dans le groupe placebo, et 92 % des patients des deux groupes avaient des métastases au foie. Au total, 66 % des patients du groupe malade de sunitinib avaient déjà reçu un traitement général, comparativement à 72 % des patients dans le groupe placebo. De plus, 35 % des patients du groupe malade de sunitinib et 38 % des patients du groupe placebo avaient déjà reçu des analogues de la somatostatine. Les patients ont été traités jusqu'à une reprise évolutive du cancer ou jusqu'à leur retrait de l'étude. Les patients qui présentaient une évolution tumorale ou qui terminaient l'étude avaient la possibilité de suivre un traitement par malade de sunitinib dans une autre étude de prolongation.

Sur la recommandation du comité indépendant de surveillance des données, on a mis fin à l'étude avant l'analyse provisoire planifiée, ce qui pourrait avoir donné lieu à une surestimation de l'importance de l'effet sur la survie sans évolution. Afin d'éliminer la possibilité de biais d'interprétation de l'évaluation de l'efficacité par les investigateurs, une analyse des données a été effectuée à l'insu par un comité d'évaluation indépendant, laquelle concordait avec l'évaluation des investigateurs. Les deux évaluations, celle des investigateurs et celle du comité d'évaluation indépendant, ont révélé un avantage significatif sur le plan clinique pour malade de sunitinib par rapport au placebo en ce qui a trait à la survie sans évolution. Un rapport des risques instantanés (*Hazard ratio*) favorable au groupe malade de sunitinib a été observé pour l'ensemble des caractéristiques initiales évaluées. Les données finales relatives à la survie globale n'étaient pas disponibles au moment de l'analyse. Il y a eu 9 décès dans le groupe malade de sunitinib et 21 dans le groupe placebo. On a observé une différence statistiquement significative en faveur de malade de sunitinib en ce qui a trait au taux de réponse objective. Les résultats sur l'efficacité sont résumés dans le tableau 14, et la courbe de Kaplan-Meier pour la survie sans évolution est illustrée à la figure 6.

**Tableau 14. Résultats relatifs à l'efficacité obtenus pendant l'essai de phase III sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques**


Paramètres d'efficacité	malade de sunitinib (n = 86)	Placebo (n = 85)	Valeur p	RRI (IC à 95 %)
Survie sans évolution du cancer (médiane, mois [IC à 95 %]) selon l'évaluation des investigateurs	11,4 (7,4, 19,8)	5,5 (3,6,7,4)	0,000118a	0,418 (0,263,0,662)
Taux de réponse objective (% , [IC	9,3 (3,2, 15,4)	0	0,0066b	s. o.



à 95 %])

**Abréviations :** IC = intervalle de confiance; n = nombre de patients; RRI = rapport des risques instantanés; s. o. = sans objet a T est logarithmique par rang non stratifié bilatéral b Méthode exacte de Fisher

**Figure 6. Courbe de Kaplan-Meier de la survie sans évolution durant l'essai de phase III sur les tumeurs neuroendocrines pancréatiques**



## PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE

Dans le cadre du programme d'évaluation pharmacologique non clinique du sunitinib, on a évalué la capacité de cet agent et de son principal métabolite actif d'inhiber l'activité et le fonctionnement des récepteurs tyrosine kinases (RTK) visés, in vitro et in vivo, et leur capacité d'inhiber la progression tumorale chez des rongeurs servant de modèle de cancer expérimental. La puissance du principal métabolite s'est révélée semblable à celle du malate de sunitinib lors des analyses biochimiques et des essais sur cultures cellulaires.

### Effet in vitro :

Le malate de sunitinib a agi sélectivement sur les RTK visés lors de l'évaluation d'un échantillon de

> 80 kinases sélectionnées (15 à 20 % des kinases connues).

**Tableau 15. Inhibition des récepteurs tyrosine kinases ciblés par le sunitinib**

Récepteur tyrosine kinases	Ki <sup>a</sup> (pM)	CI50 cellulaire (pM)	
		Phosphorylation du RTK <sup>b</sup>	Prolifération cellulaire <sup>d</sup>
VEGFR1	0,002	ind.	ind.
VEGFR2	0,009 (Flk-1)	0,004 (KDR) 0,01 (Flk-1) <sup>c</sup>	0,004 (KDR)
VEGFR3	0.017	ind.	ind.
PDGFR $\alpha$	ind.	ind.	0,069
PDGFR $\beta$	0,008	0,003 0,01 <sup>c</sup>	0,039
KIT	ind.	0,013 0,001-0,01 <sup>c</sup>	0,002
FLT3-DIT	ind.	0.05 <sup>c</sup>	0.01
RET	ind.	0.05 <sup>c</sup>	0.05
CSF-1R	ind.	0.05-0.1 <sup>c</sup>	ind.

ind. : indéterminé; DIT : duplication interne en tandem; KDR : équivalent orthologue de VEGFR2 chez l'humain; Flk -1 : équivalent orthologue de VEGFR2 chez la souris.

a Coefficient d'inhibition déterminé par mesure biochimique de l'activité enzymatique sur des kinases recombinées.

b Mesures de l'activité kinase (phosphorylation), intrinsèque ou après stimulation par fixation d'un ligand, effectuées sur des lignées cellulaires exprimant le RTK ciblé, par la méthode ELISA ou par immunoempreinte. L'inhibition de la phosphorylation est une mesure du degré d'inhibition de l'effet catalyseur des RTK ciblés.

c Mesures (ou intervalles de mesures) estimées visuellement sur les résultats de l'immunoempreinte de la phosphorylation des RTK dans des cellules exposées à une gamme de concentrations.

d Mesures de la prolifération, intrinsèque ou après stimulation par fixation d'un ligand, effectuées sur des lignées cellulaires exprimant le RTK ciblé. L'inhibition de la prolifération cellulaire révèle l'inhibition de l'activité kinase des RT K ciblés dans les lignées cellulaires sélectionnées pour ces essais.

### **Effet in vivo :**

Le malate de sunitinib a inhibé la phosphorylation de multiples RTK (PDGFR(k VEGFR2 et KIT) dans des xénogreffes tumorales exprimant les RTK ciblés; il a pu inhiber la prolifération tumorale ou faire régresser la tumeur et/ou inhiber la métastatisation dans divers modèles de cancer expérimental chez le rongeur. Le malate de sunitinib a pu inhiber la prolifération des cellules tumorales présentant un dérèglement des RTK ciblés (PDGFR, RET ou KIT) comme l'angiogenèse tumorale régie par les récepteurs PDGFR( et VEGFR2, ce qui concorde avec sa capacité d'agir sur des cibles multiples.

### **Pharmacologie non clinique de l'innocuité - Études sur l'intervalle QT**

Le malate de sunitinib et son métabolite actif, le SU012662, ont tous deux aboli les courants des canaux potassiques hERG dans des cellules rénales d'embryon humain après transfection stable du gène hERG. La CI<sub>50</sub> du malate de sunitinib était de 266,3 nM (nominale) et de 144,1 nM (vérifiée par analyse); dans le cas du SU12662, une valeur de 4,1  $\mu$ M (nominale) a été mesurée. Le malate de sunitinib a aussi augmenté la durée du potentiel d'action dans des fibres de Purkinje chez le chien. De plus, il a entraîné une

prolongation de l'intervalle QTc chez des singes conscients, porteurs d'un dispositif de transmission téléométrique, à des doses de 50 mg/kg et de 150 mg/kg (administrées par voie intragastrique), lesquelles ont produit des concentrations plasmatiques de malate de sunitinib et de SU012662 se situant entre 242 et 474 ng/mL et 270 et 304 ng/mL, respectivement. Les prolongations maximales ont été de 72 millisecondes et de 77 millisecondes aux doses de 50 et de 150 mg/kg, respectivement.

### **Pharmacocinétique**

*Voir aussi* MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE.

Après administration intraveineuse à des souris, à des rats et à des singes, on a mesuré une clairance générale du malate de sunitinib allant de modérée à élevée et un volume de distribution supérieur à celui du volume total d'eau dans l'organisme. La demi-vie du malate de sunitinib a été d'environ 1 h, 2 à 5 h et 15 h chez la souris, le rat et le singe, respectivement. Après administration orale du sunitinib, on a mesuré un  $T_{max}$  variant entre 0,5 et 9 heures et une biodisponibilité d'au moins 50 % (53 à 77 % chez la souris, 55 à 112 % chez le rat et 41 à 58 % chez le singe). Le taux de fixation du malate de sunitinib aux protéines plasmatiques a atteint 91 % chez la souris, 98 % chez le rat et 95 % chez le singe et l'humain. Chez le rat et le singe, le malate de sunitinib et ses métabolites ont largement diffusé dans les tissus pour atteindre, dans la plupart, une concentration supérieure à la concentration sanguine ou plasmatique. Selon les études comportant une administration répétée, la concentration plasmatique chez le rat et le singe, et la concentration tissulaire chez le singe ont augmenté en fonction de la dose pour atteindre l'équilibre après 28 jours de traitement. À l'équilibre, l'ASC plasmatique du malate de sunitinib et de son métabolite actif était 4 fois moindre que l'ASC mesurée le 1<sup>er</sup> jour chez les 2 espèces. Chez le singe, les concentrations tissulaires du médicament et de son métabolite principal étaient de 13 à 308 fois supérieures à la concentration plasmatique mesurée 24 heures après l'administration du sunitinib; elles étaient plus faibles dans le tissu adipeux blanc et le SNC que dans les autres tissus.

Le malate de sunitinib a subi une biotransformation importante dans des microsomes hépatiques de souris, de rats, de singes et d'humains, *in vitro*, et dans celles de rats, de singes et d'humains, *in vivo*. Sa biotransformation, qui s'est révélée semblable *in vitro* et *in vivo*, s'est effectuée principalement sous la médiation de la CYP3A pour produire le principal métabolite actif. Même si de nombreux métabolites secondaires ont également été décelés dans les excréta, seules les concentrations de malate de sunitinib et de son principal métabolite actif ont pu être mesurées dans le plasma chez la souris, le rat, le singe et l'humain. Selon des études sur des microsomes hépatiques et des hépatocytes humains, le malate de sunitinib risque peu d'interagir de façon importante avec les médicaments métabolisés par les isoenzymes du cytochrome P450 suivantes : CYP1A2, CYP2D6, CYP2C8, CYP3A4/5, CYP2C19, CYP2C9, CYP2A6, CYP2B6, CYP2E1 et CYP4A9/11. Le malate de sunitinib et ses métabolites sont principalement éliminés dans les selles; l'élimination par la voie urinaire est faible. Chez le singe, 84 à 87 % d'une dose radioactive a été retrouvée dans les selles et 5 à 6 % dans l'urine, pour un taux de récupération total de 90 à 94 %. Chez le rat, 82 à 87 % de l'élément radioactif a été récupéré, dont 71 à 77 % dans les selles et 8 à 9 % dans l'urine. Chez l'humain, l'élimination se fait aussi principalement dans les selles. Dans l'ensemble, les données sur la pharmacocinétique et la biotransformation obtenues chez la souris, le rat et le singe indiquent que ces espèces animales conviennent aux études précliniques de pharmacologie et de toxicologie sur le malate de sunitinib.

## MICROBIOLOGIE

Sans objet

## TOXICOLOGIE

La toxicologie du malate de sunitinib chez l'animal a été évaluée en profondeur (*voir le tableau 16*).

### Toxicité d'une dose unique

Dans les études de toxicité aiguë par voie orale, la dose maximale tolérée (DMT) de malate de sunitinib chez la souris, le rat et le chien s'est révélée supérieure à la dose maximale évaluée, soit 500 mg/kg. Chez le singe, la DMT de malate de sunitinib par voie orale s'est révélée supérieure à la dose maximale évaluée, soit 1200 mg/kg; on a observé des vomissements aux doses  $\geq 50$  mg/kg. Le malate de sunitinib n'a pas causé de mortalité après l'administration d'une seule dose de 500 mg/kg à des souris (48 fois la dose recommandée chez l'humain, soit 50 mg/jour selon un schéma cyclique 4/2, en fonction de la surface corporelle), de 500 mg/kg à des rats (95 fois la dose recommandée chez l'humain), de 500 mg/kg à des chiens (environ 300 fois la dose recommandée chez l'humain) et de 1200 mg/kg à des singes (environ 450 fois la dose recommandée chez l'humain). Chez les singes, on a observé des vomissements, de la diarrhée et de légères hausses des taux de fibrinogène, d'aspartate aminotransférase (ASAT), d'alanine aminotransférase (ALAT), de lactico-déshydrogénase (LDH), de créatine kinase (CK) et d'alpha-hydroxybutyrate déshydrogénase (HBDH) après l'administration de doses orales uniques de 50 mg/kg/jour.

### Toxicité de doses multiples

On a évalué la toxicité à long terme du malate de sunitinib au cours d'études de toxicologie comportant l'administration à répétition du médicament à des rats et à des singes (tableau 16).

**Tableau 16. TOXICITÉ DE DOSES MULTIPLES**

Espèce/souche	Nbre/groupe	Dose (mg/kg/jour)	Voie	Durée	Durée du rétablissement	Résultats/observations
Rat/Crl: CD (SD) BR	10 M 10 F	5, 15, 45	orale	2 sem.	--	On a observé des altérations des cartilages de conjugaison, des surrénales, du pancréas, de la moelle osseuse, des organes hématolymphopoiétiques, des globules rouges et blancs circulants, de l'appareil digestif et des organes reproducteurs mâles et femelles. DSENO : 5 mg/kg/jour.
Rat/Crl: CD (SD) IGS BR	14 M 14 F	30 (1/jour) 30, 60 (/2 jours) 30, 80, 240 <sup>a</sup>	orale	2 sem	--	On a observé des altérations semblables à celles de l'étude antérieure de 14 jours. L'administration de 240 mg/kg/jour de SU012662 (métabolite principal) a causé des altérations organiques semblables à celles observées avec 30 mg/kg/jour de sunitinib. DSENO < 30 mg/kg/jour.
Rat/Crl: CD (SD) BR	15 M 15 F	2,5, 5, 15	orale	1 mois	4 sem.	On a observé des altérations additionnelles : bris d'incisives causés par une dégénérescence de la dentine chez les rats à > 5 mg/kg/jour; les autres altérations sont semblables à celles rapportées dans les études qui précèdent. On a jugé que la DSENO se situait à 5 mg/kg/jour.
Rat/Crl:	20 M	1,5, 5, 15	orale	3 mois	6 sem.	On a observé des altérations semblables à celles des études

CD (SD) BR	20 F					antérieures chez le rat, plus des altérations du canal cholédoque, f de l'ALAT et de l'ASAT et j des taux d'albumine et d'urée à 15 mg/kg/jour. Les bris d'incisives observés aux doses > 5 mg/kg/jour se sont associés à une perte de poids modérée ou marquée à 15 mg/kg/jour. Durant la dernière semaine de l'étude, les rats ont repris du poids grâce à l'apport d'aliments mous ou en poudre. On a jugé que la DSENO se situait à 1,5 mg/kg/jour.
Rat/Crl: CD (SD) IGS BR	25 M 25 F	0,3, 1,5, 6,0	orale	6 mois (5 cycles de 4 sem. de traitement + 1 sem. de repos)	8 sem.	On a observé des altérations semblables à celles des études antérieures chez le rat, ainsi qu'une néphrose chronique progressive aux doses ≥ 1,5 mg/kg/jour. On a jugé que la DSENO se situait à 0,3 mg/kg/jour.
Macaque cyno-molgus	3 M 3 F	5, 15, 45	orale	2 sem.	--	Dans l'ensemble, on a observé des altérations tissulaires semblables à celles des études antérieures chez le rat, ainsi que des vomissements, une baisse de l'activité, de l'alimentation et du poids, et une légère prolongation de l'intervalle QTc à 45 mg/kg/jour. On a jugé que la DSENO se situait à 5 mg/kg/jour.
Macaque cyno-molgus	6 M 6 F	2, 6, 12	orale	3 mois	6 sem.	On a observé des altérations tissulaires semblables à celles des études antérieures ainsi qu'une nécrose épithéliale avec érosion/ulcération des tissus de la cavité buccale aux doses > 6 mg/kg/jour. On a observé les signes sévères suivants à 12 mg/kg/jour : mortalité, anorexie, perte de poids, vomissements, selles molles ou liquides, pâleur cutanée, baisse d'activité, posture voûtée, hypothermie, coloration altérée de la bouche ou des gencives et lésions labiales ou buccales. Tous ces signes, sauf la mortalité, avaient disparu après la période de rétablissement. La DSENO s'est révélée < 2 mg/kg/jour d'après les observations suivantes : dysplasie physaire, atrophie de l'endomètre et dégranulation acineuse pancréatique.
Macaque cyno-molgus	7 M 7 F	0,3, 1,5, 6,0	orale	9 mois (8 cycles de 4 sem. de trait. + 1 sem. de repos)	8 sem.	À 6 mg/kg/jour, on a décelé les altérations additionnelles suivantes des organes reproducteurs femelles : atrophie épithéliale du col, de l'oviducte et du vagin, atrésie folliculaire et absence de corps jaunes dans les ovaires, et atrophie endométriale dans l'utérus; des reins : f mésangium glomérulaire; autres : inflammation aiguë de la thyroïde; inflammation des plexus choroïdes et atrophie épithéliale œsophagienne et linguale. Tous les effets toxiques ont été jugés réversibles à l'exception de la pâleur cutanée et de la perte de poids de l'utérus et des ovaires à 6 mg/kg/jour. On a jugé que la DSENO se situait à 1,5 mg/kg/jour.

M : mâle; F : femelle; -- : sans objet; DSENO : dose sans effet nocif observable; j : baisse; f : hausse; 1/jour : 1 fois par jour; /2 jours : tous les

2 jours; ALAT : alanine aminotransférase; ASAT : aspartate aminotransférase; sem. : semaine

a On a évalué le SU012662, principal métabolite actif du SU011248.

En résumé, on a observé les altérations importantes et réversibles suivantes après l'administration de malate de sunitinib chez le singe : vomissements et diarrhée après une exposition  $\geq 1,1$  fois l'exposition moyenne chez l'humain de 1929 ng-h/mL par suite de l'administration de la dose recommandée de 50 mg/jour (d'après les comparaisons d'une exposition générale au malate de sunitinib et à son métabolite actif); hémorragie du cortex surrénal chez le rat et le singe après une exposition  $\geq 16$  fois et  $\geq 1,1$  fois l'exposition moyenne chez l'humain, respectivement; réduction du nombre de cellules dans la moelle osseuse chez le rat et le singe après une exposition  $\geq 3,3$  fois et  $\geq 1,2$  fois l'exposition moyenne chez l'humain, respectivement; dégranulation des cellules acineuses pancréatiques chez le rat et le singe après une exposition  $\geq 16$  fois et  $< 1$  fois l'exposition moyenne chez l'humain, respectivement; épaissement des cartilages de conjugaison chez le rat et le singe après une exposition  $\geq 3,3$  fois et  $< 1$  fois l'exposition moyenne chez l'humain; atrophie utérine chez le singe et dégénérescence des corps jaunes chez le rat après une exposition  $< 1$  fois l'exposition moyenne chez l'humain par suite de l'administration de la dose recommandée.

## Génotoxicité

On a évalué le potentiel génotoxique du malate de sunitinib in vitro et in vivo (*voir le tableau 17 et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS*). Le malate de sunitinib n'a pas eu d'effet mutagène sur des bactéries après activation métabolique au moyen de tissu hépatique de rats. In vitro, le malate de sunitinib n'a pas entraîné d'aberrations structurales des chromosomes de lymphocytes humains prélevés dans le sang circulant, mais on a décelé dans ces mêmes cellules une polyploïdie (aberration du nombre de chromosomes) en présence ou en l'absence d'activation métabolique. Chez le rat, in vivo, le malate de sunitinib n'a pas eu d'effet clastogène sur les cellules de moelle osseuse. On n'a pas évalué le potentiel génotoxique du principal métabolite actif.

Méthode	N° de lot du médicament	Véhicule	Activation métabolique <sup>a</sup>	Dose/ Concentration s	Résultats
T est de réversion microbienne	(A)5903-TJF-0001	<i>S. typhimurium</i> et <i>E. coli</i>	Avec ou sans	$\pm$ S9 : 19,53, 39,06, 78,12, 156,25, 312,5 jig/boîte	Même aux concentrations maximales, le malate de sunitinib ne s'est pas révélé mutagène à l'épreuve d'Ames avec ou sans activation.
T est de réversion microbienne	(A)5953-TJF-0003	<i>S. typhimurium</i> et <i>E. coli</i>	Avec ou sans	$\pm$ S9 : 19,54, 39,07, 78,13, 156,25, 312,5, 625 $\mu$ g/boîte	Même aux concentrations maximales, le malate de sunitinib ne s'est pas révélé mutagène à l'épreuve d'Ames avec ou sans activation.
Test du micronoyau in vitro	002101	Lymphocytes humains circulants	s.o.	+S9 : 1,0070,0 $\mu$ g/mL -S9 : 1,00-59,9 $\mu$ g/mL	Le malate de sunitinib n'a pas provoqué d'aberrations structurales des chromosomes avec ou sans S9 à toutes les concentrations. Le malate de sunitinib a entraîné des aberrations numériques aux concentrations de 9,73-19,8 $\mu$ g/mL en présence de S9 et à 12,0 $\mu$ g/mL en l'absence de S9.
Test du micronoyau in vivo	002101, 002103	Cellules médullaires osseuses de rats (in vivo)	s.o.	250, 750, 1500 mg/kg	Le malate de sunitinib n'a pas provoqué la formation de micronoyaux dans les érythrocytes polychromatiques de moelle osseuse de rats ayant reçu jusqu'à 1500 mg/kg. On a donc jugé, à l'issue de cette épreuve, que le malate de sunitinib n'exerçait pas d'effet clastogène.

s.o. : sans objet; S. : Salmonella'; E. : Escherichia

- a. Fraction S-9 d'un homogénat de foie de rats Sprague-Dawley mâles, traitée par un inducteur (Aroclor).

## Cancérogénicité

Le potentiel carcinogène du malate de sunitinib a été évalué in vivo chez la souris et le rat (*voir le tableau 18 et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS*).

Lors d'une étude de détermination des doses d'une durée de 1 mois menée chez des souris transgéniques rasH2, avec administration quotidienne continue du produit par gavage (0, 10, 25, 75 ou 200 mg/kg/jour), des cas d'hyperplasie épithéliale de la partie non glandulaire de l'estomac et d'hyperplasie de la muqueuse glandulaire de l'estomac, ainsi que des cas de cancer et d'hyperplasie des glandes de Brunner (duodénum) ont été observés à la plus forte dose évaluée (200 mg/kg/jour).

Dans une étude de cancérogénicité de 6 mois, des doses de 0, 8, 25 et 75 (ramenée à 50) mg/kg/jour ont été administrées à des souris transgéniques rasH2 par gavage oral. Des cas de cancer gastroduodéal et d'hyperplasie de la muqueuse gastrique de même qu'une incidence d'angiosarcomes supérieure à celle attendue ont été observés après 1 et 6 mois de traitement à des doses  $\geq 25$  mg/kg/jour ( $\geq 7,3$  fois l'ASC obtenue chez les patients recevant la DQR). Il n'y a pas eu d'altérations prolifératives chez ces souris à la dose de 8 mg/kg/jour ( $\geq 0,7$  fois l'ASC obtenue chez les patients recevant la DQR).

Dans une étude de cancérogénicité de 2 ans menée chez le rat, l'administration du malate de sunitinib (0, 0,33, 1 ou 3 mg/kg/jour) selon des cycles de 28 jours suivis de périodes de 7 jours sans médicament a été associée à des carcinomes des glandes de Brunner et à une augmentation de la fréquence d'hyperplasie et de phéochromocytomes médullosurrénaux chez les rats mâles qui avaient reçu 3 mg/kg/jour pendant plus d'un an ( $\geq 7,8$  fois l'ASC obtenue chez les patients traités à la DQR). Les cas de carcinomes des glandes de Brunner sont survenus aux doses  $\geq 1$  mg/kg/jour chez les femelles et à la dose de 3 mg/kg/jour chez les mâles, et une hyperplasie des cellules muqueuses a été observée dans la partie glandulaire de l'estomac chez les mâles à la dose de 3 mg/kg/jour ( $\geq 0,9$ ; 7,8 et 7,8 fois l'ASC obtenue chez les patients traités à la DQR, respectivement).

La pertinence de ces observations chez l'être humain reste à confirmer.

**Tableau 18. CANCÉROGÉNITÉ**

Espèce/souche	Nbre/groupe	Dose (mg/kg/jour)	Voie	Durée	Résultats/observations
CB6F1/Jic-TgrasH2@ Tac	25-45 M; 25-45 F	8, 25, 75/50a	Orale	6 mois	On a observé des carcinomes gastroduodénaux (y compris des glandes de Brunner) et des cas d'hyperplasie des cellules de la muqueuse gastrique ainsi qu'une hausse de la fréquence d'hémangiosarcomes spléniques et utérins aux doses $\geq 25$ mg/kg/jour. D'autres signes microscopiques en l'absence de prolifération ont été notés dans la moelle osseuse, le foie, les reins, les ovaires, le pancréas et le thymus aux doses $\geq 25$ mg/kg/jour. La dose sans effet au chapitre des variations prolifératives était de 25 mg/kg/jour chez les mâles et de 8 mg/kg/jour chez les femelles.
Rat/Crl:	60-70	0,33,	Orale	2 ans	On a observé des cas de carcinomes du duodénum (y compris des

CD (SD)	M; 60-70 F	1,0, 3,0			glandes de Brunner) et d'hyperplasie des cellules de la muqueuse gastrique ainsi qu'une hausse de la fréquence de phéochromocytomes médullosurréaliens aux doses $\geq 1,0$ mg/kg/jour. D'autres signes microscopiques en l'absence de prolifération ont été observés dans les glandes surrénales, les reins, la glande parathyroïde, la moelle osseuse, l'estomac et le thymus aux doses $\geq 0,33$ mg/kg/jour. La dose sans effet au chapitre des variations prolifératives était de 1,0 mg/kg/jour chez les mâles et de 0,33 mg/kg/jour chez les femelles.
---------	---------------	----------	--	--	--

a La dose de 75 mg a été ramenée à 50 mg après un bref congé thérapeutique d'environ 6 semaines chez les mâles et de 9 semaines chez les femelles en raison d'une mortalité excessive ou de signes d'intolérance.

### **Toxicologie de la reproduction et tératologie**

Même si malate de sunitinib n'a pas altéré la fécondité des rats, il peut nuire à la fécondité humaine ( voir le tableau 19 et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS). On n'a observé aucun effet de malate de sunitinib sur la reproduction de rats mâles ayant reçu 1, 3 ou 10 mg/kg/jour du médicament durant 58 jours avant de s'accoupler avec des femelles non traitées. Les indices de fécondité, de copulation et de conception ainsi que la qualité des spermatozoïdes (morphologie, concentration et motilité) n'ont pas été affectés par le malate de sunitinib à des doses  $\leq 10$  mg/kg/jour (la dose de 10 mg/kg a généré une ASC moyenne équivalant à environ 25,8 fois l'exposition générale au médicament chez des patients recevant la dose recommandée chez l'humain [DRH] de 50 mg/jour). Des rates ont reçu 0,5, 1,5 ou 5 mg/kg/jour durant 14 jours avant de s'accoupler à des mâles non traités. On n'a observé aucun effet sur la fécondité des rates aux doses  $\leq 5$  mg/kg/jour (la dose de 5 mg/kg a généré une ASC moyenne équivalant à environ 5 fois l'exposition générale au médicament chez des patients recevant la DRH).

À l'issue d'une étude toxicologique de 3 mois, on a décelé des effets sur l'appareil reproducteur des guenons tels que des altérations ovariennes (baisse du développement folliculaire) à la dose de 12 mg/kg/jour (associée à une ASC moyenne équivalant à environ 5,1 fois l'exposition générale au médicament chez des patients recevant la DRH), des altérations utérines (atrophie de l'endomètre) à des doses  $\geq 2$  mg/kg/jour (associée à une ASC moyenne équivalant à environ 0,4 fois l'exposition générale au médicament chez des patients recevant la DRH). Au cours d'une étude de 9 mois chez le singe, outre des effets utérins et ovariens, on a décelé une atrophie vaginale à la dose de 6 mg/kg/jour (associée à une ASC moyenne équivalant à environ 0,8 fois l'exposition générale au médicament chez des patients recevant la DRH).

On a évalué le potentiel tératogène du malate de sunitinib chez des rates et des lapines gravides. Chez les rats, on a observé une mortalité embryonnaire et des malformations congénitales à la dose de 5 mg/kg/jour (associée à une ASC moyenne équivalant à environ 5,5 fois l'exposition générale au médicament chez des patients recevant la DRH). Chez les lapins, on a observé une mortalité embryonnaire à la dose de 5 mg/kg/jour ainsi que des malformations congénitales aux doses  $\geq 1$  mg/kg/jour (la dose de 1 mg/kg a généré une ASC moyenne équivalant à environ 0,3 fois l'exposition générale au médicament chez des patients recevant la DRH). On a notamment observé une hausse du taux de malformations du squelette chez le fœtus de rats. Chez les lapins, on a observé des fentes labiales à la dose de 1 mg/kg/jour et des fentes labio-palatines à la dose de 5 mg/kg/jour (associée à une ASC moyenne équivalant à environ 2,7 fois l'exposition générale au médicament chez des patients recevant la DRH). On n'a observé aucune mortalité fœtale ni malformation chez les rats qui ont reçu  $\leq 3$  mg/kg/jour (associée à une ASC moyenne



équivalant à environ 2,3 fois l'exposition générale au médicament chez des patients recevant la DRH).

On a évalué le développement prénatal et postnatal des rejetons de rates gravides exposées à des doses de 0,3, de 1,0 et de 3,0 mg/kg/jour de sunitinib. Le gain de poids des rates a diminué pendant la gestation et la lactation aux doses  $\geq 1$  mg/kg/jour, mais aucun effet toxique sur la reproduction n'a été observé jusqu'à concurrence de 3 mg/kg/jour (exposition estimée à plus de 2,3 fois l'ASC obtenue chez des patients recevant la DQR). Une diminution du poids des rejetons a été constatée à la dose de 3 mg/kg/jour avant et après le sevrage. Aucun effet toxique sur le développement n'a été observé à la dose de 1 mg/kg/jour (exposition approchant 0,9 fois l'ASC calculée chez les patients ayant reçu la DQR).

Tableau 19. TOXICOLOGIE DE LA REPRODUCTION ET TÉRATOLOGIE						
Nature de l'étude	Espèce/souche	Voie	Doses (mg/kg/jour)	Durée d'administration	Nbre/sexes/groupe	Résultats/observations
Fécondité et développement embryonnaire (segment I)	Rat/Crl: CD (SD) IGS BR	orale	0,1, 0,3, 1, 3, 10 (mâles) <sup>a</sup> 0,5, 1,5, 5,0 <sup>a</sup> (femelles)	Mâles > 70 jours Femelles 14 jours à G7	22 M 22 F	Mortalité chez les mâles à 10 mg/kg/jour, mais la morphologie, la concentration et la motilité des spermatozoïdes n'ont pas été altérées par le traitement. On a observé une hausse du nombre moyen de morts fœtales chez les rats à la dose de 5 mg/kg/jour. On n'a observé aucune malformation aux doses de 0,5 ou de 1,5 mg/kg/jour. On a jugé que la DSENO se situait à 5 mg/kg/jour pour la toxicité maternelle, à 1,5 mg/kg/jour pour la toxicité sur la fonction reproductrice de la femelle et à 3,0 mg/kg/jour pour la toxicité générale et la toxicité sur la fonction reproductrice du mâle.
Développement embryofœtal (segment II)	Rat/Crl: CD (SD) IGS BR Rat/Crl: CD (SD) IGS BR Lapin/blanc de Nouvelle-Zélande	orale	0,3, 1,5, 3, 5 <sup>a</sup> 1, 5, 15, 30 <sup>a</sup> 0,5, 1, 5, 20 <sup>a</sup>	12 jours (G6-17) 12 jours (G6-17) 14 jours (G7-20)	22F 8F 6F	Chez les rats, on a observé une mortalité embryonnaire et des malformations congénitales à 5 mg/kg/jour. Chez le lapin, on a observé une mortalité embryonnaire à 5 mg/kg/jour et des malformations congénitales à > 1 mg/kg/jour. La dose de 5 mg/kg/jour s'est révélée la DSENO pour la toxicité maternelle chez le rat et celle de 1 mg/kg/jour, la DSENO chez le lapin. La DSENO pour l'effet tératogène s'établissait à 3 mg/kg/jour chez le rat et à 0,5 mg/kg/jour chez le lapin.

Développement prénatal et postnatal (segment III)	Rat/Crl: CD (SD)	orale	0,3, 1, 3*	Environ 35 jours (G6-L20)	20F	Un effet toxique sur le développement des rats F 1 a été observé à la dose de 3 mg/kg/jour, de même qu'une diminution du poids moyen tout au long de la période précédant le sevrage, diminution qui a persisté après le sevrage chez les mâles. À des doses pouvant atteindre 3 mg/kg/jour, le malade de sunitinib n'a eu aucun effet sur la fonction et le développement réflexifs de même que sur l'activité motrice, l'apprentissage, la mémoire, le développement sexuel et la fonction reproductrice des rejets F 1. La DSENO pour le développement des rejets F1 s'établissait à 1 mg/kg/jour.
M : mâle; F : femelle; DSENO : dose sans effet nocif observable; G : jour de gestation; L : jour de lactation						

a On a évalué le L-malade de SU011248 et de SU010398.

Étant donné que l'angiogenèse est une composante cruciale du développement embryofœtal, l'inhibition de ce processus par malade de sunitinib peut avoir des effets indésirables sur la grossesse (**voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**).

### Emploi chez l'enfant

On n'a pas établi l'innocuité ni l'efficacité de malade de sunitinib chez l'enfant (**voir INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE et TOXICOLOGIE**). Cependant, on a observé des cas de dysplasie pharyngée chez des macaques cynomolgus dont les cartilages de conjugaison n'étaient pas calcifiés après l'administration durant  $\geq 3$  mois de doses de malade de sunitinib  $\geq 2$  mg/kg/jour (la dose de 2 mg/kg/jour a généré une ASC moyenne équivalant à environ 0,45 fois la DRH d'après l'exposition générale). Au cours des études de 13 semaines chez le rat, on a observé des anomalies osseuses chez des rats en phase de croissance : épaissement du cartilage épiphysaire du fémur et hausse des fractures tibiales à la dose de 5 mg/kg/jour (cette dose a généré une ASC moyenne équivalant à environ 3,3 fois l'exposition générale chez des patients recevant la DRH). On a observé des bris d'incisives chez les rats traités durant  $\geq 4$  semaines à la dose de 5 mg/kg/jour (cette dose a généré une ASC moyenne équivalant à environ 3,3 fois l'exposition générale chez des patients recevant la DRH) ainsi que des caries à la dose de 6 mg/kg/jour durant une étude de 6 mois (cette dose a généré une ASC moyenne équivalant à environ 7,2 fois l'exposition générale chez des patients recevant la DRH). Les effets dentaires ne se sont pas révélés réversibles; en revanche, la dysplasie pharyngée, dont l'incidence et la gravité sont fonction de la dose, s'est révélée réversible avec l'arrêt du traitement.

## RÉFÉRENCES

1. Brooklyn T. *et al.* Diagnosis and Treatment of Pyoderma Gangrenosum. *BMJ*2006; 333: 181-4.
2. Demetri GD, van Oosterom AT, Garrett CR, *et al.* Efficacy and safety of sunitinib in patients with advanced gastrointestinal stromal tumour after failure of imatinib : a randomised controlled trial. *Lancet*2006, Oct 14; 368(9544): 1329-38.
3. Demetri GD, Heinrich MC, Fletcher JA, *et al.* Molecular target modulation, imaging, and clinical evaluation of gastrointestinal stromal tumor patients treated with sunitinib malate after imatinib failure. *Clin Cancer Res* 2009 Sep 15;15(18):5902-9. *Epub* 2009 Sep 8.
4. De Mulder PH, *et al.* A phase II study of sunitinib administered in a continuous daily regimen in patients with cytokine-refractory metastatic renal cell carcinoma (mRCC). *J Clin Oncol* 2006;24(18S Pt 1):223s [résumé].
5. Faivre S, *et al.* Safety, pharmacokinetic and antitumor activity of SU11248, a novel oral multitarget tyrosine kinase inhibitor, in patients with cancer. *J Clin Oncol* 2006;24(1):25- 35.
6. George S, *et al.* Phase II study of sunitinib administered in a continuous daily dosing regimen in patients (pts) with advanced GIST. *J Clin Oncol* 2006;24(18S Pt 1):527s [résumé].
7. Hall PS, Kancherla K, Sastry PS, *et al.* Severe Epistaxis with Tyrosine Kinase Inhibitors. *Clinical Oncology* 2008; 4: 318.
8. Janeway KA, *et al.* Sunitinib treatment of pediatric metastatic GIST after failure of imatinib. *J Clin Oncol*2006;24(18S Pt 1):524s [résumé].
9. Khakoo AY, Kassiotis CM, Tannir N, Plana JC, Halushka M, Bickford C, *et al.* Heart Failure Associated with Sunitinib Malate. *Cancer* 2008; 112(11): 2500-2508.
10. Khosravan R, Toh M, Garrett M, La Fargue J, *et al.* Pharmacokinetics and Safety of Sunitinib Malate in Subjects With Impaired Renal Function. *J Clin Pharm* 2009 2010; 50: 472-481.
11. Kulke MH, Lenz H-F, Meropol NJ, Posey J, Ryan DP, *et al.* Activity of Sunitinib in Patients With Advanced Neuroendocrine Tumors. *J Clin Oncol* 2008; 26:3403-3410.
12. Machiels JP, Bletard N, Pirenne P, Jacquert L, Bonbled F, & Duck L. Acute cardiac failure after sunitinib, letter to the editor. *Annals of Oncology* 2008; 19:598-599.
13. Mendel DB, Laird AD, Xin X, *et al.* In vivo antitumour activity of SU11248, a novel tyrosine kinase inhibitor targeting vascular endothelial growth factor and platelet-derived growth factor receptors: Determination of a pharmacokinetic/pharmacodynamic relationship. *Clin Canc Res* 2003;9(1):327-37.
14. Motzer RJ *et al.* Overall survival and updated results for sunitinib compared with interferon alfa in patients with metastatic renal cell carcinoma. *J Clin Oncol* 2009; 27:1-7.
15. Motzer RJ, *et al.* Sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma. *JAMA* 2006;295(21):2516-24.
16. Motzer RJ, *et al.* Activity of SU11248, a multitargeted inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor and platelet-derived growth factor receptor, in patients with metastatic renal cell carcinoma. *J Clin Oncol* 2006;24(1):16-24.
17. Motzer RJ, *et al.* Sunitinib malate for the treatment of solid tumours: a review of current clinical data. *Expert Opin InvestigDrugs* 2006;15(5):553-61.
18. O'Farrell AM, Abrams, TJ, Yuen HA, *et al.* SU11248 is a novel FLT3 tyrosine kinase inhibitor with potent activity *in vitro* and *in vivo*. *Blood*2003;101(9):3597-605.
19. Osusky KL, Hallahan, DE, Fu A, *et al.* The receptor tyrosine kinase inhibitor SU11248 impedes

- endothelial cell migration, tubule formation, and blood vessel formation *in vivo*, but has little effect on existing tumour vessels. *Angiogenesis* 2004;7(3):225-33.
20. Pietras K, Hanahan D. A multitargeted, metronomic, and maximum-tolerated dose “chemo-switch” regimen is antiangiogenic, producing objective responses and survival benefit in a mouse model of cancer. *J Clin Oncol* 2005;23(5):939-52.
  21. Reddy K. Phase III study of sunitinib malate SU11248 versus interferon-alpha as first-line treatment in patients with metastatic renal cell carcinoma. *Clin Genitourin Cancer* 2006;5(1):23-5.
  22. Sakamoto KM. SU-11248 Sugén. *Curr Opin Investig Drugs* 2004;5(12):1329-39.
  23. Schueneman A. J, Himmelfarb, E, Geng, L, *et al.* SU11248 maintenance therapy prevents tumour regrowth after fractionated irradiation of murine tumour models. *Cancer Res* 2003;63(14):4009-16.
  24. Tamaskar RN, Salas N, Rini BI, *et al.* Thyroid function tests (TFTs) abnormalities in patients (pts) with metastatic renal cell carcinoma (mRCC) treated with sunitinib. *J Clin Oncol* 2006;24(18S Pt 1):242s [résumé].
  25. Raymond E, Dahan L, Raoul J-L, *et al.* Sunitinib Malate for the Treatment of Pancreatic Neuroendocrine Tumors. *New Eng J Med.* 2011; 364(6):501-513.
  26. SUTENT (Capsules de Sunitinib) Monographie de produit. Pfizer Canada ULC Numéro de contrôle de la présentation : 226908, Date de révision : 11 juillet 2019.

### PARTIE III: RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

#### Pr Eugia-Sunitinib Capsules de sunitinib

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de la « monographie de produit » publiée par suite de l'homologation d'Eugia-Sunitinib pour la vente au Canada, et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet d' Eugia-Sunitinib. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec un membre de votre équipe soignante.

#### AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

##### Les raisons d'utiliser ce médicament :

Eugia-Sunitinib est un médicament qui se prend par la bouche pour traiter trois types de cancer :

1. les tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI), une forme de cancer qui attaque l'estomac et l'intestin. Ces tumeurs sont causées par la croissance désordonnée des tissus qui soutiennent ces organes.
2. le cancer du rein qui s'est propagé dans d'autres parties du corps.
3. les tumeurs neuroendocrines pancréatiques (un type de cancer rare qui prend naissance dans le pancréas endocrine). On a recours à Eugia-Sunitinib quand le cancer ne peut pas être opéré.

##### Les effets de ce médicament :

Eugia-Sunitinib cible spécifiquement l'action de certaines enzymes appelées tyrosine kinases. Ces enzymes jouent un rôle déterminant dans la transmission de signaux biochimiques indispensables à des processus cellulaires fondamentaux. En empêchant la croissance des vaisseaux sanguins dans les tissus adjacents à une tumeur solide, Eugia-Sunitinib bloque la prolifération des cellules cancéreuses.

##### Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Vous ne devez pas prendre Eugia-Sunitinib :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au

sunitinib ou à n'importe lequel des ingrédients non médicinaux entrant dans sa composition (voir la liste dans « Les ingrédients non médicinaux importants »).

- Si vous êtes enceinte.

##### L'ingrédient médicinal :

L'ingrédient actif est le sunitinib (sous forme de sel de malate).

##### Les ingrédients non médicinaux importants :

Les ingrédients non médicinaux sont le mannitol, la croscarmellose sodique, la polyvidone et le stéarate de magnésium.

##### Les formes de dosage dans lesquelles il se présente :

Eugia-Sunitinib est disponible sous forme de capsules de gélatine dure contenant 12,5 mg ; 25 mg ; 37,5 mg ou 50 mg de sunitinib (sous forme de malate de sunitinib). Eugia-Sunitinib est disponible en flacons de 28 capsules et en plaquettes thermoformées de 7 capsules.

12,5 mg capsules: Granules jaunes à orange remplis dans un capuchon rouge opaque et un corps rouge opaque portant l'inscription « S 12.5 » sur le corps à l'encre blanche et un capuchon uni, taille « 4 », capsules en gélatine dure.

25 mg capsules: Granules jaunes à oranges remplies dans un capuchon opaque vert olive et un corps opaque rouge imprimé « S25 » sur le corps à l'encre blanche et capuchon uni, taille « 3 », capsules en gélatine dure.

37,5 mg capsules: Granules jaunes à oranges remplies dans un capuchon opaque vert clair et un corps opaque vert clair portant l'inscription « S37.5 » sur le corps à l'encre noire et un capuchon uni, taille « 3 », capsules en gélatine dure.

50 mg capsules: Granules jaunes à oranges remplies dans un capuchon opaque vert olive et un corps opaque vert olive imprimé « S50 » sur le corps à l'encre noire et un capuchon uni, taille « 2 », capsules en gélatine dure.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

**Mises en garde et précautions importantes**

**Les patients traités par Eugia-Sunitinib devraient être suivis par un médecin expérimenté dans le traitement médicamenteux du cancer.**

**Des effets secondaires graves ont été signalés lors de l'emploi d' Eugia-Sunitinib, notamment :**

- **de rares cas d'hémorragie tumorale (tumeur qui saigne);**
- **une diminution de la quantité de sang pompée par le cœur (mauvais fonctionnement du ventricule gauche), parfois mortelle;**
- **une hausse de la pression sanguine;**
- **une prolongation de l'intervalle QT (Eugia-Sunitinib peut perturber le rythme cardiaque), parfois mortelle;**
- **des troubles du muscle cardiaque (cardiomyopathie), parfois mortels ;**
- **des caillots de sang dans les poumons, parfois mortels ;**
- **des lésions aux plus petits des vaisseaux sanguins (microangiopathie thrombotique), y compris des cas mortels;**
- **des caillots de sang dans les artères, qui peuvent entraîner des accidents vasculaires cérébraux ou des crises cardiaques, parfois mortels;**
- **des troubles musculaires (myopathie et/ou rhabdomyolyse), parfois mortels;**
- **une insuffisance rénale, parfois mortelle;**
- **des troubles graves du foie, parfois mortels;**
- **un syndrome réversible de leucoencéphalopathie postérieure (problème neurologique), parfois mortel;**
- **une accumulation de liquide entre les couches de tissu des poumons et de la cavité thoracique (épanchement pleural), parfois mortelle.**

**Eugia-Sunitinib n'a pas été évalué chez des patients présentant de s évères problèmes du foie.**

Eugia-Sunitinib a un effet sur l'activité électrique du cœur. Cet effet peut se manifester par une modification de l'électrocardiogramme (ECG) et peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. Ces troubles sont plus probables en présence de facteurs de risque tels qu'une maladie du cœur ou durant l'emploi simultané de certains médicaments qui peuvent interagir avec Eugia-Sunitinib. Si vous vous sentez étourdi, faible, sur le point de vous évanouir ou

si vous éprouvez une sensation de vertige et que votre pouls est irrégulier ou anormalement lent ou rapide, cessez de prendre Eugia-Sunitinib et consultez immédiatement un médecin. Il est important que vous suiviez les instructions du médecin au sujet de la posologie ou des tests à subir.

On a signalé des cas de syndrome de lyse tumorale au cours du traitement par Eugia-Sunitinib. Le syndrome de lyse tumorale est un trouble du métabolisme causé par la destruction des cellules cancéreuses. Il est associé à des changements biochimiques dans le sang qui peuvent entraîner une insuffisance rénale et un rythme cardiaque anormal dont l'issue peut être mortelle. Avisez immédiatement votre médecin si vous éprouvez des palpitations ou des battements de cœur irréguliers; si vous avez des vomissements; si vous ressentez de la fatigue ou une faiblesse; si vous avez de la difficulté à vous concentrer ou à penser clairement; si vous remarquez une enflure, des engourdissements ou des picotements aux mains, au visage ou aux pieds; si vous éprouvez des douleurs au dos ou des crampes musculaires; si vous avez des évanouissements ou de la difficulté à respirer.

Les réactions suivantes ont été signalées durant l'emploi d' Eugia-Sunitinib:

- infections des tissus mous (notamment de la région ano-génitale) potentiellement mortelles (fasciite nécrosante);
- ulcères cutanés douloureux (pyodermite gangréneuse);
- cholécystites (inflammation de la vésicule biliaire), mortelles dans certains cas;
- éruptions cutanées sévères, menaçant parfois la vie du patient (syndrome de Stevens-Johnson, érythrodermie bulleuse avec épidermolyse, érythème polymorphe);
- lésions aux plus petits des vaisseaux sanguins (microangiopathie thrombotique), y compris des cas mortels.

**Si l'une des situations suivantes s'applique ou s'est déjà appliquée à votre cas, vous devez en informer votre médecin avant de prendre Eugia-Sunitinib :**

- Vous souffrez de problèmes de la thyroïde.
- Vous souffrez de problèmes des glandes surrénales.
- Vous souffrez, ou avez souffert, de douleurs ou d'une faiblesse dans les muscles.
- Vous avez des problèmes de coagulation.
- Vous souffrez, ou avez souffert, d'un

## IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

- problème du foie ou des reins.
- Vous souffrez d'hypertension artérielle (haute pression) et de complications liées à celle-ci, par exemple une séparation des couches de la paroi d'une artère (dissection artérielle).
  - Vous êtes une femme et vous êtes enceinte ou pensez l'être. Eugia-Sunitinib ne doit pas être pris pendant la grossesse. Les femmes qui sont aptes à devenir enceintes doivent employer une méthode de contraception efficace pendant qu'elles suivent un traitement par Eugia-Sunitinib.
  - Vous êtes une femme qui allaite.
  - Vous avez récemment subi une intervention chirurgicale ou une blessure, ou souffert d'une infection sévère. Eugia-Sunitinib peut avoir un effet sur la guérison des plaies.
  - Vous souffrez de troubles cardiaques.
  - Vous avez des antécédents d'accident vasculaire cérébral.
  - Vous avez des antécédents d'évanouissements.
  - Vous présentez ou avez déjà présenté les symptômes suivants : douleurs dans la bouche, aux dents et/ou aux mâchoires; enflure ou lésions dans la bouche; sensation d'engourdissement ou de lourdeur aux mâchoires; dent branlante.
  - Vous devez subir un traitement dentaire invasif ou une chirurgie dentaire, en particulier si vous recevez ou avez déjà reçu des bisphosphonates par voie intraveineuse (médicaments qui renforcent les os et que vous pourriez avoir reçu pour traiter une autre affection).
  - Vous présentez des antécédents familiaux de mortalité d'origine cardiaque avant l'âge de 50 ans.
  - Vous êtes un homme et prévoyez avoir un enfant.

### Emploi chez les enfants (moins de 18 ans) :

Comme on possède très peu d'expérience sur l'emploi d'Eugia-Sunitinib chez les enfants, cet agent n'est pas recommandé chez cette population de patients.

### Contraception :

Comme Eugia-Sunitinib peut avoir des effets néfastes sur l'enfant à naître, les femmes capables d'avoir un enfant doivent utiliser un moyen de contraception

efficace pendant leur traitement par Eugia-Sunitinib. Et parce qu'Eugia-Sunitinib peut se retrouver dans le sperme, les patients de sexe masculin qui n'ont pas subi de vasectomie doivent, eux aussi, accepter d'avoir recours à un moyen de contraception efficace pendant leur traitement par Eugia-Sunitinib pour éviter que leur partenaire tombe enceinte.

Pendant votre traitement par Eugia-Sunitinib, consultez sans tarder votre médecin si vous croyez être enceinte.

### Conduite automobile et utilisation d'engins dangereux :

Si vous éprouvez des étourdissements, ne prenez pas le volant et ne manœuvrez pas de machines.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

### Prise simultanée d'autres médicaments :

Si vous prenez d'autres médicaments, y compris des médicaments vendus sans ordonnance et des produits de santé naturels, informez-en votre médecin, car ceux-ci pourraient interagir avec Eugia-Sunitinib. Ces produits peuvent accroître la concentration d'Eugia-Sunitinib dans votre sang, ce qui pourrait entraîner une augmentation des effets indésirables d'Eugia-Sunitinib. Par exemple :

- Antifongiques (tels que le kétoconazole et le fluconazole)
- Bloqueurs des canaux calciques (tels que le diltiazem et le vérapamil)
- Antibiotiques macrolides (tels que l'érythromycine et la clarithromycine)
- Antibiotiques de la famille des fluoroquinolones (tels que la ciprofloxacine et la norfloxacine)
- Certains antiviraux (tels que le ritonavir et l'indinavir)
- Produits à base de plantes médicinales (tels que le millepertuis commun)

De plus, voici une liste partielle de médicaments qui peuvent interagir avec Eugia-Sunitinib et modifier l'activité électrique du cœur :

- Antiarythmiques (stabilisateurs du rythme cardiaque, comme la procainamide, la quinidine, l'amiodarone, le sotalol, etc.)
- Antidépresseurs (régulateurs de l'humeur)
- Antipsychotiques (stabilisateurs de la pensée)

## IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

et du comportement)

- Antiasthmatiques (salmétérol)
- Substances opioïdes (p. ex, méthadone)

**Antinauséieux (p. ex, granisétron, dolasétron, ondansétron)**

### UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Vous devez suivre la posologie et les directives transmises par votre médecin.

#### Dose habituelle pour l'adulte :

TSGI et cancer du rein :

Une dose de 50 mg à prendre par la bouche une fois par jour pendant 4 semaines, suivies de 2 semaines de congé thérapeutique (pas de médicament); c'est ce qu'on appelle un schéma cyclique de 6 semaines. Le médecin déterminera le nombre de cycles de traitement approprié dans votre cas.

Tumeurs neuroendocrines pancréatiques :

Une dose de 37,5 mg à prendre par la bouche une fois par jour.

Eugia-Sunitinib peut être pris avec ou sans nourriture. Ne buvez pas de jus de pamplemousse pendant votre traitement par Eugia-Sunitinib, car cela peut faire augmenter la concentration de médicament dans le sang.

#### Surdose:

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop d'Eugia-Sunitinib, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

#### Dose oubliée :

Si vous avez oublié de prendre une dose de médicament, ne prenez pas deux doses en même temps la fois suivante pour compenser.

### EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Comme tous les médicaments, Eugia-Sunitinib peut causer des effets secondaires, qui sont en général

d'intensité légère ou modérée. Eugia-Sunitinib peut altérer le fonctionnement des glandes surrénales (qui règlent la réponse de l'organisme à certains stress tels qu'une intervention chirurgicale, une blessure ou une infection sévère).

*Effets secondaires très fréquents (c'est-à-dire qui risquent de se produire chez plus de 10 personnes sur 100) :*

- Fatigue
- Baisse du nombre de globules blancs et de plaquettes dans le sang
- Hausse de la pression sanguine
- Douleurs ou irritation de la bouche, altération du goût, maux d'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, douleur abdominale, sécheresse de la bouche, saignement
- Changement de couleur de la peau dû à la couleur du malade de sunitinib (jaune), changement de couleur des cheveux, éruptions cutanées ou ampoules sur la paume des mains et la plante des pieds, sécheresse de la peau
- Maux de tête

*Effets secondaires fréquents (c'est-à-dire qui risquent de se produire chez 1 à 10 personnes sur 100) :*

- Étourdissements, faiblesse
- Perte d'appétit
- Infection
- Brûlures d'estomac
- Accumulation de liquide entre les couches de tissu des poumons et de la cavité thoracique

**Si jamais l'un de ces effets secondaires devient particulièrement grave ou que vous éprouvez un effet indésirable qui ne figure pas dans ce feuillet, faites-le savoir à votre médecin.**

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE			
Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien
	Seulement dans les cas sévères	Dans tous les cas	
Saignements (sang dans les selles ou les		✓	



**IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT**

<b>EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE</b>			
<b>Symptôme / effet</b>	<b>Consultez votre médecin ou votre pharmacien</b>		<b>Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien</b>
	<b>Seulement dans les cas sévères</b>	<b>Dans tous les cas</b>	
urines, saignements de nez) et infections			
Pancréatite (inflammation du pancréas) avec des symptômes tels que : douleur abdominale, fièvre, nausées et vomissements		✓	
Baisse de la fonction thyroïdienne (hypothyroïdie) avec des symptômes tels que : fatigue, constipation, sécheresse de la peau et gain de poids		✓	
Augmentation de la fonction thyroïdienne (hyperthyroïdie et certaines formes de thyroïdite) avec des symptômes tels que : perte de poids, transpiration et irritabilité		✓	
Réduction de la quantité de sang éjecté par le cœur avec des symptômes tels que : essoufflement et fatigue, enflure des pieds et des chevilles		✓	
Baisse du nombre de globules blancs et de plaquettes dans le sang avec des symptômes tels que : infection, fièvre et saignements		✓	

<b>EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE</b>			
<b>Symptôme / effet</b>	<b>Consultez votre médecin ou votre pharmacien</b>		<b>Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien</b>
	<b>Seulement dans les cas sévères</b>	<b>Dans tous les cas</b>	
Douleur ou faiblesse musculaires, ou urine foncée		✓	
Symptômes de caillots de sang dans les jambes (douleur, enflure, rougeur) ou les poumons (douleur dans la poitrine, essoufflement)		✓	
Symptômes d'un éventuel trouble du rythme cardiaque, comme des étourdissements, des palpitations (perception que les battements du cœur sont trop rapides, trop forts ou irréguliers), des évanouissements ou des convulsions			✓
Signes ou symptômes de détérioration osseuse (ostéonécrose) de la mâchoire tels que : douleurs dans la bouche, aux dents et/ou aux mâchoires ; enflure ou lésions dans la bouche; sensation d'engourdissement ou de lourdeur aux mâchoires; dent branlante ou os de la mâchoire à découvert		✓	
Infection des tissus mous (notamment de la région ano-			✓

**IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT**

<b>EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE</b>			
Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien
	Seulement dans les cas sévères	Dans tous les cas	
génitale) potentiellement mortelle. Symptômes possibles : infection de la peau entourant une blessure ou une plaie, fièvre, douleur, enflure, écoulement de pus ou de sang			
Problèmes de foie accompagnés de symptômes tels que : démangeaisons, coloration jaune des yeux ou de la peau, urines foncées et douleur ou inconfort dans la partie supérieure droite de l'estomac		✓	
Ulcères cutanés douloureux (pyodermite gangréneuse)		✓	
Éruptions cutanées sévères pouvant être mortelles. Initialement, elles peuvent apparaître sur le tronc, sous forme de taches rougeâtres ressemblant à une cible ou de plaques rondes avec une cloque au centre. L'éruption peut évoluer vers la formation de cloques à différents endroits du corps, dont la bouche, la			✓

<b>EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE</b>			
Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien
	Seulement dans les cas sévères	Dans tous les cas	
desquamation (peau qui pèle) et l'apparition d'ulcères dans les yeux. Les changements cutanés surviennent rapidement, parfois après l'apparition d'une fièvre, de la fatigue, de maux de tête ou d'une toux.			
Trouble neurologique appelé « syndrome réversible de leucoencéphalopathie postérieure » se manifestant par des symptômes tels que : maux de tête, convulsions, léthargie, confusion et cécité (perte de la vue) ou autres troubles visuels		✓	
Cholécystite (inflammation de la vésicule biliaire), qui peut entraîner des symptômes tels que douleur abdominale et vomissements		✓	
Faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) accompagné de symptômes tels que la transpiration, la faim, des tremblements, de la faiblesse et des palpitations, qui peuvent mener à un évanouissement et à			✓

<b>EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE</b>			
Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien
	Seulement dans les cas sévères	Dans tous les cas	
des convulsions dans certains cas			
Dommages aux plus petits des vaisseaux sanguins (microangiopathie thrombotique) pouvant survenir à l'intérieur des organes comme les reins et le cerveau. Ces dommages peuvent être causés par la formation de caillots dans les petits vaisseaux sanguins et des lésions aux globules rouges (purpura thrombocytopénique thrombotique et syndrome hémolytique et urémique). Les symptômes comprennent la fièvre, la fatigue, des ecchymoses, l'enflure, la confusion, une perte de vision et des crises convulsives.		✓	
Symptômes de crise cardiaque (sensation de serrement à la poitrine, essoufflement et transpiration)		✓	
Symptômes d'une accumulation de liquide entre les couches de tissu des poumons et de la		✓	

<b>EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE</b>			
Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien
	Seulement dans les cas sévères	Dans tous les cas	
cavité thoracique, dont essoufflement et serrement à la poitrine			
Dis section artérielle (apparition subite d'une douleur s évère dans le dos, la poitrine ou l'abdomen)		✓	
<b>Anévrisme artériel (dilatation localisée d'une artère dans la poitrine, le cœur, le cerveau, un bras ou une jambe) :</b> les symptômes, qui varient selon le siège, comprennent toux, toux avec expulsion de sang, douleur vive inexplicable dans le haut du cou ou le dos, difficulté à avaler, enrouement et pulsation inhabituelle dans la poitrine ou l'abdomen		✓	

*Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu lors de la prise d'Eugia-Sunitinib, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.*

**COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

- Gardez ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.
- Conservez ce médicament à la température ambiante (entre 15 et 30 °C).
- Conservez ce médicament dans son emballage

d'origine.

- Ne prenez pas ce médicament si la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette est dépassée.
- Ne prenez pas ce médicament si son emballage est endommagé ou a été ouvert.

On ne doit pas jeter de médicaments dans les égouts ni dans les ordures ménagères. Informez-vous auprès de votre pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. En agissant ainsi, vous contribuerez à préserver l'environnement.

855-648-6681.

Le présent dépliant a été préparé par  
**Eugia Pharma Inc.**  
3700 Steeles Avenue West, Suite # 402  
Woodbridge, Ontario, L4L 8K8,  
Canada.

Dernière révision: 27 mai 2024

#### **Déclaration des effets secondaires**

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par la poste ou par télécopieur; ou
- En composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.*

#### **POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>); le site Web du fabricant (<http://www.eugia.ca>), ou en téléphonant au 1-