recommend no print on short lap (except full coverage color)

Bovatec® 20

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION®

Bovatec® 20

Lasalocid Sodium Medicated Premix
Veterinary Use Only

For Feed Manufacturing Use Only
Active Ingredient:
Each kg contains 200 g (20%) of lasalocid sodium in a carrier suitable for incorporation in feed.

IMPRINT AREA NO COPY

FOR USE IN CATTLE AND LAMB FEEDS

Indications

A. For improved feed efficiency and increased rate of weight gain in feedlot cattle being fed in confinement for slaughter.
B. For increased rate of weight gain in pasture cattle (stocker, feeder cattle, and beef and dairy replacement heifers).
C. As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria bovis* and *Eimeria zuernii* in calves up to 360 kg of body weight being fed in confinement.
D. As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria ovinoidalis* (*syn. ninakohlyakimovae*) and *Eimeria ovina* in lambs fed in confinement.

Directions for Use

Indication A. For improved feed efficiency and increased rate of weight gain in feedlot cattle being fed in confinement for slaughter.

Mixing Directions
Level of Drug in Complete Diet
Thoroughly mix 180 g (0.18 kg) Bovatec® 20 Medicated Premix in 1 tonne (1,000 kg) 100% dry matter basis of diet (including roughage) to provide 36 mg of lasalocid sodium per kg.
Level of Drug in Supplements
Supplements must provide an average daily intake as follows:

Weight of cattle (kg)	Recommended lasalocid dosage (mg/head/day)	Kilograms of Bovatec® 20/tonne of supplement when fed daily at rate/head in kilograms			
		0.5 kg	1.0 kg	1.5 kg	2.0 kg
200-299	250	2.50	1.25	0.83	0.63
300 or greater	350	3.50	1.75	1.17	0.87

Thoroughly mix the supplement in the total daily diet or in the complete feed (grain portion of the ration) before use.
Feeding Directions
Feed continuously until market weight.

Indication B. For increased rate of weight gain in pasture cattle (stocker, feeder cattle, and beef and dairy replacement heifers).

Hand Fed
Hand feed continuously at the rate of 200 mg of lasalocid sodium/animal/day from the beginning to end of the pasture season. To ensure equal accessibility for cattle, feed a minimum of 0.5 kg of the Bovatec® 20 medicated supplement/head/day.

Dosage of lasalocid sodium/head/day (mg)	Daily intake of hand fed supplement (g)	Amount of Bovatec® 20 to be added per 1,000 kg of supplement (kg)
200	500	2.0
200	750	1.3
200	1,000	1.0

Thoroughly mix the supplement in the total daily diet or in the complete feed (grain portion of the ration) before use.

Free Choice Mineral
1. Bovatec 20 Medicated Premix may be used in the manufacture of medicated minerals mixes.
   Mixing Directions
   Thoroughly mix 8.0 kg of Bovatec® 20 Medicated Premix to 992 kg of mineral mix to provide 1,600 mg lasalocid sodium per kg of medicated mineral mix.
   Feeding Directions
   Bovatec® 20 medicated mineral mixes should be fed free-choice continuously from the beginning to the end of the pasture season. Aim for a consumption rate of 125 g medicated mineral mix per head per day which will provide the recommended dose of 200 mg lasalocid sodium/animal/day. Increase the distance of the medicated mineral mix from the water source to decrease consumption of the mineral mix, and vice versa.
2. Bovatec® 20 Medicated Premix may be used in the manufacture of medicated feed blocks.
   Mixing Directions
   Thoroughly mix 1.0 kg of Bovatec® 20 Medicated Premix to 999 kg of the feed block ingredients to provide 200 mg of lasalocid sodium per kg of medicated feed block.
   Feeding Directions
   A feed block with Bovatec® 20 should be fed free-choice continuously from the beginning to the end of the pasture season. Aim for a consumption rate of 1.0 kg of the medicated feed block per head per day which will provide the recommended dosage of 200 mg lasalocid sodium per animal per day.
   - Introduce a 1:1 or 2:1 (Ca:P) free-choice mineral with salt two weeks before introducing feed block with Bovatec® 20. Ensure cattle have consumed roughage before introducing feed block for the first time.
   - If cattle run out of feed block with Bovatec® 20, observe intake closely for three days after replacing the block, to prevent over consumption.
   - If consumption is too low, bring blocks closer to the watering and resting areas. In large pastures, blocks should be available in more than one location.
   - If consumption is higher than desired, move blocks further away from the watering and resting areas, and/or reduce the number of blocks available to cattle.

   Expiry Date
   Expiration of the feed block with Bovatec® 20 is 6 months from date of manufacture.

Indication C. As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria bovis* and *Eimeria zuernii* in calves up to 360 kg of body weight being fed in confinement.

Mixing Directions
Level of Drug in Complete Diet
Thoroughly mix 180 g (0.18 kg) of Bovatec® 20 Medicated Premix in 1 tonne (1,000 kg) 100% dry matter basis of diet (including roughage) to provide 36 mg of lasalocid sodium per kg.
Level of Drug in Supplements
Supplements must provide an average daily intake as follows:

Weight of cattle (kg)	Recommended lasalocid dosage (mg/head/day)	Kilograms of Bovatec® 20/tonne of supplement when fed daily at rate/head in kilograms			
		0.5 kg	1.0 kg	1.5 kg	2.0 kg
50-99	100	1.00	0.50	0.33	0.25
100-149	150	1.50	0.75	0.50	0.37
150-199	200	2.00	1.00	0.67	0.50
200-249	250	2.50	1.25	0.83	0.63
250-299	300	3.00	1.50	1.00	0.75
300-360	350	3.50	1.75	1.17	0.87

Thoroughly mix the supplement in the total daily diet or in the complete feed (grain portion of the ration) before use.
Feeding Directions
Feed continuously during periods of exposure to coccidiosis or when coccidiosis is likely to be a hazard.

Indication D. As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria ovinoidalis* (*syn. ninakohlyakimovae*) and *Eimeria ovina* in lambs being fed in confinement.

Mixing Directions
Level of Drug in Complete Diet
Thoroughly mix 180 g (0.18 kg) Bovatec® 20 Medicated Premix in 1 tonne (1,000 kg) 100% dry matter basis of diet (including roughage) to provide 36 mg of lasalocid sodium per kg.
Level of Drug in Supplements
Supplements must provide an average daily intake as follows:

Weight of lambs (kg)	Recommended lasalocid dosage (mg/head/day)	Kilograms of Bovatec® 20/tonne of supplement when fed daily at rate/head in kilograms		
		0.1 kg	0.25 kg	0.5 kg
10	10	0.50	0.19	0.10
25	25	1.25	0.50	0.25
50	50	2.50	1.00	0.50
75	75	3.75	1.50	0.75

Thoroughly mix the supplement in the total diet or in the complete (grain portion of the ration) before use.
Feeding Directions
Feed continuously during periods of exposure to coccidiosis or when coccidiosis is likely to be a hazard.

Cautions
1. Do not allow horses or other equines access to lasalocid sodium as ingestion may be fatal (required on premix and supplement labels only).
2. Do not feed Bovatec® 20 undiluted. Feeding undiluted or mixing errors resulting in excessive concentration of lasalocid sodium could be fatal to cattle. (Required on premix and supplement labels only.)
3. Compatible with bentonite, lignin sulfonate, and PEL-AID (Uniscope Inc.) when used as pellet binding agents (required on premix and supplement labels only).
4. Canadian data, generated in a field type fertility study in breeding ewes and in a formal fertility study in yearling and older rams, indicate that the recommended dosage of lasalocid sodium should not affect the reproductive performance of breeding sheep or lambs kept for breeding purposes.

Warnings
1. Treated sheep must not be slaughtered for use in food for at least 2 days after the latest treatment with this drug.
2. No withdrawal period is required for cattle when treated according to the label.
3. Keep out of reach of children.

FOR USE IN BROILER CHICKEN AND TURKEY FEEDS

Indications

A. As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria necatrix, E. tenella, E. acervulina, E. brunetti, E. mitis* and *E. maxima* in broiler chickens.
B. As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *E. adenoeides, E. meleagrimitis* and *E. gallopavonis* in growing turkeys.

Directions for Use

Indication A. As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria necatrix, E. tenella, E. acervulina, E. brunetti, E. mitis* and *E. maxima* in broiler chickens.
Mixing Directions
Thoroughly mix 525 g (0.525 kg) of Bovatec® 20 Medicated Premix in one tonne (1,000 kg) of feed to provide 105 mg of lasalocid sodium per kg in complete feed. It is recommended that Bovatec® 20 be mixed with a small quantity of the feed ingredients before it is incorporated into the batch of the feed being prepared.
Good manufacturing procedures should be followed at all times to avoid accidental contamination of any feed by lasalocid and to ensure a homogenous distribution in the diet.
Feeding Directions
Feed continuously as the sole ration.

Indication B. As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *E. adenoeides, E. meleagrimitis* and *E. gallopavonis* in growing turkeys.
Mixing Directions
Thoroughly mix 500 g (0.500 kg) of Bovatec® 20 Medicated Premix in one tonne (1,000 kg) of feed to provide 100 mg of lasalocid sodium per kg in complete feed.
Feeding Directions
Feed continuously as the sole ration from day one (1) for sixteen (16) weeks for males and fourteen (14) weeks for females.

Cautions
1. Do not use this medicated feed for treatment of outbreaks of coccidiosis.
2. Consult a veterinarian or poultry pathologist if losses exceed 0.5% in a two-day period.
3. Compatible with bentonite, lignin sulfonate, and PEL-AID (Uniscope Inc.) when used as pellet binding agents (required on premix and supplement labels only).
4. Do not allow horses or other equines access to lasalocid sodium as ingestion may be fatal (required on premix and supplement labels only).

Warnings
1. No withdrawal period is required for broiler chickens and turkeys when treated according to the label.
2. Do not feed to replacement, breeding and laying chickens and turkeys.
3. Keep out of reach of children.

IMPORTANT: MUST BE THOROUGHLY MIXED IN FEED BEFORE USE

Storage
Store in a dry place at room temperature.

Contact Information:
For technical assistance or to obtain a Safety Data Sheet(s), contact Phibro Animal Health Corporation at 888-403-0074 or www.pahc.com. To report suspected adverse drug experiences, call 1-888-475-7355.

Phibro, Phibro logo and Bovatec are trademarks owned by or licensed to Phibro Animal Health Corporation or its affiliates.

Manufactured by: Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA
Imported and Distributed by: Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4

DIN 02321939

NET 25 KG

0 66104 68009 8

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION®

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION®

Bovatec® 20

Bovatec® 20

Prémélange médicamenteux de lasalocide sodique
Usage vétérinaire seulement

Réservé à la fabrication de moulées
Ingrédient actif :
Chaque kg renferme 200 g (20 %) de lasalocide sodique dans un support propice à l'incorporation dans les aliments

POUR USAGE DANS LES ALIMENTS DES BOVINS ET DES AGNEAUX

Indications

A. Pour améliorer l'indice de conversion alimentaire et accélérer le gain de poids des bovins nourris en réclusion en parcs d'engraissement et destinés à l'abattage.
B. Pour accélérer le gain de poids des bovins de pâturage (bovins d'engraissement, génisses de boucherie et génisses laitières de replacement).
C. Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria bovis* et *Eimeria zuernii* chez les veaux d'au plus 360 kg de poids, nourris en réclusion.
D. Pour aider à prévenir la coccidiose attribuable à *Eimeria ovinoidalis* (syn. *ninakohlyakimovae*) et *Eimeria ovina* chez les agneaux nourris en réclusion.

Mode d'emploi

Indication A. Pour améliorer l'indice de conversion alimentaire et accélérer le gain de poids des bovins en parcs d'engraissement destinés à l'abattage.
Mode de préparation
Posologie dans la ration complète
Bien mélanger 180 g (0,18 kg) de prémélange médicamenteux Bovatec® 20 dans une tonne (1000 kg) d'aliment à base de matière sèche à 100 % (incluant les fourrages grossiers) afin de fournir 36 mg de lasalocide sodique par kg.
Posologie dans les suppléments
Les suppléments doivent fournir les apports quotidiens moyens suivants :

Poids des bovins (kg)	Taux de lasalocide recommandé (mg/tête/jour)	Kg de Bovatec® 20 par tonne métrique de supplément lorsque la ration par tête est de:			
		0,5 kg	1,0 kg	1,5 kg	2,0 kg
200-299	250	2,50	1,25	0,83	0,63
300 ou plus	350	3,50	1,75	1,17	0,87

Bien mélanger le supplément à la ration journalière totale ou à l'aliment complet (portion céréalière de la ration) avant de servir.
Mode d'alimentation
Servir de façon continuelle jusqu'au poids de marché.

Indication B. Pour accélérer le gain de poids des bovins de pâturage (bovins d'engraissement, génisses de boucherie et génisses laitières de replacement).
Alimentation manuelle
Nourrir à la main sur une base continue à raison de 200 mg de lasalocide sodique par animal par jour, du début jusqu'à la fin de la saison de pâturage. Pour assurer une distribution égale pour le bétail, servir un minimum de 0,5 kg de supplément médicamenteux Bovatec® 20 par tête par jour.

Quantité de lasalocide sodique par tête par jour (mg)	Apport quotidien de supplément servi à la main (g)	Quantité de Bovatec® 20 à ajouter par 1000 kg de supplément (kg)
200	500	2,0
200	750	1,3
200	1 000	1,0

Bien mélanger le supplément à la ration journalière totale ou à l'aliment complet (portion céréalière de la ration) avant de servir.
Alimentation libre choix
1) Le prémélange médicamenteux Bovatec® 20 peut être utilisé pour la fabrication de minéraux médicamenteux.
   Mode de préparation
   Bien mélanger 8,0 kg de prémélange médicamenteux Bovatec® 20 à 992 kg d'un minéral médicamenteux, afin de fournir 1600 mg de lasalocide sodique par kg de minéraux médicamenteux.
   Mode d'alimentation
   Les minéraux médicamenteux avec Bovatec® 20 devraient être servis comme alimentation libre choix sur une base continue, du début jusqu'à la fin de la saison de pâturage. Viser une consommation de 125 g de minéraux médicamenteux par animal par jour, ce qui fournira la dose recommandée de 200 mg de lasalocide sodique par animal par jour. Augmenter la distance entre le minéraux médicamenteux et la source d'eau pour diminuer la consommation du minéral et vice versa.
2) Le prémélange médicamenteux Bovatec® 20 peut être utilisé pour la fabrication des blocs médicamenteux.
   Mode de préparation
   Bien mélanger 1,0 kg de prémélange médicamenteux Bovatec® 20 à 999 kg des ingrédients du bloc, afin de fournir 200 mg de lasalocide sodique par kg de bloc médicamenteux.
   Mode d'alimentation
   Les blocs médicamenteux avec Bovatec® 20 devraient être servis en alimentation libre choix sur une base continue, du début jusqu'à la fin de la saison de pâturage. Viser une consommation de 1 kg de bloc médicamenteux par animal par jour, ce qui fournira la dose recommandée de 200 mg de lasalocide sodique par animal par jour.
   - Servir en alimentation libre choix les minéraux 1:1 ou 2:1 (Ca:P) avec sel pour deux semaines avant d'introduire un bloc médicamenteux avec Bovatec® 20. Assurez-vous que les bovins ont consommé du fourrage avant l'introduction du bloc médicamenteux avec Bovatec® 20.
   - Si les bovins manquent de bloc médicamenteux avec Bovatec® 20, observer de près la consommation pendant trois jours après le renouvellement du bloc, afin d'éviter la surconsommation.
   - Si les animaux consomment peu, amener les blocs plus près de l'abreuvoir et de l'endroit de repos. Dans les grands pâturages, prévoir plus d'un emplacement pour les blocs.
   - Si les animaux consomment trop, éloigner les blocs de l'abreuvoir et de l'endroit de repos et/ou diminuer le nombre de blocs disponibles.

Date d'expiration
La date d'expiration du bloc médicamenteux avec Bovatec® 20 est 6 mois à partir de la date de fabrication.

Indication C. Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria bovis* et *Eimeria zuernii* chez les veaux d'au plus 360 kg de poids, nourris en réclusion.
Mode de préparation
Posologie dans la ration complète
Bien mélanger 180 g (0,18 kg) de prémélange médicamenteux Bovatec® 20 dans une tonne (1000 kg) d'aliment à base de matière sèche à 100 % (incluant les fourrages grossiers) afin de fournir 36 mg de lasalocide sodique par kg.
Posologie dans les suppléments
Les suppléments doivent fournir les apports quotidiens moyens suivants :

Poids des bovins (kg)	Taux de lasalocide recommandé (mg/tête/jour)	Kg de Bovatec® 20 par tonne métrique de supplément lorsque la ration par tête est de :			
		0,5 kg	1,0 kg	1,5 kg	2,0 kg
50-99	100	1,00	0,50	0,33	0,25
100-149	150	1,50	0,75	0,50	0,37
150-199	200	2,00	1,00	0,67	0,50
200-249	250	2,50	1,25	0,83	0,63
250-299	300	3,0	1,50	1,00	0,75
300-360	350	3,50	1,75	1,17	0,87

Bien mélanger le supplément à la ration journalière totale ou à l'aliment complet (portion céréalière de la ration) avant de servir.
Mode d'alimentation
Administrer continuellement pendant les périodes où les conditions favorisent le développement de la coccidiose et l'exposition à la coccidiose.

Indication D. Pour aider à prévenir la coccidiose attribuable à *Eimeria ovinoidalis* (syn. *ninakohlyakimovae*) et *Eimeria ovina* chez les agneaux nourris en réclusion.
Mode de préparation
Posologie dans la ration complète
Bien mélanger 180 g (0,18 kg) de prémélange médicamenteux Bovatec® 20 dans une tonne (1000 kg) d'aliment à base de matière sèche à 100 % (incluant les fourrages grossiers) afin de fournir 36 mg de lasalocide sodique par kg.
Posologie dans les suppléments
Les suppléments doivent fournir les apports quotidiens moyens suivants :

Poids des agneaux (kg)	Taux de lasalocide recommandé (mg/tête/jour)	Kg de Bovatec® 20 par tonne métrique de supplément lorsque la ration par tête est de:		
		0,1 kg	0,25 kg	0,5 kg
10	10	0,50	0,19	0,10
25	25	1,25	0,50	0,25
50	50	2,50	1,00	0,50
75	75	3,75	1,50	0,75

Bien mélanger le supplément à la ration journalière totale ou à l'aliment complet (portion céréalière de la ration) avant de servir.
Mode d'alimentation
Administrer continuellement pendant les périodes où les conditions favorisent le développement de la coccidiose et l'exposition à la coccidiose.

Précautions.
1. Garder hors de portée des chevaux et autre équidés, car l'ingestion de lasalocide par ces animaux peut être fatale (mention exigée sur les étiquettes de prémélange ou de supplément seulement).
2. Ne pas servir Bovatec® 20 non dilué. L'utilisation du produit non dilué ou des erreurs de mélange, entraînant des concentrations excessives de lasalocide sodique, peuvent être fatales pour le bétail (mention exigée sur l'étiquette des prémélanges et des suppléments seulement).
3. Compatible avec la bentonite, le sulfonate de lignine et PEL-AID (Uniscope Inc.) lorsque ces produits sont utilisés comme agents liants (mention exigée sur l'étiquettes des prémélanges et des suppléments seulement).
4. Les données canadiennes provenant d'études sur le terrain portant sur la fertilité des agnelles reproductrices ainsi que d'études formelles sur la fertilité des béliers de première année et plus âgés, indique que le dosage de lasalocide sodique recommandé ne devrait pas affecter les performances reproductrices des moutons et agneaux élevés à des fins de reproduction.

Mises en garde
1. Les ovins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 2 jours après la dernière administration de ce médicament.
2. Aucun délai d'attente n'est nécessaire pour les bovins traités conformément au mode d'emploi.
3. Garder hors de la portée des enfants.

POUR USAGE DANS LES ALIMENTS DES POULETS À GRILLER ET DES DINDONS

Indications

A. Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria necatrix, E. tenella, E. acervulina, E. brunetti, E. mitis* et *E. maxima* chez les poulets à griller.
B. Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *E. adenoeides, E. meleagrimitis* et *E. gallopavonis* chez les dindons en croissance.

Mode d'emploi

Indication A. Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria necatrix, E. tenella, E. acervulina, E. brunetti, E. mitis*, et *E. maxima* chez les poulets à griller.
Mode de préparation
Bien mélanger 525 g (0,525 kg) de prémélange médicamenteux Bovatec® 20 dans une tonne (1000 kg) d'aliment afin de fournir 105 mg de lasalocid sodique par kg d'aliment. On recommande de mélanger tout d'abord Bovatec® 20 à une petite quantité de l'aliment à préparer avant de l'incorporer au mélange final.
Toujours suivre de bonnes méthodes de fabrication afin d'éviter la contamination accidentelle de tout aliment par le lasalocide et afin d'assurer une distribution homogène dans la ration.
Mode d'alimentation
Servir cet aliment médicamenteux sans interruption à l'exclusion de tout autre aliment.

Indication B. Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria adenoeides, E. meleagrimitis*, et *E. gallopavonis* chez les dindons en croissance.
Mode de préparation
Bien mélanger 500 g (0,500 kg) de prémélange médicamenteux Bovatec® 20 dans 1 tonne (1000 kg) d'aliment afin de fournir 100 mg de lasalocide sodique par kg d'aliment.
Mode d'alimentation
Servir cet aliment médicamenteux du jour un (1) jusqu'à la fin d'une période de seize (16) semaines pour les mâles et de quatorze (14) semaines pour les femelles.

Précautions
1. Ne pas utiliser ce mélange pour réprimer des épidémies de coccidiose.
2. Consulter un vétérinaire ou un pathologiste aviaire si les pertes dépassent 0,5 % pendant une périodes de 2 jours.
3. Compatibles avec la bentonite, le sulfonate de lignine et PEL-AID (Uniscope Inc.) lorsque des liants pour agglomérés sont utilisés (mention exigée sur les étiquettes de prémélange ou de supplément seulement).
4. Garder hors de portée des chevaux et autre équidés, car l'ingestion de lasalocide par ces animaux peut être fatale (mention exigée sur les étiquettes de prémélange ou de suppléments seulement).

Mises en garde
1. Aucun délai d'attente n'est nécessaire pour les poulets à griller et les dindons traités conformément au mode d'emploi.
2. Ne pas distribuer aux poulets et dindons de remplacement ou reproducteurs ni aux poules et dindes pondeuses.
3. Garder hors de la portée des enfants.

IMPORTANT : DOIT ÊTRE BIEN MÉLANGÉ AUX ALIMENTS AVANT L'EMPLOI

Entreposage
Entreposer dans un endroit sec à la température ambiante.

Coordonnées :
Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir une ou plusieurs fiches de données de sécurité, contactez Phibro Animal Health Corporation au 888-403-0074 ou www.pahc.com. Pour signaler des effets indésirables présumés liés aux médicaments, appelez le 1-888-475-7355.

Phibro, le logo Phibro et Bovatec sont des marques déposées appartenant ou sous licence à Phibro Animal Health Corporation ou à ses filiales.

Fabriqué par : Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre Est, 3e étage, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, États-Unis
Importé et distribué par : Phibro Animal Health, Ltd., 871, rue Victoria Nord, bureau 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4

Lot See bag / Voir le sac
Exp. See bag / Voir le sac

176-9080-01
40027723

DIN 02321939

NET 25 KG

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION®

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors
509887/00	10006800	Bovatec 20% 25KG (CAN) Bag	BLACK, Dieline
Specification / DWG	Dimensions	Country	PMS 652 C
Z14-803189	38" x 16.5" x 6"	Canada	
MPD No.	Date	Additional Information	
12568CR2	5/14/25		