

Deccox[®]-M

**0.8% Decoquinatate
Premix with Lactose
Veterinary Use Only**

**Active Ingredient:
Decoquinatate. 8.0 grams per kg**

**Prémélange à 0,8 % de
décoquinatate avec lactose
Usage vétérinaire seulement**

**Ingrédient actif :
Décoquinatate. 8,0 grammes par kg**

Indications
As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria bovis* and *Eimeria zuernii* in non-ruminating calves, including veal.

Indications
Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria bovis* et *Eimeria zuernii* chez les veaux non ruminants, incluant les veaux de boucherie.

For Medicating Milk Replacer or Whole Milk Feeds

Médicament à ajouter au lait de remplacement ou au lait entier

Dosage and Administration
Feed at the rate of 0.5 mg of decoquinatate per kg of body weight, for at least 28 days. Calves should be fed medicated milk replacer or whole milk medicated with Deccox[®]-M at least twice daily.

For Individual Calf Feeding
Prepare fresh daily. Feed each calf an equal portion of the total amount of medicated milk replacer or whole milk medicated with Deccox[®]-M prepared as shown below.

Mix Deccox[®]-M into the total amount of milk replacer or whole milk (2.0 to 5.5 L per calf daily) needed for the number of calves to be fed. Stir or agitate continuously for 5 minutes before and during feeding. Feed immediately in container for individual animals only. Do not use in bulk feeding containers (e.g. calf-bars).

Average calf weight in kg	Daily mg of decoquinatate per calf	Amount of Deccox [®] -M in grams					
		1 calf	5 calves	10 calves	20 calves	40 calves	80 calves
34	17	2.1	10.6	21.2	42.4	84.8	169.6
45	22.5	2.8	13.9	27.8	55.5	111.0	220.0
68	34	4.3	21.3	42.5	85.0	170.0	340.0
90	45	5.6	28.1	56.3	112.5	225.0	450.0

One level teaspoon contains 3.5 grams of Deccox[®]-M (28 mg of decoquinatate).
One-half cup contains 85.0 grams of Deccox[®]-M (680 mg decoquinatate).

IMPORTANT: Failure To Properly Mix And Feed This Product May Result In Underdosing Or Overdosing Some Animals Due To Settling Out Of The Drug.

Posologie et administration
Servir à raison de 0,5 mg de décoquinatate par kg de poids corporel, pendant au moins 28 jours. Servir l'aliment médicamenteux (lait de remplacement ou lait entier) aux veaux, au moins deux fois par jour.

Pour l'alimentation individuelle des veaux
Préparer un nouveau mélange chaque jour. servir à chaque veau une part égale de la quantité totale de lait de remplacement ou de lait entier médicamenteux avec Deccox[®]-M préparé tel qu'indiqué ci-dessous.

Mélanger Deccox[®]-M dans la quantité totale de lait de remplacement ou de lait entier (2,0 à 5,5 L par veau et par jour) requise pour le nombre de veaux à traiter. Remuer ou agiter continuellement pendant 5 minutes avant de servir et pendant le repas. Servir immédiatement dans des contenants destinés à l'alimentation individuelles des animaux. Ne pas servir dans des contenants destinés à l'alimentation en groupe (p. ex., nourrisseur-allaiteur).

Poids moyen des veaux en kg	Quantité (mg) quotidienne de décoquinatate par veau	Quantité de Deccox [®] -M en grammes					
		1 veau	5 veaux	10 veaux	20 veaux	40 veaux	80 veaux
34	17	2,1	10,6	21,2	42,4	84,8	169,6
45	22,5	2,8	13,9	27,8	55,5	111,0	220,0
68	34	4,3	21,3	42,5	85,0	170,0	340,0
90	45	5,6	28,1	56,3	112,5	225,0	450,0

Une cuillerée contient 3,5 grammes de Deccox-M (28 mg de décoquinatate).
Une demi-tasse contient 85,0 grammes de Deccox-M (680 mg de décoquinatate).

IMPORTANT : Les directives de mélange et d'alimentation doivent être respectées sans quoi certains animaux pourraient recevoir une dose insuffisante ou excessive en raison d'une distribution inégale du médicament dans l'aliment.

Warnings
Do not use in lactating dairy cattle.
Keep out of reach of children.

Mises en garde
Ne pas utiliser chez les bovins laitiers en lactation.
Garder hors de la portée des enfants.

Cautions
Do not use this drug for treatment of outbreaks of coccidiosis.

Précautions
Ne pas utiliser ce médicament pour traiter les épidémies de coccidiose.

Storage
Store in a protected location, avoid excessive heat (>40°C) and prevent from freezing. Keep container tightly closed to avoid contamination.

Entreposage
Entreposer dans un endroit protégé, éviter d'entreposer à température excessive (> 40 °C) et préserver du gel. Conserver toujours fermé pour éviter la contamination.

Contact Information:
For technical assistance or to obtain a Safety Data Sheet(s), contact Phibro Animal Health Corporation at 888-403-0074 or www.pahc.com. To report suspected adverse drug experiences, call 1-888-475-7355.

Coordonnées :
Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir une ou plusieurs fiches de données de sécurité, contactez Phibro Animal Health Corporation au 888-403-0074 ou www.pahc.com. Pour signaler des effets indésirables présumés liés aux médicaments, appelez le 1-888-475-7355.

LOT See label on front panel / Voir l'étiquette au verso
EXP. See label on front panel / Voir l'étiquette au verso



Manufactured by:
Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA

Net 2.27 kg

Imported and Distributed by:
Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4

176-8088-01

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors
NA	800136	Deccox-M 2.27KG (CAN) CSL (Back)	BLACK Dieline
Specification / DWG	Dimensions	Country	
NA	6" x 10.875"	Canada	
MPD No.	Date	Additional Information	
12724CR1	4/11/25		

DIN 02312379

Deccox[®]-M

0.8% Decoquate Premix with Lactose Veterinary Use Only

For Medicating Milk Replacer
or Whole Milk Feeds

Active Ingredient:
Decoquate. 8.0 grams per kg

PRODUCT CODE: 800136

Cautions:
Do not use this drug for treatment of
outbreaks of coccidiosis.

Warnings:
Do not use in lactating dairy cattle.
Keep out of reach of children.

Prémélange à 0,8 % de décoquate avec lactose Usage vétérinaire seulement

Médicament à ajouter au lait de
remplacement ou au lait entier

Ingrédient actif :
Décoquate. 8,0 grammes par kg

CODE DU PRODUIT : 800136

Précautions :
Ne pas utiliser ce médicament pour
traiter les épidémies de coccidose.

Mises en garde :
Ne pas utiliser chez les bovins laitiers en lactation.
Garder hors de la portée des enfants.

NET 2.27 KG

Phibro, Phibro logo and Deccox are trademarks owned by or
licensed to Phibro Animal Health Corporation or its affiliates.



Phibro, le logo Phibro et Deccox sont des marques déposées appartenant ou
sous licence à Phibro Animal Health Corporation ou à ses filiales.

176-8087-01

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors
NA	800136	Deccox-M 2.27KG (CAN) CSL (Front)	BLACK
Specification / DWG	Dimensions	Country	
NA	8.75" x 6"	Canada	
MPD No.	Date	Additional Information	
12723CR1	4/11/25		

DIN 02312379

Deccox[®]-M

Prémélange à 0,8 % de décoquinatate avec lactose

Usage vétérinaire seulement

Médicament à ajouter au lait de remplacement ou au lait entier

Ingrédient actif :

Décoquinatate 8,0 grammes par kg

Précautions :

Ne pas utiliser ce médicament pour traiter les épidémies de coccidiose.

Mises en garde :

Ne pas utiliser chez les bovins laitiers en lactation.

Garder hors de la portée des enfants.

Indications

Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria bovis* et *Eimeria zuernii* chez les veaux non ruminants, incluant les veaux de boucherie.

Médicament à ajouter au lait de remplacement ou au lait entier

Posologie et administration

Servir à raison de 0,5 mg de décoquinatate par kg de poids corporel, pendant au moins 28 jours. Servir l'aliment médicamenteux (lait de remplacement ou lait entier) aux veaux, au moins deux fois par jour.

Pour l'alimentation individuelle des veaux

Préparer un nouveau mélange chaque jour. Servir à chaque veau une part égale de la quantité totale de lait de remplacement ou de lait entier médicamenteux avec Deccox[®]-M préparé tel qu'indiqué ci-dessous. Mélanger Deccox-M dans la quantité totale de lait de remplacement ou de lait entier (2,0 à 5,5 L par veau et par jour) requise pour le nombre de veaux à traiter. Remuer ou agiter continuellement pendant 5 minutes avant de servir et pendant le repas. Servir immédiatement dans des contenants destinés à l'alimentation individuelle des animaux. Ne pas servir dans des contenants destinés à l'alimentation en groupe (p.ex., nourrisseur-allaitteur).

Poids moyen des veaux en kg	Quantité (mg) quotidienne de décoquinatate par veau	Quantité de Deccox [®] -M en grammes					
		1 veau	5 veaux	10 veaux	20 veaux	40 veaux	80 veaux
34	17	2,1	10,6	21,2	42,4	84,8	169,6
45	22,5	2,8	13,9	27,8	55,5	111,0	220,0
68	34	4,3	21,3	42,5	85,0	170,0	340,0
90	45	5,6	28,1	56,3	112,5	225,0	450,0

Une cuillerée à thé rase contient 3,5 grammes de Deccox-M (28 mg de décoquinatate).

Une demi-tasse contient 85,0 grammes de Deccox-M (680 mg de décoquinatate).

IMPORTANT : Les directives de mélange et d'alimentation doivent être respectées sans quoi certains animaux pourraient recevoir une dose insuffisante ou excessive en raison d'une distribution inégale du médicament dans l'aliment.

Mises en garde

Ne pas utiliser chez les bovins laitiers en lactation. Garder hors de la portée des enfants.

Précautions

Ne pas utiliser ce médicament pour traiter les épidémies de coccidiose.

Entreposage

Entreposer dans un endroit protégé, éviter d'entreposer à température excessive (> 40 °C) et préserver du gel. Conserver toujours fermé pour éviter la contamination.

Coordonnées : Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir une ou plusieurs fiches de données de sécurité, contactez Phibro Animal Health Corporation au 888-403-0074 ou www.pahc.com. Pour signaler des effets indésirables présumés liés aux médicaments, appelez le 1-888-475-7355.

Phibro, le logo Phibro et Deccox sont des marques déposées appartenant ou sous licence à Phibro Animal Health Corporation ou à ses filiales.

Net 22,7 kg

Lot Voir à l'endos du sac

Exp. Voir à l'endos du sac

Manufactured by:

Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA

Imported and Distributed by:

Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

176-8085-01

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors
510065/00	10022718	Deccox-M 22.7KG (CAN) Label	BLACK
Specification / DWG	Dimensions	Country	
Z21-30213500R02	6" x 10.875"	Canada	
MPD No.	Date	Additional Information	
12722CR1	4/10/25		

DIN 02312379

Deccox[®]-M

0.8% Decoquinatate Premix with Lactose

Veterinary Use Only

For Medicating Milk Replacer or Whole Milk Feeds

Active Ingredient:

Decoquinatate 8.0 grams per kg

Cautions:

Do not use this drug for treatment of outbreaks of coccidiosis.

Warnings:

Do not use in lactating dairy cattle.

Keep out of reach of children.

Indications

As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria bovis* and *Eimeria zuernii* in non-ruminating calves, including veal.

For Medicating Milk Replacer or Whole Milk Feeds Dosage and Administration

Feed at the rate of 0.5 mg of decoquinatate per kg of body weight, for at least 28 days. Calves should be fed medicated milk replacer or whole milk medicated with Deccox[®]-M at least twice daily.

For Individual Calf Feeding

Prepare fresh daily. Feed each calf an equal portion of the total amount of medicated milk replacer or whole milk medicated with Deccox-M prepared as shown below. Mix Deccox-M into the total amount of milk replacer or whole milk (2.0 to 5.5 L per calf daily) needed for the number of calves to be fed. Stir or agitate continuously for 5 minutes before and during feeding. Feed immediately in container for individual animals only. Do not use in bulk feeding containers (e.g. calf-bars).

Average calf weight in kg	Daily mg of decoquinatate per calf	Amount of Deccox [®] -M in grams					
		1 calf	5 calves	10 calves	20 calves	40 calves	80 calves
34	17	2.1	10.6	21.2	42.4	84.8	169.6
45	22.5	2.8	13.9	27.8	55.5	111.0	220.0
68	34	4.3	21.3	42.5	85.0	170.0	340.0
90	45	5.6	28.1	56.3	112.5	225.0	450.0

One level teaspoon contains 3.5 grams of Deccox-M (28 mg of decoquinatate).

One-half cup contains 85.0 grams of Deccox-M (680 mg decoquinatate).

IMPORTANT: Failure To Properly Mix And Feed This Product May Result In Underdosing Or Overdosing Some Animals Due To Settling Out Of The Drug.

Warnings

Do not use in lactating dairy cattle. Keep out of reach of children.

Cautions

Do not use this drug for treatment of outbreaks of coccidiosis.

Storage

Store in a protected location, avoid excessive heat (>40°C) and prevent from freezing.

Keep container tightly closed to avoid contamination.

Contact Information: For technical assistance or to obtain a Safety Data Sheet(s), contact Phibro Animal Health Corporation at 888-403-0074 or www.pahc.com. To report suspected adverse drug experiences, call 1-888-475-7355.

Phibro, Phibro logo and Deccox are trademarks owned by or licensed to Phibro Animal Health Corporation or its affiliates.

Net 22.7 kg

Lot See back of bag
Exp. See back of bag

Manufactured by:

Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA

Imported and Distributed by:

Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4



176-8086-01

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors
510066/00	10022718	Deccox-M 22.7KG (CAN) Label	BLACK
Specification / DWG	Dimensions	Country	
Z21-30213500R02	6" x 10.875"	Canada	
MPD No.	Date	Additional Information	
12721CR1	4/10/25		