

ROBENZ®**ROBENIDINE HYDROCHLORIDE MEDICATED PREMIX ANTICOCCIDIAL
PRÉMÉLANGE MÉDICAMENTEUX ANTICOCCIDIEN DE
CHLORHYDRATE DE ROBÉNIDINE****Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement****FOR FEED MANUFACTURING USE ONLY / RÉSERVÉ À LA FABRICATION DE MOULÉES****ACTIVE INGREDIENT:**

Robenidine hydrochloride 66 g/kg (6.6%)

INDICATIONS:**Broiler Chickens:** As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria mitis*, *E. brunetti*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. necatrix* and *E. praecox*.**Turkeys:** As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria adenoides*, *E. meleagritidis* and *E. gallopavonis*.**Rabbits:** As an aid in the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria magna*, *E. media* and *E. stiedae* in weaned and growing rabbits.**DIRECTIONS:****Broiler Chickens:** Thoroughly mix 500 grams of ROBENZ Medicated Premix in sufficient feed to produce a final weight of one tonne (1000 kg) and a final concentration of 33 ppm (33 mg/kg) of robenidine in finished feed. Feed continuously as the sole ration from day-old to six days prior to slaughter.**Turkeys:** Thoroughly mix 500 grams of ROBENZ Medicated Premix in sufficient feed to produce a final weight of one tonne (1000 kg) and a final concentration of 33 ppm (33 mg/kg) of robenidine in finished feed. Feed continuously as the sole ration from one day-old to eight weeks of age.**Rabbits:** Mix 758 grams of ROBENZ Medicated Premix in enough feed to produce a final weight of one tonne (1000 kg) and a final concentration of 50 ppm (50 mg/kg) of robenidine in finished feed. Feed continuously as the sole pelleted ration to six days prior to slaughter.**WARNINGS:**

1. Treated chickens, turkeys and rabbits must not be slaughtered for use in food for at least six (6) days after the latest treatment with this drug.
2. Do not feed to laying hens, replacement and breeding chickens or turkeys.

CAUTIONS:

1. Do not use robenidine medicated feed for treatment of outbreaks of coccidiosis.
2. Consult a veterinarian or a poultry pathologist if losses exceed 0.5% in a two-day period.
3. Do not feed to turkeys over 8 weeks of age.
4. Avoid storage under conditions of excessive heat.
5. Follow directions carefully.
6. Do not feed to breeding rabbits or pregnant does.

Storage: Store in a dry place at room temperature.**Contact Information:** For technical assistance or to obtain a Safety Data Sheet(s), contact Phibro Animal Health Corporation at 888-403-0074 or www.pahc.com. To report suspected adverse drug experiences, call 1-888-475-7355.

Phibro, Phibro logo and Robenz are trademarks owned by or licensed to Phibro Animal Health Corporation or its affiliates.

176-8082-01

Manufactured by: Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA**Imported and Distributed by:** Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4

Lot

Exp.

INGRÉDIENT ACTIF :

Chlorhydrate de robénidine 66 g/kg (6.6%)

INDICATIONS :**Poulets à griller :** Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria mitis*, *E. brunetti*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. necatrix* et *E. Praecox*.**Dindons :** Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria adenoides*, *E. meleagritidis* et *E. Gallopavonis*.**Lapins :** Pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria magna*, *E. media* et *E. stiedae* chez les lapins sevrés et en pleine croissance.**MODE D'EMPLOI :****Poulets à griller :** Incorporer 500 g de prémélange médicamenteux ROBENZ à une quantité suffisante de moulée pour donner un poids total d'une tonne (1000 kg). La moulée finale obtenue renferme 33 ppm (33 mg/kg) de robénidine. Servir l'aliment médicamenteux sans interruption à l'exclusion de tout autre aliment de la naissance jusqu'à six jours avant l'abattage.**Dindons :** Incorporer 500 g de prémélange médicamenteux ROBENZ à une quantité suffisante de moulée pour donner un poids total d'une tonne (1000 kg). La moulée finale obtenue renferme 33 ppm (33 mg/kg) de robénidine. Servir l'aliment médicamenteux sans interruption à l'exclusion de tout autre aliment de la naissance jusqu'à l'âge de huit semaines.**Lapins :** Incorporer 758 g de prémélange médicamenteux ROBENZ à une quantité suffisante de moulée pour donner un poids total d'une tonne (1000 kg). L'aliment granulé final obtenu renferme 50 ppm (50 mg/kg) de robénidine. Servir sans interruption à l'exclusion de tout autre aliment en agglomérés jusqu'à six jours avant l'abattage.**MISES EN GARDE :**

1. Les poulets, les dindons et les lapins traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 6 jours après le dernier traitement avec ce médicament.
2. Ne pas administrer ce médicament aux poules pondeuses ou aux poulets de remplacement et de reproduction, ni aux dindons de remplacement et de reproduction.

PRÉCAUTIONS :

1. Ne pas utiliser l'aliment médicamenteux avec robenidine pour traiter des épidémies de coccidiose.
2. Consulter un vétérinaire ou un pathologiste aviaire si les pertes dépassent 0,5 % en deux jours.
3. Ne pas administrer ce produit aux dindons âgés de plus de huit semaines.
4. Éviter d'entreposer à la chaleur excessive.
5. Suivre attentivement le mode d'emploi.
6. Ne pas administrer ce médicament aux lapins de reproduction ni aux femelles en gestation.

Entreposage : Entreposer dans un endroit sec à la température ambiante.**Coordonnées :** Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir une ou plusieurs fiches de données de sécurité, contactez Phibro Animal Health Corporation au 888-403-0074 ou www.pahc.com. Pour signaler des effets indésirables présumés liés aux médicaments, appelez le 1-888-475-7355.

Phibro, le logo Phibro et Robenz sont des marques déposées appartenant ou sous licence à Phibro Animal Health Corporation ou à ses filiales.

NET 20 KG

Product Code: / Code du produit : 10007973

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors
NA	10007973	Robenz 20KG (CAN) CSL	<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">BLACK</div>
Specification / DWG	Dimensions	Country	
ZT14148201	6" x 10.875"	Canada	
MPD No.	Date	Additional Information	
12665CR1	4/1/25		