

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors	
507301/01	10021056	MGA 100 25KG (CAN) Bag	BLACK	Dieline
Specification / DWG	Dimensions	Country		
Z14-800996	37" x 15" x 6"	Canada		
MPD No.	Date	Additional Information	PMS 306	
12659CR1	4/1/25			

Top Print
NO COPY AREA

MGA^{MD} 100 Premix

*pré-mélange d 'acétate de
mélangestrol – fab.*

Usage vétérinaire seulement

INDICATIONS

Pour stimuler la croissance, améliorer la conversion alimentaire et supprimer l'oestrus (la chaleur) chez les génisses engraisées pour l'abattage.

Mode de préparation des suppléments médicamentés

Le pré-mélange MGA 100 doit être bien mélangé dans un supplément pour génisses à l'engraissement, de façon à ce que chaque animal reçoive 0,4 mg d'acétate de mélangestrol par jour. Le tableau ci-dessous indique les quantités de pré-mélange MGA 100 à employer pour préparer les divers suppléments.

Quantité de supplément à administrer par animal par jour	Quantité de pré-mélange MGA 100 à ajouter par 1 000 kg de supplément
0.25 kg	7.27 kg
0.5 kg	3.64 kg
0.75 kg	2.42 kg
1.0 kg	1.82 kg

De bonnes méthodes de mélange doivent être suivies lors de la préparation de suppléments contenant du pré-mélange MGA 100 afin d'éviter tout risque de contamination des autres aliments.

Mode d'emploi des suppléments médicamentés

Administrer les suppléments à base de pré-mélange MGA 100 au taux recommandé qui procure 0,4 mg d'acétate de mélangestrol par animal par jour. Ces suppléments sont habituellement administrés à raison de 0,25 à 1 kg par animal par jour. Ils peuvent toutefois être administrés séparément, distribués sur les grains ou l'ensilage, ou mélangés au reste de la ration pour procurer un aliment complet.

MGA 100 peut également être utilisé dans des aliments en granules incluant les aliments qui contiennent du sulfonate de lignine comme agent agglomérant.

Les suppléments médicamentés doivent être fournis de façon continue à partir du début de l'engraissement des génisses pour l'abattage. Si l'administration du médicament est interrompue pendant trois jours ou plus, les génisses peuvent avoir leurs chaleurs. Une période de retrait de 24 heures immédiatement avant l'abattage doit être observée ; il est toutefois prudent d'éviter une période de retrait plus longue.

MISES EN GARDE : Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 24 heures après le dernier traitement avec ce médicament. Ne pas administrer aux bovins laitiers. Ne pas administrer aux veaux de lait ou de grain. Garder hors de la portée des enfants.

Précautions :

1. À n'administrer qu'aux génisses engraisées pour l'abattage. Inefficace dans le cas de génisses castrées ou de bouvillons.
2. Le pré-mélange MGA 100 ne doit pas être donné aux génisses traitées avec d'autres médicaments à base d'hormones.

Ingrédient médicinal

Chaque kg renferme :
Acétate de mélangestrol. 220 mg
1 kg = 2,2 lb = 1 000 grammes

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec pour empêcher tout durcissement.

Coordonnées : Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir une ou plusieurs fiches de données de sécurité, contactez Phibro Animal Health Corporation au 888-403-0074 ou www.pahc.com. Pour signaler des effets indésirables présumés liés aux médicaments, appelez le 1-888-475-7355.

Phibro, le logo Phibro et MGA sont des marques déposées appartenant ou sous licence à Phibro Animal Health Corporation ou à ses filiales.

Fabriqué par :

Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl,
300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA

Importé et distribué par :

Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON,
Canada N2B 3S4

DIN 00813826

NET 25 kg

Premix
MGA^{MD} 100



NO COPY AREA

MGA^{MD} 100 Premix

*melengestrol acetate premix – mfr. std.
Veterinary Use Only*

INDICATIONS

For growth stimulation, improved feed utilization and suppression of estrus (heat) in heifers fed for slaughter.

Directions for preparing Medicated Supplements

MGA 100 premix should be thoroughly mixed in a supplement for feedlot heifers at a level that will provide 0.4 mg of melengestrol acetate per head per day. The following chart shows the quantities of MGA 100 premix to be used to prepare various supplements.

Amount of supplement to be fed per head per day	Amount of MGA 100 premix to be added per 1000 kg of supplement
0.25 kg	7.27 kg
0.5 kg	3.64 kg
0.75 kg	2.42 kg
1.0 kg	1.82 kg

Good manufacturing procedures should be observed in preparing supplements containing MGA 100 premix in order to avoid cross contamination of other feeds.

Directions for Use of Medicated Supplements

Supplements containing MGA 100 premix should be fed at the recommended rate that will supply 0.4 mg of melengestrol acetate per head per day. Such supplements, that are usually designed to be fed at a rate of 0.25 to 1 kg per head per day, may be fed separately, top-dressed on the grain or silage or mixed with the rest of the ration to provide a complete feed. Alternatively, MGA 100 premix may be used in pelleted feeds, including those which contain a lignin sulfonate pellet binding agent.

Medicated supplements should be used continuously throughout the time that the heifers are being fed for slaughter. If medication is stopped for three days or more, the heifers may come into heat. A 24-hour withdrawal period immediately preceding slaughter must be observed; however, longer withdrawal periods should be avoided.

WARNINGS: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 24 hours after the latest treatment with this drug. Do not use in dairy cattle. Do not use in calves to be processed for veal. Keep out of reach of children.

Cautions:

1. Use only in heifers being fed for slaughter. Not effective in spayed heifers or steers.
2. MGA 100 premix must not be fed to heifers treated with other hormone drugs.

Medicinal ingredient

Each kg contains:
Melengestrol Acetate. 220 mg
1 kg = 2.2 lb = 1000 grams

STORAGE

Store in a dry place to prevent caking.

Contact Information: For technical assistance or to obtain a Safety Data Sheet(s), contact Phibro Animal Health Corporation at 888-403-0074 or www.pahc.com. To report suspected adverse drug experiences, call 1-888-475-7355.

Phibro, Phibro logo and MGA are trademarks owned by or licensed to Phibro Animal Health Corporation or its affiliates.

Manufactured by:

Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl,
300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA

Imported and Distributed by:

Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON,
Canada N2B 3S4

Lot:

Expiry:

50730101
176-9084-01
DIN 00813826

NET 25 kg



MGA^{MD} 100
Premix

NO COPY AREA

Butt Print
NO COPY AREA