

Deccox[®]

**Deccox 6% Premix
Veterinary Use Only**
For Feed Manufacturing Use Only
Active Ingredient:
Each kg contains 60 grams of
decoquinat

**Prémélange à 6 % Deccox
Usage vétérinaire seulement**
Réservé à la fabrication de moulées
Ingédient actif :
Chaque kg contient 60 grammes de
décoquinat

Cattle Indications As an aid in the prevention of coccidiosis caused by <i>Eimeria bovis</i> and <i>E. zuernii</i> in non-ruminating and ruminating calves and cattle. Direction for use The recommended use level is 0.5 mg of decoquinat per kg of body weight (25 grams of decoquinat per metric tonne of feed), to be administered daily. Mixing directions Use 4.17 grams of Deccox 6% Premix per metric tonne of complete cattle feed. Ensure thorough dispersion of Deccox 6% Premix throughout the feed. For inclusion in a supplement which is to be fed at a rate of 500 grams per head per day, use Deccox 6% Premix as shown below. To calculate the inclusion rate for Deccox 6% Premix for other weights of cattle or other feeding rates of supplement, use the ratios in the following table.	Bovins Indications Pour aider à prévenir la coccidiose attribuable à <i>Eimeria bovis</i> et <i>E. zuernii</i> chez les bovins, incluant les veaux dont le rumen est non fonctionnel ou fonctionnel. Posologie La posologie recommandée est de 0,5 mg de décoquinat par kg de poids corporel (25 grammes de décoquinat par tonne métrique de mouleé), administré quotidiennement. Mode de préparation Utiliser 4,17 grammes du prémélange à 6 % Deccox par tonne métrique de mouleé complète pour bovins. S'assurer que le mélange est bien homogène. Si l'on désire ajouter le médicament à un supplément qui sera servi à raison de 500 grammes par tête, quotidiennement, se référer au tableau ci-après. Le taux d'inclusion du prémélange à 6 % Deccox dans des mouleés médicamenteuses destinées à des animaux de poids différents, ou devant être servies comme supplément selon des quantités différentes, peut être calculé en se basant sur les proportions du tableau suivant.																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Supplement to be fed at a rate of 500 g/head/day</th></tr><tr><th>Body Weight</th><th>Deccox 6% Premix per tonne</th></tr></thead><tbody><tr><td>100 kg</td><td>1,7 kg</td></tr><tr><td>200 kg</td><td>3,3 kg</td></tr><tr><td>300 kg</td><td>5,0 kg</td></tr></tbody></table>	Supplement to be fed at a rate of 500 g/head/day		Body Weight	Deccox 6% Premix per tonne	100 kg	1,7 kg	200 kg	3,3 kg	300 kg	5,0 kg	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Supplément servi au taux de 500 g/tête/jour</th></tr><tr><th>Poids corporel</th><th>Deccox à 6 % / tonne</th></tr></thead><tbody><tr><td>100 kg</td><td>1,7 kg</td></tr><tr><td>200 kg</td><td>3,3 kg</td></tr><tr><td>300 kg</td><td>5,0 kg</td></tr></tbody></table>	Supplément servi au taux de 500 g/tête/jour		Poids corporel	Deccox à 6 % / tonne	100 kg	1,7 kg	200 kg	3,3 kg	300 kg	5,0 kg
Supplement to be fed at a rate of 500 g/head/day																					
Body Weight	Deccox 6% Premix per tonne																				
100 kg	1,7 kg																				
200 kg	3,3 kg																				
300 kg	5,0 kg																				
Supplément servi au taux de 500 g/tête/jour																					
Poids corporel	Deccox à 6 % / tonne																				
100 kg	1,7 kg																				
200 kg	3,3 kg																				
300 kg	5,0 kg																				
When fed at a rate of 500 grams per head per day, the above medicated supplement will deliver 0.5 mg/kg of body weight/day to the treated animal. Feeding directions Feed for at least 28 days when coccidiosis is likely to be a hazard. Cautions Do not use this drug for the treatment of outbreaks of coccidiosis. Warnings No withdrawal period is required when Deccox 6% is used according to the label. Do not use in lactating dairy cows producing milk for human consumption. Keep out of reach of children.	Servi quotidiennement, au taux de 500 grammes par tête, ce supplément permettra d'administrer la posologie recommandée de 0,5 mg/kg de poids corporel/jour aux animaux traités. Mode d'emploi Servir l'aliment médicamenteux à l'exclusion de tout autre aliment durant au moins 28 jours lorsqu'il y a un risque d'infection coccidienne. Précautions Ne pas utiliser ce médicament pour traiter les épidémies de coccidiose. Mises en garde Aucune période de retrait n'est nécessaire lorsque le prémélange à 6 % Deccox est utilisé conformément au mode d'emploi. Ne pas administrer aux vaches laitières en lactation qui produisent du lait destiné à la consommation humaine. Garder hors de la portée des enfants.																				
Sheep Indications As an aid in the prevention of coccidiosis caused by pathogenic <i>Eimeria</i> spp. in lambs fed in confinement. Direction for use Lambs: The recommended use level is 0.5 mg of decoquinat per kg of body weight. Mixing directions Depending on feed intake level, use 1.67 or 3.34 kg per metric tonne of complete feed to result in a daily dose level of 0.5 mg of decoquinat per kg body weight. Ensure thorough dispersion of Deccox 6% Premix throughout the feed.	Moutons Indications Pour aider à prévenir la coccidiose attribuable à des espèces pathogènes du genre <i>Eimeria</i> chez les agneaux nourris en confinement. Posologie Agneaux : La posologie recommandée est de 0,5 mg de décoquinat par kg de poids corporel. Mode de préparation Selon la quantité de mouleé donnée aux agneaux, utiliser 1,67 ou 3,34 kg du prémélange à 6 % Deccox par tonne métrique de mouleé complète, de façon à administrer aux agneaux une dose quotidienne de 0,5 mg de décoquinat par kg de poids corporel. S'assurer que le mélange est bien homogène.																				
<table border="1"><thead><tr><th>Lamb Daily feeding rate (g feed intake / kg BW)</th><th>Rate of inclusion of Deccox 6% premix in feed</th><th>Decoquinat level in feed (g/tonne)</th></tr></thead><tbody><tr><td>50 g /10 kg</td><td>1,67 kg / tonne</td><td>100</td></tr><tr><td>25 g /10 kg</td><td>3,34 kg / tonne</td><td>200</td></tr></tbody></table>	Lamb Daily feeding rate (g feed intake / kg BW)	Rate of inclusion of Deccox 6% premix in feed	Decoquinat level in feed (g/tonne)	50 g /10 kg	1,67 kg / tonne	100	25 g /10 kg	3,34 kg / tonne	200	<table border="1"><thead><tr><th>Quantité de mouleé donnée aux agneaux (g de mouleé/kg de poids corporel)</th><th>Quantité de prémélange à 6 % Deccox à inclure à la mouleé</th><th>Taux de décoquinat dans la mouleé (g/tonne)</th></tr></thead><tbody><tr><td>50 g /10 kg</td><td>1,67 kg / tonne</td><td>100</td></tr><tr><td>25 g /10 kg</td><td>3,34 kg / tonne</td><td>200</td></tr></tbody></table>	Quantité de mouleé donnée aux agneaux (g de mouleé/kg de poids corporel)	Quantité de prémélange à 6 % Deccox à inclure à la mouleé	Taux de décoquinat dans la mouleé (g/tonne)	50 g /10 kg	1,67 kg / tonne	100	25 g /10 kg	3,34 kg / tonne	200		
Lamb Daily feeding rate (g feed intake / kg BW)	Rate of inclusion of Deccox 6% premix in feed	Decoquinat level in feed (g/tonne)																			
50 g /10 kg	1,67 kg / tonne	100																			
25 g /10 kg	3,34 kg / tonne	200																			
Quantité de mouleé donnée aux agneaux (g de mouleé/kg de poids corporel)	Quantité de prémélange à 6 % Deccox à inclure à la mouleé	Taux de décoquinat dans la mouleé (g/tonne)																			
50 g /10 kg	1,67 kg / tonne	100																			
25 g /10 kg	3,34 kg / tonne	200																			
Feeding directions Feed for at least 28 days during periods of coccidiosis exposure, or when experience indicates that coccidiosis is likely to be a hazard. Cautions This product should only be used in lambs infected, or likely to become infected, with <i>Eimeria</i> spp. The use of this product will maintain normal growth under conditions of coccidial challenge but does not improve growth of healthy lambs. Efficacy of decoquinat treatment during clinical outbreaks of coccidiosis in lambs has not been demonstrated. Warnings No withdrawal period is required when Deccox 6% is used according to the label. Do not use in lactating ewes producing milk for human consumption. Keep out of reach of children.	Mode d'emploi Servir l'aliment médicamenteux durant au moins 28 jours durant les périodes d'exposition à des coccidies ou lorsqu'il y a un risque d'infection coccidienne. Précautions Ce produit ne doit être administré qu'aux agneaux infectés, ou susceptibles de devenir infectés, par des coccidies du genre <i>Eimeria</i> . L'emploi de ce produit maintiendra une croissance normale des agneaux en cas d'exposition à des coccidies, mais n'améliorera pas la croissance des agneaux en santé. L'efficacité du traitement par le décoquinat chez les agneaux pendant les épidémies cliniques de coccidiose n'a pas été démontrée. Mises en garde Aucune période de retrait n'est nécessaire lorsque le prémélange à 6 % Deccox est utilisé conformément au mode d'emploi. Ne pas administrer aux brebis en lactation qui produisent du lait destiné à la consommation humaine. Garder hors de la portée des enfants.																				
Broiler chickens Indications As an aid in the prevention of caecal and intestinal coccidiosis caused by <i>Eimeria tenella</i> , <i>E. necatrix</i> , <i>E. acroovium</i> , <i>E. brunetti</i> , <i>E. maxima</i> and <i>E. mitis</i> in broiler chickens. Direction for use The recommended use level is 0.003% (30 grams of decoquinat per metric tonne of feed). Mixing directions Use 300 grams of Deccox 6% Premix per metric tonne of complete broiler feed. Ensure thorough dispersion of Deccox 6% Premix throughout the feed. Feeding directions Feed medicated Starter, Grower and Finisher feeds as sole ration from day-old to slaughter. Cautions 1. Do not use this drug for the treatment of outbreaks of coccidiosis. 2. Consult a veterinarian or poultry pathologist if mortality exceeds 0.5% in a 2 day period. Warnings No withdrawal period is required when Deccox 6% is used according to the label. Do not use in laying birds producing eggs for human consumption. Keep out of reach of children.	Poulets à griller Indications Pour aider à prévenir la coccidiose caecale et intestinale attribuable à <i>Eimeria tenella</i> , <i>E. necatrix</i> , <i>E. acroovium</i> , <i>E. brunetti</i> , <i>E. maxima</i> et <i>E. mitis</i> chez les poulets à griller. Posologie La posologie recommandée est de 0,003 % (30 grammes de décoquinat par tonne métrique). Mode de préparation Utiliser 300 grammes du prémélange à 6 % Deccox par tonne métrique de mouleé complète pour poulets à griller. S'assurer que le mélange est bien homogène. Mode d'emploi Servir les mouleés médicamenteuses de début, de croissance et de finition à l'exclusion de tout autre aliment, à compter de l'âge d'un jour jusqu'au moment de l'abattage. Précautions 1. Ne pas utiliser ce médicament pour traiter les épidémies de coccidiose. 2. Consulter un médecin vétérinaire ou un pathologiste aviaire si la mortalité excède 0,5 % sur une période de deux jours. Mises en garde Aucune période de retrait n'est nécessaire lorsque le prémélange à 6 % Deccox est utilisé conformément au mode d'emploi. Ne pas administrer aux poulets qui produisent des oeufs destinés à la consommation humaine. Garder hors de la portée des enfants.																				
Storage Store in a dry place at room temperature.	Entreposage Entrepoer dans un endroit sec à la température ambiante.																				
Contact Information: For technical assistance or to obtain a Safety Data Sheet(s), contact Phibro Animal Health Corporation at 888-403-0074 or www.pahc.com . To report suspected adverse drug experiences, call 1-888-475-7265.	Coordonnées : Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir une ou plusieurs fiches de données de sécurité, contactez Phibro Animal Health Corporation au 888-403-0074 ou www.pahc.com . Pour signaler des effets indésirables présumés liés aux médicaments, appelez le 1-888-475-7265.																				
Manufactured by: Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA Imported and Distributed by: Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4 Fabrique par / Importé et distribué par: Phibro Animal Health, Glenpointe Centre Est, 3e étage, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, États-Unis Importé et distribué par: Phibro Animal Health, Ltd., 871, rue Victoria Nord, bureau 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4																					
LOT See sticker on bottom of bag / Voir l'étiquette au bas du sac EXP. See sticker on bottom of bag / Voir l'étiquette au bas du sac	Net 25 kg 175-9063-01 50013700																				



Deccox[®]

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

Deccox[®]

**Deccox 6%
Premix
Veterinary Use
Only**

For Feed Manufacturing Use Only

Active Ingredient:
Each kg contains 60 grams of
decoquinat

**Prémélange à
6 % Deccox
Usage vétérinaire
seulement**

Réservé à la fabrication de moulées

Ingédient actif :
Chaque kg contient 60 grammes de
décoquinat

WARNINGS:

1. This product must not be used in laying birds producing eggs for human consumption.
2. This product must not be used in lactating dairy cows producing milk for human consumption.
3. This product must not be used in lactating ewes producing milk for human consumption.

Phibro, Phibro logo and Deccox are trademarks owned by or licensed to Phibro Animal Health Corporation or its affiliates.

Phibro, le logo Phibro et Deccox sont des marques déposées appartenant ou sous licence à Phibro Animal Health Corporation ou à ses filiales.

DIN 00867349

NET 25 kg

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

Deccox[®]

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors
513084/00	10006798	Deccox 6% 25KG (CAN) Bag	
Specification / DWG	Dimensions	Country	BLACK <input type="checkbox"/> White <input type="checkbox"/>
214-600795	34" x 15" x 5"	Canada	PM 100 <input type="checkbox"/>
MPG No.	Date	Additional Information	
126582R1	4/1/25		