

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors
NA	NA	LincoSpectin 100 12x150g (CAN) Shipper	BLACK
Specification / DWG	Dimensions	Country	
NA	120 x 80 mm	Canada	
MPD No.	Date	Additional Information	
12687CR1	4/7/25		

DIN 00813818

LINCO-SPECTIN^{®/MD} 100 150 g

lincomycin hydrochloride and spectinomycin sulfate soluble powder
poudre soluble de chlorhydrate de lincomycine et de sulfate de spectinomycine

Qty: 12 bottles/bouteilles x 150 g

Store between 15 and 25°C. / Entreposer entre 15 et 25 °C.

LOT.

MFG.

EXP.

FPO

1 06 94254 00117 2



Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North,
Suite 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4

Mfg No:40869
871-8058-01

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors
NA	NA	LincoSpectin 150g 100 (CAN) Bottle Label	BLACK Dieline
Specification / DWG	Dimensions	Country	PMS 306 C
NA	157 x 58 mm	Canada	
MPD No.	Date	Additional Information	
12686CR1	4/7/25		

front page of label

21mm
136mm

LOT.
EXP.

DIN 00813818

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Linco-Spectin[™] 100

lincomycin hydrochloride and spectinomycin sulfate soluble powder
poudre soluble de chlorhydrate de lincomycine et de sulfate de spectinomycine

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

Antibiotic / antibiotique

For chickens and swine
Pour poulets et porcs

Net 150 g

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

Medicinal Ingredients: Lincomycin (as lincomycin hydrochloride), 33.3 g and spectinomycin (as spectinomycin sulfate), 66.7 g per 150 g.

Indications: As an aid in the prevention and treatment of Chronic Respiratory Disease (CRD, *Arsaccullis*) associated with *Mycoplasma* and coliform infections in growing chickens, and for the treatment of swine dysentery (bloody scours) associated with *Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae*.

Dosage and Administration:
Chickens - 1 bottle per 120 litres of drinking water.
Swine - 1 bottle per 1500 litres of drinking water.
For oral use only.

Warnings: Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 72 hours for chickens and 5 days for swine after the latest treatment with this drug. Do not use in laying birds. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Storage: Store between 15 and 25 °C.
See package insert for complete directions for use.

Contact Information: For technical assistance or to obtain a Safety Data Sheet(s), contact Phibro Animal Health Corporation at 888-403-0074 or www.pahc.com. To report suspected adverse drug experiences, call 1-888-475-7355.

Phibro, Phibro logo and Linco-Spectin are trademarks owned by or licensed to Phibro Animal Health Corporation or its affiliates.

Manufactured by:
Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd FL, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA

Imported and Distributed by:
Phibro Animal Health Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4

Ingrédients médicinaux : 33.3 g de lincomycine (sous forme de chlorhydrate de lincomycine) et 66.7 g de spectinomycine (sous forme de sulfate de spectinomycine), par 150 g.

Indications : Comme aide à la prévention et le traitement des maladies chroniques respiratoires (MCR, infection des sacs aériens) associées aux infections dues aux mycoplasmes et aux coliformes chez les poulets en croissance, et pour le traitement de la dysenterie porcine (diarrhée de sang) associée à *Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae*.

Posologie et administration :
Poulets - 1 bouteille par 120 litres d'eau potable.
Porcs - 1 bouteille par 1500 litres d'eau potable.
Pour usage orale seulement.

Mises en garde : les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 72 heures pour les poulets, et 5 jours pour les porcs après le dernier traitement avec ce médicament. Ne pas administrer aux poules de ponte. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.

GARDER HORS DE LA PROTÉE DES ENFANTS.

Entreposage : Entreposer entre 15 et 25 °C.

Voir le dépliant pour le mode d'emploi complet.

Coordonnées : Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir une ou plusieurs fiches de données de sécurité, contactez Phibro Animal Health Corporation au 888-403-0074 ou www.pahc.com. Pour signaler des effets indésirables présumés liés aux médicaments, appelez le 1-888-475-7355.

Phibro, le logo Phibro et Linco-Spectin sont des marques déposées appartenant ou sous licence à Phibro Animal Health Corporation ou à ses filiales.

0 66104 20118 7

871-8057-01

