150mm

150mm

308mm

985mm

Pr LINCOMIX® MD 44

Premix / Pré-mélange

Phibro ANIMAL HEALTH CORPORATION®

DIN 00813559

Pr LINCOMIX® 44

Premix

Veterinary Use Only

Antibiotic

(lincomycin hydrochloride premix - mfr.std.)

TAKE TIME

OBSERVE LABEL DIRECTIONS

SWINE

To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.

FOR MYCOPLASMA PNEUMONIA: To reduce the severity of mycoplasmal pneumonia in growing swine.

Directions for Use: Complete feeds containing lincomycin base at 220 grams per tonne (220 mg/kg) of complete feed, should be fed to growing swine as the sole ration for 21 days.

Mixing Directions: To Make Medicated Complete Feeds: Add 5 kg of **LINCOMIX 44** Premix to each metric tonne of complete feed. The resultant feed will contain 220 g lincomycin base per tonne.

To Make Medicated Supplements: For supplements designed to be incorporated in complete feed, add the amount of **LINCOMIX 44** Premix listed in the following table to the supplements to prepare a medicated supplement.

Supplement Rate per tonne of Complete Feed	Amount of **LINCOMIX 44** Premix to be added to supplement to make medicated supplement
25 kg supplement and 975 kg other ingredients	200 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (8800 g lincomycin base/tonne)
40 kg supplement and 960 kg other ingredients	125 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (5500 g lincomycin base/tonne)
50 kg supplement and 950 kg other ingredients	100 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (4400 g lincomycin base/tonne)
100 kg supplement and 900 kg other ingredients	50 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (2200 g lincomycin base/tonne)

For Swine Dysentery: For the treatment of Swine Dysentery (Bloody Scours) associated with *Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae* in growing swine, and for the control of the disease following treatment.

Directions for Use: Complete feeds containing lincomycin at the following dosage levels should be fed to growing swine as the sole ration.

For Treatment: Where pigs have already begun to show signs of disease, provide 110 grams of lincomycin base per tonne (110 mg/kg) of complete feed for 21 days, or until signs of disease (watery, mucoid or bloody stools) disappear, then reduce the medication level to 44 grams of lincomycin base per tonne (44 mg/kg) and continue for a further 4 weeks. Retreat with the above dosage regimen if the clinical signs of swine dysentery reappear.

Mixing Directions: To Make Medicated Complete Feeds: Treatment Level: Add 2.5 kg of **LINCOMIX 44** Premix to each metric tonne of complete feed. The resultant feed will contain 110 g of lincomycin base per tonne.

Control Level: Add 1.0 kg of **LINCOMIX 44** Premix to each metric tonne of complete feed. The resultant feed will contain 44 g of lincomycin base per tonne.

To Make Medicated Supplements: For supplements designed to be incorporated in complete feed, add the amount of **LINCOMIX 44** Premix listed in the following table to the supplement to prepare a medicated supplement.

Supplement Rate per tonne of Complete Feed	Amount of **LINCOMIX 44** Premix to be added to Supplement to make Medicated Supplement	
	Treatment Level	Control Level
25 kg supplement + 975 kg other ingredients	100 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (4400 g lincomycin base/tonne)	40 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (1760 g lincomycin base/tonne)
40 kg supplement + 960 kg other ingredients	62.5 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (2750 g lincomycin base/tonne)	25 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (1100 g lincomycin base/tonne)
50 kg supplement + 950 kg other ingredients	50 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (2200 g lincomycin base/tonne)	20 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (880 g lincomycin base/tonne)
100 kg supplement + 900 kg other ingredients	25 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (1100 g lincomycin base/tonne)	10 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (440 g lincomycin base/tonne)

FOR PORCINE PROLIFERATIVE ENTERITIS (ILEITIS): As an aid in reducing the clinical severity of Porcine Proliferative Enteropathy (Ileitis) associated with *Lawsonia intracellularis*.

Directions for Use: Feed 110 grams of lincomycin base per tonne (110 mg/kg) of complete feed as the sole ration for 21 days.

Mixing Directions: To Make Medicated Complete Feeds: Add 2.5 kg of **LINCOMIX 44** Premix to each metric tonne of complete feed. The resultant feed will contain 110 g of lincomycin base per tonne.

To Make Medicated Supplements: For supplements designed to be incorporated in complete feed, add the amount of **LINCOMIX 44** Premix listed in the following table to the supplement to prepare a medicated supplement.

Supplement Rate per tonne of Complete Feed	Amount of **LINCOMIX 44** Premix to be added to supplement to make Medicated Supplement
25 kg supplement and 975 kg other ingredients	100 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (4400 g lincomycin base/tonne)
40 kg supplement and 960 kg other ingredients	62.5 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (2750 g lincomycin base/tonne)
50 kg supplement and 950 kg other ingredients	50 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (2200 g lincomycin base/tonne)
100 kg supplement and 900 kg other ingredients	25 kg **LINCOMIX 44** Premix per tonne of supplement (1100 g lincomycin base/tonne)

WARNINGS:

1. Swine treated at the recommended level of 220 grams of lincomycin per tonne must not be slaughtered for use in food for at least 24 hours after the latest treatment with this drug.
2. No withdrawal period is required when swine are treated with this drug at a dose level of 44 or 110 grams lincomycin base per tonne.
3. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes.
4. Keep out of reach of children.

CAUTIONS:

1. Treated pigs may develop some stool softening or mild diarrhea within 36 hours of treatment initiation. Signs of mild irritation and swelling of the anus and/or vulva may be associated with the stool changes. On rare occasions some pigs can show reddening of the skin and irritable behavior. Should these reactions be more severe than described above, discontinue the use of the drug.
2. Not for use in breeding swine.
3. Do not use in feed containing pellet-binding agents except Lignin Sulfonate.
4. Good manufacturing practices should be observed in preparing feeds containing **LINCOMIX 44** Premix. This includes appropriate clean-out procedures to avoid cross contamination. **LINCOMIX 44** Premix must be thoroughly mixed in feed before use.
5. Do not allow rabbits, hamsters, guinea pigs, horses, dairy cattle, or other ruminants access to feeds containing lincomycin. Ingestion by these species may result in severe gastrointestinal effects or metabolic disorders (i.e. ketosis in dairy cattle).

Medicinal Ingredients:

Each kg contains:

Lincomycin base (as lincomycin hydrochloride). . . . . 44 g

1 kg = 2.2 lb = 1000 grams

STORAGE

Store in a dry place to prevent caking.

Contact Information: For technical assistance or to obtain a Safety Data Sheet(s), contact Phibro Animal Health Corporation at 888-403-0074 or www.pahc.com. To report suspected adverse drug experiences, call 1-888-475-7355.

Manufactured by:
Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA

Imported and Distributed by:
Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4

Phibro, Phibro logo and Lincomix are trademarks owned by or licensed to Phibro Animal Health Corporation or its affiliates.

LOT:

EXP:

871-9055-01

Net 25 kg

Phibro ANIMAL HEALTH CORPORATION®

CONTAINS ANTIMICROBIAL USE RESPONSIBLY

Pr LINCOMIX® MD 44

Premix / Pré-mélange

Phibro ANIMAL HEALTH CORPORATION®

DIN 00813559

Pr LINCOMIX® MD 44

Pré-mélange

Usage vétérinaire seulement

Antibiotique

(pré-mélange de chlorhydrate de lincomycine - fab.)

PRENEZ BIEN LE TEMPS DE LIRE

LES INSTRUCTIONS SUR L'ETIQUETTE

PORCS

Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.

POUR PNEUMONIE À MYCOPLASMES : Pour réduire la sévérité de la pneumonie à mycoplasmes chez les porcs en croissance.

Mode d'emploi : La mouée complète contenant de la base de lincomycine à raison de 220 grammes par tonne métrique (220 mg/kg) devrait constituer la seule nourriture des porcs en croissance pendant 21 jours.

Instructions pour le mélange : Pour obtenir de la mouée médicamentée complète : Ajouter 5 kg de pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne métrique de mouée complète. Vous obtiendrez ainsi une mouée qui contiendra 220 grammes de base de lincomycine par tonne.

Pour obtenir des compléments médicamentés : Pour les compléments destinés à être incorporés dans la mouée, ajouter la quantité de pré-mélange **LINCOMIX 44** indiquée dans le tableau suivant au complément pour préparer un complément médicamenté.

Taux du complément par tonne de mouée complète	Quantité de Pré-mélange **LINCOMIX 44** à ajouter au complément pour obtenir un complément médicamenté
25 kg de complément et 975 kg d'autres ingrédients	200 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (8 800 g de base de lincomycine/tonne)
40 kg de complément et 960 kg d'autres ingrédients	125 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (5 500 g de base de lincomycine/tonne)
50 kg de complément et 950 kg d'autres ingrédients	100 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (4 400 g de base de lincomycine/tonne)
100 kg de complément et 900 kg d'autres ingrédients	50 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (2 200 g de base de lincomycine/tonne)

POUR LA DYSENTERIE PORCINE :

Pour le traitement et par la suite le contrôle de la dysenterie porcine (diarrhée de sang) associée à *Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae*.

Mode d'emploi : La mouée complète contenant de la lincomycine aux niveaux de dosage suivants devrait constituer la seule nourriture des porcs en croissance.

Lorsque les porcs ont déjà commencé à montrer des signes de la maladie, administrer 110 grammes de base de lincomycine par tonne de mouée complète (110 mg/kg) pendant 21 jours, ou jusqu'à ce que les signes de la maladie (selles aqueuses, glaireuses ou sanguinolentes) disparaissent; réduire alors la dose de médicament à 44 grammes de base de lincomycine par tonne, (44 mg/kg) et ce, pendant 4 autres semaines. Traiter de nouveau à la dose indiquée ci-dessus si les symptômes de dysenterie réapparaissent.

Instructions pour le mélange : Pour obtenir de la mouée complète médicamentée : Niveau de traitement : Ajouter 2,5 kg de pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne métrique de mouée complète. Vous obtiendrez ainsi une mouée qui contiendra 110 grammes de base de lincomycine par tonne. Niveau de contrôle : Ajouter 1 kg de pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne métrique de mouée complète. La mouée obtenue contiendra 44 grammes de base de lincomycine par tonne.

Pour obtenir des compléments médicamentés : Pour les compléments destinés à être incorporés dans la mouée complète, ajouter la quantité de pré-mélange **LINCOMIX 44** indiquée dans le tableau suivant au complément pour préparer un complément médicamenté.

Taux du complément par tonne de mouée	Quantité de pré-mélange **LINCOMIX 44** à ajouter au complément pour obtenir un complément médicamenté	
	Niveau de traitement	Niveau de contrôle
25 kg complément + 975 kg d'autres ingrédients	100 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (4 400 g de base de lincomycine/tonne)	40 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (1 760 g de base de lincomycine/tonne)
40 kg complément + 960 kg d'autres ingrédients	62,5 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (2 750 g de base de lincomycine/tonne)	25 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (1 100 g de base de lincomycine/tonne)
50 kg complément + 950 kg d'autres ingrédients	50 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (2 200 g de base de lincomycine/tonne)	20 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (880 g de base de lincomycine/tonne)
100 kg complément + 900 kg d'autres ingrédients	25 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (1 100 g de base de lincomycine/tonne)	10 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (440 g de base de lincomycine/tonne)

POUR L'ENTÉROPATHIE PROLIFÉRANTE PORCINE (ILÉITE) : Pour aider à réduire sévérité de l'entéropathie proliférante porcine (iléite) associée à *Lawsonia intracellularis*.

Mode d'emploi : Administrer comme seule nourriture, 110 grammes de base de lincomycine par tonne de mouée complète (110 mg/kg) pendant 21 jours.

Instructions pour le mélange : Pour obtenir de la mouée complète médicamentée : Ajouter 2,5 kg de pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne métrique de mouée complète. Vous obtiendrez ainsi une mouée qui contiendra 110 grammes de base de lincomycine par tonne.

Pour obtenir des compléments médicamentés : Pour les compléments destinés à être incorporés dans la mouée complète, ajouter la quantité de pré-mélange **LINCOMIX 44** indiquée dans le tableau suivant au complément pour préparer un complément médicamenté.

Taux du complément par tonne de mouée	Quantité de pré-mélange **LINCOMIX 44** à ajouter au complément pour obtenir un complément médicamenté
25 kg de complément + 975 kg d'autres ingrédients	100 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (4 400 g de base de lincomycine/tonne)
40 kg de complément + 960 kg d'autres ingrédients	62,5 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (2 750 g de base de lincomycine/tonne)
50 kg de complément + 950 kg d'autres ingrédients	50 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (2 200 g de base de lincomycine/tonne)
100 kg de complément + 900 kg d'autres ingrédients	25 kg de Pré-mélange **LINCOMIX 44** par tonne de complément (1 100 g de base de lincomycine/tonne)

MISES EN GARDE :

1. Les porcs traités à la dose recommandée de 220 grammes de lincomycine par tonne de mouée ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 24 heures après le dermier traitement avec ce médicament.
2. Aucune période de retrait n'est nécessaire lorsque les porcs sont traités au moyen de ce médicament à la dose de 44 ou de 110 grammes de base de lincomycine par tonne.
3. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux.
4. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS :

1. Les porcs traités peuvent présenter un certain amollissement des selles ou une diarrhée légère dans les 36 heures suivant le début du traitement. Une légère irritation ou enflure de l'anus et/ou de la vulve peut être reliée aux changements remarqués dans les selles. En de rares occasions certains porcs peuvent présenter de la rougeur cutanée et de l'irritabilité. Si ces réactions sont plus sévères qui celles décrites plus haut, arrêter d'utiliser ce produit.
2. Ne pas utiliser chez les porcs reproducteurs.
3. Ne pas utiliser dans les aliments contenant des agents d'agglomération, à l'exception des lignosulfonates.
4. Les bonnes techniques de fabrication doivent régir l'addition du pré-mélange **LINCOMIX 44** aux moulées. Ces techniques comprennent un nettoyage soigné afin d'eviter toute contamination croisée. Le pré-mélange **LINCOMIX 44** doit être bien mélangé à la moulée avant d'être utilisé.
5. Les lapins, hamsters, cobayes, chevaux, vaches laitières ou autres ruminants ne doivent pas avoir accès aux moulées contenant de la lincomycine. L'ingestion de ces moulées pourrait provoquer chez ces espèces de graves troubles gastrointestinaux ou métaboliques (par ex., la cétose des vaches laitères).

Ingrédient médicinal :

Chaque kg renferme :

Base de lincomycine (sous forme de chlorhydrate de lincomycine). . . . . 44 g

1 kg = 2,2 lb = 1 000 grams

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec pour empêcher tout durcissement.

Coordonnées : Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir une ou plusieurs fiches de données de sécurité, contactez Phibro Animal Health Corporation au 888-403-0074 ou www.pahc.com. Pour signaler des effets indésirables présumés liés aux médicaments, appelez le 1-888-475-7355.

Fabriqué par :
Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe Centre East, 3rd Fl, 300 Frank W. Burr Blvd, Ste 21, Teaneck, NJ 07666, USA

Importé et distribué par :
Phibro Animal Health, Ltd., 871 Victoria Street North, Suite 207, Kitchener, ON, Canada N2B 3S4

Phibro, le logo Phibro et Lincomix sont des marques déposées appartenant ou sous licence à Phibro Animal Health Corporation ou à ses filiales.

Net 25 kg

0 66104 23109 5

Phibro ANIMAL HEALTH CORPORATION®

CONTIENT UN ANTIMICROBIEN UTILISEZ DE FAÇON RESPONSABLE

232.00mm

308.00mm

232.00mm

333.00mm

Z Reference No.	FG Material No.	Description	Colors
NA	NA	Lincomix 44 25KG (CAN) Bag	BLACK, Dieline, PMS 160 C
Specification / DWG	**Dimensions**	**Country**	
NA	29" x 15" x 5.5"	Canada	
MPD No.	**Date**	**Additional Information**	
12684CR1	4/8/25		