

## English Foil Pouch Label

### SYNOVEX CHOICE<sup>®/MD</sup>

trenbolone acetate and estradiol benzoate implants

DIN 02247115

***Veterinary Use Only***

SYNOVEX Choice is a growth promoting implant containing 100 mg of trenbolone acetate and 14 mg of estradiol benzoate. Each implant consists of four pellets. Ten implants are provided in each cartridge.

**INDICATIONS:** To increase weight gain and improve feed efficiency in feedlot steers and heifers and to increase weight gain in growing beef steers and heifers on pasture.

**DIRECTIONS FOR USE:** One implant (four pellets) is administered to each animal by subcutaneous implantation in the middle one-third of the ear. Approved implantation technique is fully described on the carton fold-out panel. Efficacy has been demonstrated for up to 140 days in feedlot cattle and 90 days in pastured cattle.

**CAUTIONS:** SYNOVEX Choice is not to be used in animals intended for subsequent breeding. Implanting too close to the head may cause abnormal sexual behaviour.

**WARNINGS:** No withdrawal period is required when treated according to the label. Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in ear only; any other location may result in condemnation of the carcass. Do not attempt salvage of implanted site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

**ADVERSE REACTIONS:** Although not all adverse reactions are reported, the following information is based on voluntary post-approval drug experience reporting for Synovex products. It is generally recognized that this results in significant under-reporting. The adverse events listed here reflect reporting and not necessarily causality. Bulling or riding behaviour has been reported rarely with use of this product. Vaginal and rectal prolapse, udder development, ventral edema and elevated tailheads have also been reported.

**STORAGE:** Store between 20 and 25°C with excursions between 15 and 30°C. Avoid light, excessive heat and humidity. Use unopened product before the expiration date printed on the label.

Once the product container pouch is opened, unused product should be returned to the pouch (folding its open end) and stored away from light for up to three months at 2 to 8 °C.

One pouch contains: NET 10 cartridges of 10 doses (100 implants)

Zoetis and SYNOVEX Choice are registered trademarks of Zoetis or its licensors.

Zoetis Canada Inc.

Kirkland QC H9H 4M7

## French Foil Pouch Label

### SYNOVEX CHOICE<sup>®/MD</sup>

Implants d'acétate de trenbolone et de benzoate d'estradiol

*Usage vétérinaire seulement*

**DIN 02247115**

SYNOVEX Choice est un implant pour favoriser la croissance contenant 100 mg d'acétate de trenbolone et 14 mg de benzoate d'estradiol. Chaque implant se compose de quatre granules. Dix implants sont fournis dans chaque cartouche.

**INDICATIONS:** Pour augmenter le gain de poids et améliorer l'efficacité de l'alimentation chez les bouillons et génisses des parcs d'engraissement et pour augmenter le gain de poids chez les bouillons et les génisses de boucherie en croissance élevés en pâturage.

**MODE D'EMPLOI:** Un implant (quatre granules) est administré à chaque animal par implantation sous-cutanée au tiers moyen de l'oreille. La technique d'implantation approuvée est décrite au complet sur le panneau dépliant du carton. L'efficacité a été démontrée jusqu'à 140 jours chez les bovins en parc d'engraissement et 90 jours chez les bovins en pâturage.

**PRÉCAUTIONS :** SYNOVEX Choice ne doit pas être utilisé chez les animaux qui seraient destinés par la suite à la reproduction. L'implantation effectuée trop à proximité de la tête peut causer des anomalies du comportement sexuel.

**MISES EN GARDE :** Aucune période de retrait n'est nécessaire lorsque le produit est utilisé conformément au mode d'emploi. Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. L'implantation des granules se fait dans l'oreille seulement; tout autre emplacement pourrait entraîner la condamnation de la carcasse. Ne pas essayer de récupérer le site de l'implantation pour servir de nourriture pour les humains ou les animaux. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer entre 20 et 25 °C, l'intervalle pouvant s'étendre entre 15 et 30 °C. Éviter la lumière et les excès de chaleur et d'humidité. Utiliser le produit non ouvert avant la date d'expiration imprimée sur l'étiquette.

Une fois la pochette ouverte, le produit non utilisé devrait être remis dans la pochette (qu'il faut refermer) et protégé de la lumière; ainsi, il peut être conservé jusqu'à trois mois entre 2 et 8 °C.

Une pochette contient : NET 10 cartouches de 10 doses (100 implants)

Zoetis<sup>MD</sup> et SYNOVEX Choice sont des marques déposées de Zoetis ou de ses concédants.

Zoetis Canada Inc.  
Kirkland QC H9H 4M7


**Associated label/sticker**

**(added to each pouch during product packaging):**

**LOT: ????????**

**EXP: YYYY-MM**

## Applicateurs SYNOVEX<sup>®</sup>/MD Applicators



### English (Inside Carton)

**SYNOVEX Choice** is indicated for use in feedlot steers and heifers and in growing beef steers and heifers on pasture. When properly administered, **SYNOVEX Choice** Implants can help increase weight gain in beef steers and heifers in feedlots or on pasture and improve feed efficiency in feedlot steers and heifers.

Store between 20 and 25°C with excursions between 15 and 30°C. Avoid light, excessive heat and humidity. Use unopened product before the expiration date printed on the label. Once the product container (pouch) is opened, the unused product should be returned to the pouch (folding its open end) and stored away from light for up to three months at 2 to 8 °C.

**WARNINGS:** No withdrawal period is required when treated according to the label. Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in ear only; any other location may result in condemnation of the carcass. Do not attempt salvage of implanted site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

**HOW TO IMPLANT WITH SYNOVEX Choice PELLETS:** Study the following instructions carefully, then proceed step by step, until the technique becomes routine. Many head can be implanted per hour by an experienced team, one member of which should be assigned to

### French (Inside Carton)







**SYNOVEX Choice** est recommandé pour être utilisé chez les bouvillons et les génisses des parcs d'engraissement et les bouvillons et les génisses de boucherie en croissance élevés en pâturage. Lorsqu'ils sont convenablement administrés, les implants **SYNOVEX Choice** peuvent favoriser l'augmentation de gain de poids chez les bouvillons et les génisses des parcs d'engraissement ou en pâturage et améliorer l'efficacité de l'alimentation chez les bouvillons et les génisses des parcs d'engraissement.

Entreposer entre 20 et 25 °C, l'intervalle pouvant s'étendre entre 15 et 30 °C. Éviter la lumière et les excès de chaleur et d'humidité. Utiliser le produit non ouvert avant la date d'expiration imprimée sur l'étiquette. Une fois la pochette ouverte, le produit non utilisé devrait être remis dans la pochette (qu'il faut refermer) et protégé de la lumière; ainsi, il peut être conservé jusqu'à trois mois entre 2 et 8 °C.

**MISES EN GARDE:** Aucune période de retrait n'est nécessaire lorsque le produit est utilisé conformément au mode d'emploi. Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. L'implantation des granules se fait dans l'oreille seulement; tout autre emplacement pourrait entraîner la condamnation de la carcasse. Ne pas essayer de récupérer le site de l'implantation pour servir de nourriture pour les humains ou les animaux. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

do nothing but the implantation. Hands should be kept clean and only sanitized instruments should be used.

**COMMENT IMPLANTER AVEC LES GRANULES SYNOVEX Choice:** Étudier soigneusement le mode d'emploi suivant, puis procéder étape par étape, jusqu'à ce que la technique devienne une routine. Une équipe expérimentée peut implanter un grand nombre de têtes à l'heure lorsqu'un membre de l'équipe ne s'occupe de rien d'autre que de l'implantation. Les mains doivent rester propres et seuls des instruments désinfectés doivent être utilisés.

<p><b>STEP 1 Loading The Implanter</b> Load the implanter following the directions outlined in the instruction manual accompanying each implanter.</p>		<p><b>ÉTAPE 1 Chargement du fusil à implanter</b> Chargez le fusil à implanter selon les directives fournies dans le manuel d'instructions inclus avec chaque instrument.</p>
<p><b>STEP 2 Restraint</b> The animal must be confined in a restraint mechanism (squeeze chute or head gate). The implant site on the back of the ear should be prepared by scrubbing with a generous-sized piece of cotton that has been soaked in a germicidal solution. <b>Note:</b> If implanting horned cattle, greater safety is provided when the head is controlled by the use of a bull lead (nose tongs).</p>		<p><b>ÉTAPE 2 Contention</b> L'animal doit être immobilisé à l'aide d'un dispositif de contention (cage de contention ou cornalis). Le site d'implantation (au dos de l'oreille) doit être nettoyé avant l'intervention avec un bon morceau de coton trempé dans une solution germicide. <b>Note :</b> Si l'implantation a lieu chez des bêtes à cornes, il est préférable de maîtriser la tête de l'animal avec un "guide à taureau".</p>
<p><b>STEP 3 Implant Site</b> Divide the ear into three imaginary sections as illustrated. The implanted pellets should be deposited in the center one-third of the ear as shown. To accomplish this, the implanter needle should be inserted in the <b>outer</b> one-third of the ear as indicated by the "X" in the illustration. Implanting too close to the head may cause abnormal sexual behavior. Care should be taken to avoid severing the major arteries of the ear.</p>		<p><b>ÉTAPE 3 Site de l'implant</b> Divisez l'oreille en trois sections imaginaires, comme l'illustration l'indique. Les granules implantés devraient être déposés dans le tiers moyen de l'oreille, comme c'est indiqué. Pour ce faire, l'aiguille à implanter devrait être insérée dans le tiers <b>distal</b> de l'oreille tel qu'indiqué par le "X" dans l'illustration. Une implantation trop près de la tête peut causer un comportement sexuel anormal. Il faut faire attention de ne pas sectionner les artères principales de l'oreille.</p>
<p><b>STEP 4 Insert Needle</b> Grasp the ear with one hand. Holding the implanter firmly with the other hand, penetrate the skin at the point shown by the "X". Thrust the needle under the skin, taking care not to penetrate the cartilage. Ease the implanter forward (toward the base of the ear) until the full needle length is beneath the skin.</p>		<p><b>ÉTAPE 4 Insérez l'aiguille</b> Tenez l'oreille d'une main. De l'autre main, tenez fermement le fusil à implanter et pénétrez la peau à l'endroit indiqué par un "X". Poussez l'aiguille sous la peau en ayant soin de ne pas pénétrer le cartilage. Poussez lentement le fusil à implanter (vers la base de l'oreille) jusqu'à ce que toute la longueur de l'aiguille soit sous la peau.</p>
<p><b>STEP 5 Pellet Implantation</b> When the needle is completely inserted, activate the instrument by squeezing the trigger completely. <b>Do not withdraw the needle</b>, but allow the automatic needle retractor to release the pellets. This will allow the pellets to be deposited in a straight line in the path of the retracted needle.</p>		<p><b>ÉTAPE 5 Administration des implants</b> Lorsque l'aiguille est complètement insérée, activez l'instrument en appuyant à fond sur la gâchette. <b>Ne retirez pas l'aiguille</b>; laissez plutôt le rétracteur automatique de l'aiguille libérer les granules. Ceci permettra de déposer les granules en ligne droite sur le parcours de l'aiguille.</p>
<p><b>STEP 6 Inspection</b> Check the implant site. If properly administered, the implants should lie in a straight line under the skin. Disinfect the implanter needle in a germicidal solution and recock the instrument by rotating the cocking grip left, pull back, rotate right, then push all the way forward. You are now ready to implant the next animal.</p>		<p><b>ÉTAPE 6 Inspection</b> Vérifiez le site de l'implantation. Si les implants sont administrés correctement, ils sont alors en ligne droite sous la peau. Désinfectez l'aiguille à implanter dans une solution germicide. Remplacez le levier d'armement du fusil à implanter en effectuant, dans l'ordre, les mouvements suivants: tournez vers la gauche, tirez vers l'arrière, tournez vers la droite et enfin poussez vers l'avant. Vous êtes maintenant prêt à administrer un implant à un autre animal.</p>

**English (Outside Carton)**

**SYNOVEX CHOICE<sup>®</sup>/MD**

trenbolone acetate and estradiol benzoate implants

DIN 02247115

***Veterinary Use Only***

SYNOVEX Choice is a growth promoting implant containing 100 mg of trenbolone acetate and 14 mg of estradiol benzoate. Each implant consists of four pellets. Ten implants are provided in each cartridge.

**INDICATIONS:** To increase weight gain and improve feed efficiency in feedlot steers and heifers and to increase weight gain in growing beef steers and heifers on pasture.

**DIRECTIONS FOR USE:** One implant (four pellets) is administered to each animal by subcutaneous implantation in the middle one-third of the ear. Approved implantation technique is fully described on the carton fold-out panel. Efficacy has been demonstrated for up to 140 days in feedlot cattle and 90 days in pastured cattle.

**CAUTIONS:** SYNOVEX Choice is not to be used in animals intended for subsequent breeding. Implanting too close to the head may cause abnormal sexual behaviour.

**WARNINGS:** No withdrawal period is required when treated according to the label. Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in ear only; any other location may result in condemnation of the carcass. Do not attempt salvage of implanted site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

**ADVERSE REACTIONS:** Although not all adverse reactions are reported, the following information is based on voluntary post-approval drug experience reporting for Synovex products. It is generally recognized that this results in significant under-reporting. The adverse events listed here reflect reporting and not necessarily causality. Bulling or riding behaviour has been reported rarely with use of this product. Vaginal and rectal prolapse, udder development, ventral edema and elevated tailheads have also been reported.

**STORAGE:** Store between 20 and 25°C with excursions between 15 and 30°C. Avoid light, excessive heat and humidity. Use unopened product before the expiration date printed on the label. Once the pouch is opened, the unused product should be returned to the pouch (folding its open end) and stored away from light for up to three months at 2 to 8 °C.

One box contains a single pouch holding: NET 10 cartridges of 10 doses (100 implants)

Zoetis<sup>®</sup> SYNOVEX Choice are registered trademarks of Zoetis or its licensors.

Zoetis Canada Inc.

Kirkland QC H9H 4M7

## French (Outside Carton)

### **SYNOVEX CHOICE®/MD**

Implants d'acétate de trenbolone et de benzoate d'estradiol

#### **Usage vétérinaire seulement**

**DIN 02247115**

SYNOVEX Choice est un implant pour favoriser la croissance contenant 100 mg d'acétate de trenbolone et 14 mg de benzoate d'estradiol. Chaque implant se compose de quatre granules. Dix implants sont fournis dans chaque cartouche.

**INDICATIONS:** Pour augmenter le gain de poids et améliorer l'efficacité de l'alimentation chez les bouvillons et génisses des parcs d'engraissement et pour augmenter le gain de poids chez les bouvillons et génisses de boucherie en croissance élevés en pâturage.

**MODE D'EMPLOI:** Un implant (quatre granules) est administré à chaque animal par implantation sous-cutanée au tiers moyen de l'oreille. La technique d'implantation approuvée est décrite au complet sur le panneau dépliant du carton. L'efficacité a été démontrée jusqu'à 140 jours chez les bovins en parc d'engraissement et 90 jours chez les bovins en pâturage.

**PRÉCAUTIONS:** SYNOVEX Choice ne doit pas être utilisé chez les animaux qui seraient destinés par la suite à la reproduction. L'implantation effectuée trop à proximité de la tête peut causer des anomalies du comportement sexuel.

**MISES EN GARDE:** Aucune période de retrait n'est nécessaire lorsque le produit est utilisé conformément au mode d'emploi. Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. L'implantation des granules se fait dans l'oreille seulement; tout autre emplacement pourrait entraîner la condamnation de la carcasse. Ne pas essayer de récupérer le site de l'implantation pour servir de nourriture pour les humains ou les animaux. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

**RÉACTIONS INDÉSIRABLES :** Bien que tous les effets indésirables ne soient pas signalés, les renseignements suivants sont fondés sur les déclarations volontaires reçues après l'homologation des produits Synovex. Il est généralement admis que leur nombre est significativement sous-estimé. Les réactions indésirables décrites ci-dessous reflètent les réactions déclarées et n'ont pas nécessairement un lien de causalité avec l'emploi du produit. Des comportements de dominance ou de monte ont été rarement rapportés lors de l'utilisation de ce produit. Des cas de prolapsus vaginal et rectal, de développement de la mamelle, d'œdème ventral et de surélévation de la base de la queue ont également été signalés.

**ENTREPOSAGE:** Entreposer entre 20 et 25 °C, l'intervalle pouvant s'étendre entre 15 et 30 °C. Éviter la lumière et les excès de chaleur et d'humidité. Utiliser le produit non ouvert avant la date d'expiration imprimée sur l'étiquette. Une fois la pochette ouverte, le produit non utilisé devrait être remis dans la pochette (qu'il faut refermer) et protégé de la lumière; ainsi, il peut être conservé jusqu'à trois mois entre 2 et 8 °C.

Une boîte contient une seule pochette qui renferme: NET 10 cartouches de 10 doses (100 implants)

Zoetis<sup>MD</sup> et Synovex Choice sont des marques déposées de Zoetis ou de ses concédants.

Zoetis Canada Inc.  
Kirkland QC H9H 4M7

**Upper Closure panel (English/French):**

Lot :

Exp. :