

INDICATIONS: May be used in those conditions known to respond to corticosteroid therapy such as certain inflammatory, allergic or dermatological conditions.

DOSAGE: For cattle and horses use 5 to 10 mg of DEXAMETHASONE BASE daily, administered orally, either by sprinkling on the feed or mixing with a small amount of water and given as a drench.

Each 15 g packet contains 10 mg dexamethasone.

INDICATIONS : Ce produit peut être utilisé contre les affections reconnues sensibles à la corticothérapie, telles que certaines affections inflammatoires, allergiques ou dermatologiques.

POSOLOGIE : Chez les bovins et les chevaux, utiliser 5 à 10 mg de DEXAMETHASONE BASE quotidiennement; administrer la dose par voie orale, en saupoudrant sur l'aliment ou en mélangeant avec une petite quantité d'eau donnée par breuvage.

Chaque sachet de 15 g contient 10 mg de dexaméthasone.




DEXAMÉTHASONE EN POUDRE

For veterinary use only
Pour usage vétérinaire seulement

DIN 00416010

Net Contents / Contenu Net : 15 g



WARNINGS: Treated cattle must not be slaughtered for use in food for at least 7 days after the latest treatment with this drug. Milk taken from treated animals during treatment and within 48 hours after the latest treatment with this drug must not be used as food. This drug is not to be administered to horses that are to be slaughtered for use in food. Keep out of reach of children.

MISES EN GARDE: Les bovins traités avec ce médicament ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 7 jours après la dernière administration du médicament. Le lait provenant des animaux traités ne doit pas être utilisé comme aliment pendant le traitement et dans les 48 heures qui suivent la dernière dose. Ce médicament ne doit pas être administré aux chevaux devant être abattus à des fins alimentaires. Garder hors de la portée des enfants.

DOMINION VETERINARY LABORATORIES LTD.
1199 Sanford St., Winnipeg, Manitoba, Canada R3E 3A1
www.petware.ca - 204-589-7361