

PrCredelio™/MC PLUS
Cartons

Main Panel

<Graphic of dog> X - Xⁱⁱ kg
X - Xⁱⁱⁱ kg

DIN XXXXXXXXX^v

<Elanco Logo>

PrCredelio™ PLUS
(lotilaner and milbemycin oxime)
(lotilaner et oxime de milbémeycine)

Chewable Tablets / Comprimés à croquer

FOR VETERINARY USE ONLY / POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

Xⁱ CHEWABLE TABLET(S)
COMPRIMÉ(S) À CROQUER

<Picture of a dog>

<Graphic of a Flea>
Fleas / Puces

<Graphic of Heartworm>
Heartworm / Ver du cœur

<Graphic of a Tick>
Ticks / Tiques

<Graphic of Roundworm>
Roundworm / Ascaris

<Graphic of a Demodex Mite> <Graphic of a Sarcoptes Mite>
Mites / Acariens

<Graphic of a Calendar>
Monthly dose
Dose mensuelle

<Graphic of Dog Bowl>
Give with food
Administrer avec de la nourriture

X^{iv} mg lotilaner & X^{vi} mg milbemycin oxime chewable tablet
X^{iv} mg lotilaner & X^{vi} mg oxime de milbémeycine comprimé à croquer

Back Panel

Read package insert before use.

Indications: CREDELIO PLUS is for use in dogs and puppies and is indicated:

1. For the treatment and control of adult ticks [*Amblyomma americanum* (Lone Star tick), *Dermacentor variabilis* (American dog tick), *Ixodes scapularis* (black-legged or deer tick) and *Rhipicephalus sanguineus* (brown dog tick)] infestations.

2. For the treatment and prevention of flea (*Ctenocephalides felis*) infestations and as part of a treatment strategy for the control of flea allergy dermatitis (FAD).

3. For the treatment of demodicosis caused by *Demodex canis*.

4. For the treatment and control of roundworms (adult and larval L4 and L5 *Toxocara canis*).

5. For the prevention of heartworm disease (*Dirofilaria immitis*). See CAUTIONS.

6. For the treatment of sarcoptic mange (*Sarcoptes scabiei*).

Warnings: Wash hands after handling the product. In case of accidental ingestion, contact a physician immediately. Keep out of reach of children.

Dosage and Administration: CREDELIO PLUS chewable tablets are given orally once a month, at the dose of 20 - 41 mg lotilaner/kg body weight and 0.75 – 1.53 mg milbemycin oxime/kg body weight. Administer CREDELIO PLUS with food or immediately after feeding.

Contraindications: Do not give to puppies younger than 8 weeks of age or to dogs weighing less than 1.4 kg.

Storage: Store between 5°C and 30°C. Protect from light.

Lire le feuillet d'information de l'emballage avant l'emploi.

Indications : CREDELIO PLUS est indiqué chez les chiens et les chiots :

1. dans le traitement et la maîtrise des infestations de tiques adultes (*Amblyomma americanum* [tique étoilée d'Amérique], *Dermacentor variabilis* [tique américaine du chien], *Ixodes scapularis* [tique à pattes noires ou du chevreuil] et *Rhipicephalus sanguineus* [tique du chenil]);
2. dans le traitement et la prévention des infestations de puces (*Ctenocephalides felis*), et dans le cadre d'une stratégie thérapeutique visant la maîtrise de la dermatite allergique aux piqûres de puces;
3. dans le traitement de la démodécie due au *Demodex canis*;
4. dans le traitement et le contrôle des ascarides (larves de stade L4 ou L5 et adultes de *Toxocara canis*);
5. dans la prévention de la dirofilariose (maladie du ver du cœur) causée par *Dirofilaria immitis* (voir la section PRÉCAUTIONS).
6. dans le traitement de la gale sarcoptique (*Sarcoptes scabiei*).

Mises en garde : Se laver les mains après avoir manipulé le produit. En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin immédiatement. Garder hors de la portée des enfants.

Posologie et mode d'administration : Les comprimés à croquer CREDELIO PLUS sont administrés par voie orale, 1 fois par mois, à la dose de 20 à 41 mg de lotilaner/kg et de 0,75 à 1,53 mg d'oxime de milbémycine/kg de poids corporel. Administrer CREDELIO PLUS avec de la nourriture ou immédiatement après un repas.

Contre-indications : Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 8 semaines ou chez les chiens pesant moins de 1,4 kg.

Conditions d'entreposage : Conserver entre 5 et 30 °C. Protéger de la lumière.

Elanco Canada Limited
1919 Minnesota Court, Suite 401
Mississauga, Ontario L5N 0C9

<Elanco Logo>

Right Panel

PrCredelioTM/MC PLUS
(lotilaner and milbemycin oxime)
(lotilaner et oxime de milbémeycine)

Xⁱ CHEWABLE TABLET(s)
COMPRIMÉ(S) À CROQUER

Left Panel

X - Xⁱⁱ kg
X - Xⁱⁱⁱ kg

PrCredelioTM/MC PLUS
(lotilaner and milbemycin oxime)
(lotilaner et oxime de milbémeycine)

Xⁱ CHEWABLE TABLET(s)
COMPRIMÉ(S) À CROQUER

Top Panel

<Graphic of dog> X – Xⁱⁱ kg
X – Xⁱⁱⁱ kg

PrCredelioTM/MC PLUS
(lotilaner and milbemycin oxime)
(lotilaner et oxime de milbémeycine)

Bottom Panel

Lot:
Exp:

ⁱ 1, 3, 6 or 18 tablets depending on presentation.

ⁱⁱ Body Weight (En)	ⁱⁱⁱ Body Weight (Fr)	^{iv} Lotilaner (En / Fr)	^{vi} Milbemycin Oxime (En / Fr)	^v DIN
1.4 - 2.8 kg	1,4 - 2,8 kg	56.25 mg / 56,25 mg	2.11 mg / 2,11 mg	02525674
>2.8 - 5.5 kg	> 2,8 - 5,5 kg	112.5 mg / 112,5 mg	4.22 mg / 4,22 mg	02525682
>5.5 - 11.0 kg	> 5,5 - 11,0 kg	225 mg	8.44 mg / 8,44 mg	02525690
>11.0 - 22.0 kg	> 11,0 - 22,0 kg	450 mg	16.88 mg / 16,88 mg	02525704
>22.0 - 45.0 kg	> 22,0 - 45,0 kg	900 mg	33.75 mg / 33,75 mg	02525712

PrCredelio™ PLUS
Package Insert

PrCredelio™ PLUS

(lotilaner and milbemycin oxime chewable tablets)

FOR VETERINARY USE ONLY

DESCRIPTION

CREDELIO PLUS (lotilaner and milbemycin oxime) is an oral, once-a-month, flavoured chewable tablet for dogs and puppies. CREDELIO PLUS is a white to beige round biconvex chewable tablet with brownish spots, beveled edges, and the letter "I" debossed on one side of the tablet.

THERAPEUTIC CLASSIFICATION

Lotilaner is a member of the isoxazoline family. Lotilaner has the chemical composition of 5-[(5S)-4,5-dihydro-5-(3,4,5-trichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-3-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]-2-thiophenecarboxamide.

Milbemycin oxime is a macrocyclic lactone containing two major factors, A₃ and A₄.

INDICATIONS

CREDELIO PLUS is for use in dogs and puppies and is indicated:

1. For the treatment and control of adult ticks [*Amblyomma americanum* (Lone Star tick), *Dermacentor variabilis* (American dog tick), *Ixodes scapularis* (black-legged or deer tick) and *Rhipicephalus sanguineus* (brown dog tick)] infestations.
2. For the treatment and prevention of flea (*Ctenocephalides felis*) infestations and as part of a treatment strategy for the control of flea allergy dermatitis (FAD).
3. For the treatment of demodicosis caused by *Demodex canis*.
4. For the treatment and control of roundworms (adult and larval L4 and L5 *Toxocara canis*).
5. For the prevention of heartworm disease (*Dirofilaria immitis*). See CAUTIONS.
6. For the treatment of sarcoptic mange (*Sarcoptes scabiei*).

CREDELIO PLUS is intended for use where treatment and/or prevention of two or more of the indications above is required concurrently.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

CREDELIO PLUS chewable tablets are given orally once a month, at the dose of 20 - 41 mg lotilaner/kg body weight and 0.75 – 1.53 mg milbemycin oxime/kg body weight.

Use the table to find the right dose for the dog's weight.

Dosage Schedule

Body Weight Ranges (kg)	Lotilaner Content per Tablet (mg)	Milbemycin Oxime Content per Tablet (mg)	Tablets to be Administered
1.4 to 2.8	56.25	2.11	One
>2.8 to 5.5	112.5	4.22	One
>5.5 to 11.0	225	8.44	One
>11.0 to 22.0	450	16.88	One
>22.0 to 45.0	900	33.75	One
>45.0	Administer the appropriate combination of tablets		

Administer CREDELIO PLUS with food or immediately after feeding.

Tick Treatment and Control

Treatment with CREDELIO PLUS may begin at any time of the year.

Flea Treatment and Prevention

Treatment with CREDELIO PLUS may begin at any time of the year, preferably starting one month before fleas become active and continuing monthly through the end of flea season.

To minimize the likelihood of flea reinfestation, it is important to treat all animals within a household with an approved flea protection product.

Demodicosis Treatment

Administer CREDELIO PLUS monthly for two consecutive months. Treatment should be continued until two negative skin scrapings are obtained one month apart. Severe cases may require prolonged monthly treatments. As demodicosis is a multi-factorial disease, where possible, it is advisable to also treat any underlying disease appropriately and monitor dogs for recurrence. Severe cases of generalized demodicosis may be difficult to cure.

Nematode Treatment and Control

CREDELIO PLUS can be used as part of the seasonal treatment of ticks and/or fleas in dogs with diagnosed, or at risk from, concurrent gastrointestinal nematode infections. A single treatment is effective for the treatment of the indicated gastrointestinal roundworm stages.

Heartworm Prevention

For the prevention of heartworm disease, CREDELIO PLUS must be given at regular monthly intervals during the time of the year when mosquitoes, ticks and/or fleas are present. CREDELIO PLUS should be administered at monthly intervals beginning within 1 month of the dog's first seasonal exposure to mosquitoes and continuing until 2 months after the dog's last seasonal exposure, based on the local epidemiological situation.

Dogs travelling to a heartworm region should start medication within a month after arrival there.

Heartworm prevention treatment should be continued monthly, with the last administration being given 2 months after the dog has left the region.

Treatment of Sarcoptic Mange

For the treatment of sarcoptic mange (caused by *Sarcoptes scabiei*) CREDELIO PLUS should be administered monthly for two consecutive months.

CONTRAINDICATIONS

Do not give to puppies younger than 8 weeks of age or to dogs weighing less than 1.4 kg.

CAUTIONS

The safe use of CREDELIO PLUS in breeding, pregnant or lactating dogs has not been evaluated.

CREDELIO PLUS is not 100% effective for the prevention of all strains of heartworm (see EFFICACY).

All dogs > 6 months of age should be tested for existing heartworm infection prior to starting treatment for the first time. Annual testing of all dogs for heartworm should be done.

Lotilaner is a member of the isoxazoline class. This class has been associated with neurological adverse reactions including tremors, ataxia, and seizures. Seizures have been reported in dogs receiving isoxazoline class drugs, even in dogs without a history of seizures. Use with caution in dogs with a history of seizures or neurological disorders.

Lotilaner and milbemycin oxime have been shown to be a substrate for P-glycoprotein (P-gp) and therefore could interact with other P-gp substrates (for example, digoxin, doxorubicin) or other macrocyclic lactones. Therefore, concomitant treatment with other P-gp substrates could lead to enhanced toxicity.

Some Collies and other p-glycoprotein-deficient dogs with MDR or ABCB1-1 delta gene mutation are known to be more sensitive to the macrocyclic lactone class of medications. Such dogs may be susceptible to macrocyclic lactone toxicity with over-dosing or when used in combination with other P-gp drugs. Signs of depression, hypersalivation, tremor and ataxia have been associated with macrocyclic lactone toxicity.

Fleas and ticks need to start feeding on the dog to become exposed to lotilaner; therefore the risk of transmission of vector-borne diseases cannot be excluded.

Parasite resistance to any particular class of parasiticides may develop following the frequent, repeated use of a product of that class. Therefore, the use of this product should be based on the assessment of each individual case and on local epidemiological information about the current susceptibility of the target species in order to limit the possibility of a future selection for resistance.

WARNINGS

Wash hands after handling the product. In case of accidental ingestion, contact a physician immediately. Keep out of reach of children.

ADVERSE REACTIONS

In clinical studies, no serious adverse reactions were reported and adverse reactions such as gastrointestinal signs (diarrhea, vomiting and colitis), anorexia, lethargy, hepatopathy, pruritus and changes in behaviour were uncommonly (more than 1 but less than 10 animals in 1,000 animals treated) reported. These occurrences were generally self-limiting and of short duration.

In a multi-centred field effectiveness and safety conducted in the USA, 159 client owned dogs received CREDELIO PLUS and 158 client owned dogs received a positive control article. The treatments were administered once monthly for up to 11 months. The table below is a Summary of the Adverse Events occurring at 1% or greater (animal rate) in the safety population.

Adverse Event	CREDELIO PLUS n=159	Positive Control Article n=158
Diarrhea	8.81% (14)	6.96% (11)
Emesis	8.18% (13)	9.49% (15)
Anorexia	5.03% (8)	6.96% (11)
Lethargy	3.14% (5)	2.53% (4)
Uncoded Sign*	2.52% (4)	5.06% (8)
Hemorrhagic Diarrhea	1.89% (3)	1.27% (2)
Hepatopathy	1.89% (3)	0.63% (1)
Pruritus	1.26% (2)	3.16% (5)
Colitis	1.26% (2)	1.90% (3)
Aggression	1.26% (2)	0.63% (1)
Digestive Tract Hemorrhage not otherwise specified	1.26% (2)	0% (0)
Hyperactivity	1.26% (2)	0% (0)
Ataxia	0% (0)	1.27% (2)

*Dogs that had parasitic infections/infestations indicated for treatment and control by the drug the dog received.

To report suspected adverse drug events or for technical assistance, contact Elanco Canada Limited at 1-800-265-5475.

PHARMACOLOGY

Pharmacodynamics

Lotilaner

Lotilaner is an insecticide and acaricide of the isoxazoline family. It is a pure enantiomer that is active against some species of flea, mange mites and adult ticks .

Lotilaner is a potent inhibitor of gamma-aminobutyric acid (GABA)-gated chloride channels and to a lesser extent of glutamate-gated chloride ion channels of insects and ticks, resulting in rapid death of ticks and fleas.

Milbemycin Oxime

Milbemycin oxime is a systemically active macrocyclic lactone isolated from the fermentation of *Streptomyces hygroscopicus* var. *aureolacrimosus*. It contains two major factors, A₃ and A₄ (ratio of A₃:A₄ is 20:80). Milbemycin oxime is an antiparasitic endectocide with activity against larval (L4/L5) and adult stages of nematodes, as well as larvae (L3/L4) of *Dirofilaria immitis*.

The activity of milbemycin oxime is related to its action on invertebrate neurotransmission. Milbemycin oxime, like avermectins and other milbemycins, increases nematode and insect membrane permeability to chloride ions via glutamate-gated chloride ion channels. This leads to hyperpolarisation of the neuromuscular membrane and flaccid paralysis and death of the parasite.

Pharmacokinetics

Absorption

Lotilaner is readily absorbed following oral administration and peak plasma concentration is reached within 3-5 hours. Milbemycin A₃ 5-oxime and milbemycin A₄ 5-oxime are also rapidly absorbed following oral administration with a T_{max} of approximately 2 - 4 hours for each drug substance. Food enhances the absorption of both lotilaner and milbemycin oxime. The bioavailability of lotilaner is 75% and that of milbemycin (A₃ and A₄ 5-oximes) is approximately 60%.

Distribution

Lotilaner and milbemycin A₃ and A₄ 5-oximes are extensively distributed in dogs where volume of distribution after intravenous administration is 3 - 4 L/kg. Plasma protein binding is high for both lotilaner and milbemycin oxime (>95%).

Metabolism and Excretion

Lotilaner is metabolized to a small extent into more hydrophilic compounds which are observed in faeces and urine.

The major route of elimination for lotilaner is biliary excretion, with renal excretion being the minor route of elimination (less than 10% of the dose). Pharmacokinetics change as young puppies grow to adult dogs. The terminal half-life is approximately 10 days in puppies at 2 months of age. The terminal half-life is approximately 24 days in the adult dog. The long terminal half-life in the adult dog provides effective blood concentrations

for the entire duration of the inter-dosing interval. With repeated monthly doses, accumulation is observed with steady state being reached after the fourth monthly dose.

The primary fecal and urinary metabolites of milbemycin oxime in dog were identified as glucuronide conjugates of milbemycin A₃ or A₄ 5-oximes, dealkylated milbemycin A₃ or A₄ 5-oximes, and hydroxylated milbemycin A₄ 5-oxime. Hydroxymilbemycin A₄ 5-oxime was detected only in plasma, but not in urine or feces, suggesting predominant excretion of conjugated metabolites in the dog.

Milbemycin A₄ 5-oxime eliminates more slowly than milbemycin A₃ 5-oxime (clearance after intravenous administration was 47.0 and 106.8 mL/h/kg, respectively) resulting in exposure (AUC) to milbemycin A₄ that is higher than to milbemycin A₃ 5-oxime. The mean elimination half-lives were 27 hours for A₃ and 57 hours for A₄ in the adult dog. The clearance of milbemycin oxime was higher and the terminal half-lives were shorter for milbemycin oxime in puppies. Excretion of milbemycin A₃ and A₄ 5-oxime is primarily via faeces, and also to a lesser extent in the urine.

SAFETY

In a margin of safety study, CREDELIO PLUS was administered orally to 24, 8-week-old Beagle puppies at average doses of 1, 3 and 5 times the recommended dose at 28-day intervals over a 9-month period. In a separate margin of safety study, CREDELIO PLUS was administered orally to 24, 11-month-old Beagle puppies at average doses of 1, 3 and 5 times the recommended dose at 28-day intervals over a 7-month period.

In both studies, the dose multiples were achieved by administering the 1x dose for 1, 3 or 5 consecutive days during each dose cycle. There were also 8 control dogs that were not treated in both studies. CREDELIO PLUS was not associated with any clinically significant changes in daily observations, body weights, food consumption data, ophthalmoscopic, physical and neurological examinations, and hematology, clinical chemistry, coagulation or urinalysis parameters. Treatment with CREDELIO PLUS was not associated with any other clinically significant adverse clinical observations, gross pathology or histopathological changes.

In a third study, CREDELIO PLUS was administered orally to 36, 12-month-old Beagle dogs at average doses of 1, 3 and 6 times the maximum recommended dose on a single occasion. There were also 12 control dogs that were not treated. CREDELIO PLUS was not associated with any clinically significant changes in daily observations, food consumption data, physical and neurological examinations, or adverse clinical observations.

EFFICACY

Ticks: In one well-controlled laboratory study, CREDELIO PLUS was effective against *Rhipicephalus sanguineus* (brown dog tick) with ≥99% effectiveness 48 hours post-infestation for 30 days.

Fleas: In a laboratory study, CREDELIO PLUS killed 100% of fleas within 24 hours through Day 30.

Demodex Mites: In a pivotal Brazilian field study, lotilaner and milbemycin oxime was 100% efficacious when administered once monthly for two consecutive months for the treatment of generalized demodectic mange caused by *Demodex canis* in naturally infested dogs.

Intestinal Nematode: In two additional laboratory studies, CREDELIO PLUS was ≥96.8% effective against immature (fourth stage larvae and immature adult) *Toxocara canis* (roundworm).

Heartworm: In a well-controlled laboratory study, a single dose of CREDELIO PLUS was 100% effective against induced heartworm infections using a heartworm isolate obtained from Georgia (Georgia II isolate). In two laboratory studies using the Wildcat isolate efficacy ranged from 79.6-88.4% when CREDELIO PLUS was administered monthly for up to 6 months.

In another well-controlled laboratory study, CREDELIO PLUS was 100% effective against induced heartworm infections when administered for 2 consecutive monthly doses. This study was conducted using a heartworm isolate obtained from South Carolina (Berkeley isolate).

In a positive-controlled 11-month US field study in client owned dogs, no dogs treated with CREDELIO PLUS were positive for heartworm infection as determined by heartworm antigen testing and microfilaria testing. CREDELIO PLUS was used concurrently with other medications, such as vaccines, anthelmintics, antibiotics, steroids, NSAIDs, anesthetics, and antihistamines. No adverse reactions were attributed to the concomitant use of CREDELIO PLUS with other medications.

Sarcoptic Mange: In a laboratory study in 3 groups of dogs naturally infested with *Sarcoptes scabiei* the efficacy of lotilaner and Credelio Plus (lotilaner combined with milbemycin) were evaluated. Treatments were administered twice at a 28 day interval and compared against a negative control group. On Day 28, the efficacy of lotilaner was 92.9% and the efficacy of Credelio Plus was 93.6%. On Day 57, 100% efficacy was observed for both drugs. Mite counts were statistically lower in both treated groups compared to the negative control group.

In a well-controlled field study conducted in Albania, Greece and Italy, lotilaner was 100% effective against *Sarcoptes scabiei* after monthly administration for two consecutive months. Comparative bioavailability data showed lotilaner alone was less

bioavailable than lotilaner and milbemycin in combination, therefore the field study data supported the efficacy of Credelio Plus for the treatment of *Sarcoptes scabiei* in dogs treated for two consecutive months.

Palatability

In the U.S. field efficacy study with client owned dogs, 806 doses of CREDELIO PLUS were given to 159 dogs with 100% administration success by dog owners. There were no reports of unsuccessful dosing. Eighty-one percent of the doses were accepted when offered either free choice or with food; 18.2% of doses were administered by placing the tablet in the back of the dog's mouth.

STORAGE CONDITIONS

Store between 5°C and 30°C. Protect from light.

HOW SUPPLIED

The product is available in five sizes: 56.25/2.11, 112.5/4.22, 225/8.44, 450/16.88, or 900/33.75 mg lotilaner/milbemycin oxime per tablet. Each chewable tablet size is available in colour-coded packages of 1, 3, 6 or 18 flavoured chewable tablets. Not all package sizes may be marketed.

MANUFACTURED FOR

Elanco Canada Limited
1919 Minnesota Court, Suite 401
Mississauga, Ontario L5N 0C9

DATE: March 2026

Credelio, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.
© 2026 Elanco or its affiliates.

<Elanco Logo>

PrCredelio^{MC} PLUS
Notice

PrCredelio^{MC} PLUS

(comprimés à croquer de lotilaner et d'oxime de milbémycine)

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

DESCRIPTION

CREDELIO PLUS (lotilaner et oxime de milbémycine) est un comprimé à croquer aromatisé, administré par voie orale 1 fois par mois, pour chiens et chiots. CREDELIO PLUS est offert en comprimés à croquer biconvexes ronds, de couleur blanche à beige avec des taches brunâtres, des bords biseautés et la lettre « I » inscrite en creux sur une face du comprimé.

CLASSE THÉRAPEUTIQUE

Le lotilaner appartient à la famille des isoxazolines. La composition chimique du lotilaner est 5-[(5S)-4,5-dihydro-5-(3,4,5-trichlorophényl)-5-(trifluorométhyl)-3-isoxazolyl]-3-méthyl-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroéthyl)amino]éthyl]-2-thiophène-carboxamide.

L'oxime de milbémycine est une lactone macrocyclique qui renferme deux principaux facteurs, A₃ et A₄.

INDICATIONS

CREDELIO PLUS est indiqué chez les chiens et les chiots :

1. dans le traitement et la maîtrise des infestations de tiques adultes (*Amblyomma americanum* [tique étoilée d'Amérique], *Dermacentor variabilis* [tique américaine du chien], *Ixodes scapularis* [tique à pattes noires ou du chevreuil] et *Rhipicephalus sanguineus* [tique du chenil]);
2. dans le traitement et la prévention des infestations de puces (*Ctenocephalides felis*), et dans le cadre d'une stratégie thérapeutique visant la maîtrise de la dermatite allergique aux piqûres de puces;
3. dans le traitement de la démodécie due au *Demodex canis*;
4. dans le traitement et le contrôle des ascarides (larves de stade L4 ou L5 et adultes de *Toxocara canis*);
5. dans la prévention de la dirofilariose (maladie du ver du cœur) causée par *Dirofilaria immitis* (voir la section PRÉCAUTIONS).
6. dans le traitement de la gale sarcoptique (*Sarcoptes scabiei*).

CREDELIO PLUS est indiqué lorsque le traitement et/ou la prévention d'au moins deux des maladies comprises dans les indications ci-dessus sont requis simultanément.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Les comprimés à croquer CREDELIO PLUS sont administrés par voie orale, 1 fois par mois, à la dose de 20 à 41 mg de lotilaner/kg et de 0,75 à 1,53 mg d'oxime de milbémécine/kg de poids corporel.

Utiliser le tableau pour trouver la bonne dose en fonction du poids du chien.

Schéma posologique

Intervalle de poids corporel (kg)	Lotilaner – Teneur par comprimé (mg)	Oxime de milbémécine – Teneur par comprimé (mg)	Nombre de comprimés à administrer
1,4 – 2,8	56,25	2,11	1
> 2,8 – 5,5	112,5	4,22	1
> 5,5 – 11,0	225	8,44	1
> 11,0 – 22,0	450	16,88	1
> 22,0 – 45,0	900	33,75	1
> 45,0	Administer le nombre approprié de comprimés		

Administrer CREDELIO PLUS avec de la nourriture ou immédiatement après un repas.

Traitement et maîtrise des infestations de tiques

Le traitement par CREDELIO PLUS peut être instauré à n'importe quel moment de l'année.

Traitement et prévention des infestations de puces

Le traitement par CREDELIO PLUS peut être instauré à n'importe quel moment de l'année, de préférence 1 mois avant que les puces deviennent actives, et se poursuivre mensuellement jusqu'à la fin de la saison des puces.

Pour réduire au minimum la possibilité d'une nouvelle infestation de puces, il est important de traiter tous les animaux à la maison à l'aide d'un produit antipuces homologué.

Traitement de la démodécie

CREDELIO PLUS doit être administré une fois par mois pendant deux mois.

Le traitement doit être continu jusqu'à ce que deux raclages cutanés négatifs soient obtenus à un mois d'intervalle. Les cas plus graves peuvent nécessiter des traitements mensuels prolongés. La démodécie est une maladie multifactorielle pour laquelle il est également conseillé de traiter adéquatement toute maladie sous-jacente, le cas échéant, et de surveiller les chiens pour détecter toute récurrence. Les cas graves de démodécie généralisée peuvent être difficiles à traiter.

Traitement et contrôle des nématodes

CREDELIO PLUS peut être utilisé pour le traitement saisonnier des tiques et/ou des puces chez les chiens qui ont une infection concomitante par des nématodes gastro-

intestinaux diagnostiquée ou qui présentent un risque d'une telle infection. Un seul traitement se révèle efficace pour le traitement des ascarides gastro-intestinaux aux stades indiqués.

Prévention de la dirofilariose

Pour la prévention de la dirofilariose, CREDELIO PLUS doit être donné régulièrement à intervalles de 1 mois durant la période de l'année où les moustiques, les tiques et/ou les puces sont présents. CREDELIO PLUS doit être administré à intervalles de 1 mois, à partir du mois qui suit la première exposition saisonnière aux moustiques, et le traitement doit être poursuivi pendant 2 mois après la dernière exposition saisonnière, en fonction de la situation épidémiologique locale.

Pour les chiens qui voyagent dans une région où la dirofilariose est présente, le traitement doit être amorcé au cours du mois qui suit leur l'arrivée dans cette région.

Le traitement préventif contre la dirofilariose doit être poursuivi 1 fois par mois, et la dernière dose doit être administrée 2 mois après que le chien a quitté la région.

Traitement de la gale sarcoptique

Pour le traitement de la gale sarcoptique (causée par *Sarcoptes scabiei*), CREDELIO PLUS doit être administré tous les mois pendant deux mois consécutifs.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 8 semaines ou chez les chiens pesant moins de 1,4 kg.

PRÉCAUTIONS

L'innocuité de CREDELIO PLUS n'a pas été évaluée chez les chiens reproducteurs ni chez les chiennes gestantes ou qui allaitent.

CREDELIO PLUS n'est pas efficace à 100 % contre toutes les souches de *Dirofilaria* (voir la section EFFICACITÉ).

Tous les chiens âgés de 6 mois ou plus devraient faire l'objet d'un test de dépistage de la dirofilariose avant de recevoir un traitement préventif pour la première fois. Le dépistage annuel de la dirofilariose est recommandé pour tous les chiens.

Le lotilaner appartient à la classe des isoxazolines. Cette classe a été associée à des réactions indésirables neurologiques, dont des tremblements, une ataxie et des crises convulsives. Des crises convulsives ont été signalées chez des chiens recevant des médicaments de la classe des isoxazolines, même chez des chiens sans antécédents de crises convulsives. Utiliser avec prudence chez des chiens qui ont des antécédents de crises convulsives ou de troubles neurologiques.

Le lotilaner et l'oxime de milbémycine sont des substrats de la glycoprotéine P (P-gp) et pourraient donc interagir avec d'autres substrats de la P-gp (par exemple, la digoxine et

la doxorubicine) ou d'autres lactones macrocycliques. Par conséquent, le traitement concomitant avec d'autres substrats de la P-gp pourrait entraîner une toxicité accrue.

On sait que certains colleys et autres chiens ayant une carence en P-gp et une mutation du gène MDR1 ou ABCB1 démontrent une sensibilité accrue aux médicaments de la classe des lactones macrocycliques. Ces chiens peuvent présenter des effets de toxicité des lactones macrocycliques (par exemple, de l'abattement, de l'hypersalivation, des tremblements ou une ataxie) en cas de surdosage ou lorsqu'ils reçoivent en concomitance d'autres médicaments substrats de la P-gp.

Étant donné que les puces et les tiques doivent d'abord se nourrir sur l'animal pour être exposées au lotilaner, le risque de transmission de maladies à vecteur ne peut être exclu.

Une résistance des parasites à une classe particulière d'antiparasitaires peut survenir par suite de l'utilisation fréquente et répétée d'un produit de cette classe. Par conséquent, la décision d'utiliser ce produit devrait être fondée sur l'évaluation de chaque cas individuel et sur l'information épidémiologique locale concernant la sensibilité actuelle de l'espèce parasitaire cible, afin de limiter la possibilité d'exercer une pression de sélection en faveur des parasites résistants.

MISES EN GARDE

Se laver les mains après avoir manipulé le produit. En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin immédiatement. Garder hors de la portée des enfants.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Dans les études cliniques, aucune réaction indésirable grave n'a été relevée, et les cas signalés de réactions telles que signes gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements et colite), anorexie, léthargie, hépatopathie, prurit et altération du comportement ont été peu fréquents (plus de 1, mais moins de 10 cas par 1 000 animaux traités). Ces réactions ont généralement disparu spontanément et ont été de courte durée.

Lors d'une étude multicentrique sur l'efficacité et l'innocuité menée sur le terrain aux États-Unis, 159 chiens appartenant à des clients ont reçu CREDELIO PLUS et 158 chiens appartenant à des clients ont reçu un produit actif de comparaison. Les traitements ont été administrés une fois par mois, pendant une durée maximale de 11 mois. Le tableau ci-dessous résume les réactions indésirables signalées chez 1 % ou plus des animaux dans la population de l'analyse d'innocuité.

Réaction indésirable	CREDELIO PLUS n = 159	Produit actif de comparaison n = 158
Diarrhée	8,81 % (14)	6,96 % (11)
Vomissements	8,18 % (13)	9,49 % (15)
Anorexie	5,03 % (8)	6,96 % (11)
Léthargie	3,14 % (5)	2,53 % (4)

Autre réaction (sans code)*	2,52 % (4)	5,06 % (8)
Diarrhée hémorragique	1,89 % (3)	1,27 % (2)
Hépatopathie	1,89 % (3)	0,63 % (1)
Prurit	1,26 % (2)	3,16 % (5)
Colite	1,26 % (2)	1,90 % (3)
Agressivité	1,26 % (2)	0,63 % (1)
Saignement digestif (sans autre précision)	1,26 % (2)	0 % (0)
Hyperactivité	1,26 % (2)	0 % (0)
Ataxie	0 % (0)	1,27 % (2)

*Les chiens avaient l'infection/infestation parasitaire indiquée correspondant au traitement et contrôle par la drogue que le chien a reçue.

Pour signaler tout effet indésirable soupçonné du médicament ou pour obtenir un soutien technique, appeler Elanco Canada Limited au 1-800-265-5475.

PHARMACOLOGIE

Pharmacodynamie

Lotilaner

Le lotilaner est un insecticide et un acaricide de la famille des isoxazolines. C'est un énantiomère pur qui s'est avéré efficace contre certaines espèces de puces, d'acariens de la gale et de tiques adultes.

Le lotilaner est un puissant inhibiteur des canaux chlorure GABA (acide gamma-aminobutyrique)-dépendants et, dans une moindre mesure, des canaux chlorure glutamate-dépendants chez les insectes et les tiques, ce qui entraîne la mort rapide des tiques et des puces.

Oxime de milbémycine

L'oxime de milbémycine est une lactone macrocyclique active obtenue par la fermentation de *Streptomyces hygroscopicus* var. *aureolacrimosus*. Elle renferme deux principaux facteurs, A₃ et A₄ (rapport A₃:A₄ de 20:80). C'est un antiparasitaire endectocide actif sur les formes larvaire (L4 et L5) et adulte des nématodes, ainsi que sur les larves (L3 et L4) de *Dirofilaria immitis*.

L'activité de l'oxime de milbémycine est liée à son action sur la neurotransmission chez les invertébrés. L'oxime de milbémycine, tout comme les avermectines et les autres milbémycines, augmente chez les nématodes et les insectes la perméabilité membranaire aux ions chlorure par l'intermédiaire des canaux chlorure glutamate-dépendants. Cela provoque une hyperpolarisation de la membrane neuromusculaire qui entraîne la paralysie et la mort des parasites.

Pharmacocinétique

Absorption

Après administration orale, le lotilaner est facilement absorbé et atteint sa concentration plasmatique maximale en l'espace de 3 à 5 heures. La 5-oxime de milbémycine A₃ et la 5-oxime de milbémycine A₄ sont rapidement absorbées après leur administration orale, le T_{max} étant d'environ 2 à 4 heures pour chacune des deux substances médicamenteuses. La nourriture augmente l'absorption du lotilaner et celle de l'oxime de milbémycine. La biodisponibilité du lotilaner est de 75 %, et celle de la milbémycine (5-oxime A₃ et A₄) est d'environ 60 %.

Distribution

Le lotilaner et les 5-oxime de milbémycine A₃ et A₄ sont largement distribués chez le chien, le volume de distribution après administration intraveineuse étant de 3 à 4 L/kg. La liaison du lotilaner et de l'oxime de milbémycine aux protéines plasmatiques est élevée (> 95 %).

Biotransformation et excrétion

Le lotilaner est transformé dans une faible proportion en composés plus hydrophiles, qui se retrouvent dans les fèces et l'urine.

L'excrétion biliaire est la principale voie d'élimination du lotilaner et l'excrétion rénale, la voie d'élimination mineure (moins de 10 % de la dose). La pharmacocinétique change lorsque le chiot devient un chien adulte. La demi-vie terminale est d'environ 10 jours chez les chiots âgés de 2 mois. La demi-vie terminale est d'environ 24 jours chez le chien adulte. La longue demi-vie terminale chez le chien adulte assure des concentrations sanguines efficaces pendant toute la durée de l'intervalle entre deux doses. L'administration répétée de doses mensuelles entraîne une accumulation, et l'état d'équilibre est atteint après la 4^e dose mensuelle.

Les principaux métabolites fécaux et urinaires de l'oxime de milbémycine identifiés chez le chien sont les conjugués glucuronide de 5-oxime de milbémycine A₃ ou A₄, la 5-oxime de milbémycine A₃ ou A₄ désalkylée, et la 5-oxime de milbémycine A₄ hydroxylée. La 5-oxime d'hydroxymilbémycine A₄ n'a été détectée que dans le plasma, et non dans les urines ni dans les selles, ce qui suggère une excrétion prédominante de métabolites conjugués chez le chien.

La 5-oxime de milbémycine A₄ est éliminée plus lentement que la 5-oxime de milbémycine A₃ (la clairance après l'administration intraveineuse était respectivement de 47,0 et 106,8 mL/h/kg), ce qui entraîne une exposition à la 5-oxime de milbémycine A₄ (aire sous la courbe [ASC]) environ 10 fois plus élevée que l'exposition à la 5-oxime de milbémycine A₃. Les demi-vies d'élimination moyennes étaient de 27 heures pour la forme A₃ et de 57 heures pour la forme A₄ chez le chien adulte. Chez le chiot, la clairance de l'oxime de milbémycine était plus rapide, et les demi-vies terminales étaient plus courtes que chez le chien adulte. L'excrétion de la 5-oxime de milbémycine A₃ et A₄ se fait principalement par les fèces, et aussi, dans une moindre mesure, dans les urines.

INNOCUITÉ

Dans le cadre d'une étude sur la marge d'innocuité, CREDELIO PLUS a été administré par voie orale à 24 chiots Beagle de 8 semaines à des doses moyennes équivalant à 1, 3 et 5 fois la dose maximale recommandée à intervalles de 28 jours sur une période de 9 mois. Dans une autre étude sur la marge d'innocuité, CREDELIO PLUS a été administré par voie orale à 24 chiots Beagle de 11 mois à des doses moyennes équivalant à 1, 3 et 5 fois la dose maximale recommandée à intervalles de 28 jours sur une période de 7 mois.

Dans les deux études, les multiples de la dose ont été obtenus par l'administration de 1 dose par jour pendant 1, 3 ou 5 jours consécutifs durant chaque cycle de doses. Les deux études comprenaient également un groupe témoin composé de 8 chiens non traités. CREDELIO PLUS n'a pas été associé à des changements cliniquement importants concernant les données sur les observations quotidiennes, le poids corporel et la consommation d'aliments; les résultats des examens ophtalmoscopiques, physiques et neurologiques et les paramètres relatifs à l'hématologie, à la chimie clinique, à la coagulation ou aux analyses d'urine. Le traitement par CREDELIO PLUS n'a été associé à aucune autre observation clinique indésirable importante sur le plan clinique ni aucune modification pathologique macroscopique ou modification histopathologique.

Dans le cadre d'une troisième étude sur la marge d'innocuité, CREDELIO PLUS a été administré par voie orale à 36 chiens Beagle de 12 mois à des doses moyennes équivalant à 1, 3 et 6 fois la dose maximale recommandée en une seule prise. L'étude comprenait également un groupe témoin composé de 12 chiens non traités. CREDELIO PLUS n'a pas été associé à des changements cliniquement importants concernant les données sur les observations quotidiennes et la consommation d'aliments; les résultats des examens physiques et neurologiques, ou les observations cliniques indésirables.

EFFICACITÉ

Tiques : Dans le cadre d'une étude de laboratoire bien contrôlée, CREDELIO PLUS s'est avéré efficace contre *Rhipicephalus sanguineus* (tique du chenil) avec au moins 99 % d'efficacité, 48 heures après l'infestation, pendant une période de 30 jours.

Puces : Au cours d'une étude de laboratoire, CREDELIO PLUS a tué 100 % des puces dans les 24 heures et jusqu'au jour 30.

Acarions *Demodex* : Lors d'une étude de terrain brésilienne majeure, le lotilaner et l'oxime de milbémycine ont démontré une efficacité de 100 % en étant administrés une fois par mois pendant deux mois dans le cadre du traitement de la gale démodectique généralisée due au *Demodex canis* chez des chiens infectés naturellement.

Nématodes intestinaux : Dans deux autres études de laboratoire, CREDELIO PLUS s'est révélé efficace à $\geq 96,8$ % contre les formes immatures (larves de stade 4 et adultes immatures) de *Toxocara canis* (ascaride).

Ver du cœur : Dans le cadre d'une étude de laboratoire bien contrôlée, une dose unique de CREDELIO PLUS a été efficace à 100 % contre la dirofilariose provoquée au moyen d'un isolat de ver du cœur provenant de Géorgie (isolat Georgia II). Lors de deux études de laboratoire menées au moyen de l'isolat Wildcat, les taux d'efficacité observés variaient de 79,6 à 88,4 % lorsque CREDELIO PLUS a été administré mensuellement pendant une période allant jusqu'à 6 mois.

Au cours d'une autre étude de laboratoire bien contrôlée, deux doses mensuelles consécutives de CREDELIO PLUS ont été efficaces à 100 % contre la dirofilariose provoquée au moyen d'un isolat de ver du cœur provenant de Caroline du Sud (isolat Berkeley).

Dans une étude américaine de 11 mois avec agent de comparaison actif menée sur le terrain chez des chiens appartenant à des clients, aucun des chiens traités par CREDELIO PLUS n'a présenté une dirofilariose, d'après les résultats d'un test antigénique de dépistage de la dirofilariose et d'un test de dépistage de la microfilariose. CREDELIO PLUS a aussi été administré en concomitance avec d'autres médicaments, comme des vaccins, des anthelminthiques, des antibiotiques, des corticostéroïdes, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), des anesthésiques et des antihistaminiques. Aucune réaction indésirable n'a été associée à l'emploi concomitant de CREDELIO PLUS et d'autres médicaments.

Gale sarcoptique : Lors d'une étude de laboratoire menée sur trois groupes de chiens naturellement infestés par *Sarcoptes scabiei*, l'efficacité du lotilaner et de CREDELIO PLUS (lotilaner associé à la milbémycine) a été évaluée. Les traitements ont été administrés à deux reprises à 28 jours d'intervalle et comparés à ceux d'un groupe témoin négatif. Le jour 28, l'efficacité du lotilaner était de 92,9 % et l'efficacité de CREDELIO PLUS était de 93,6 %. Le jour 57, une efficacité de 100 % a été observée pour les deux médicaments. Le nombre d'acariens était statistiquement inférieur dans les deux groupes traités par rapport au groupe témoin négatif.

Lors d'une étude sur le terrain bien contrôlée menée en Albanie, en Grèce et en Italie, le lotilaner s'est révélé 100 % efficace contre *Sarcoptes scabiei* après administration mensuelle pendant deux mois consécutifs. Les données de biodisponibilité comparative ont révélé que le lotilaner seul était moins biodisponible que l'association lotilaner et milbémycine. Par conséquent, les données de l'étude sur le terrain ont soutenu l'efficacité de CREDELIO PLUS pour le traitement de *Sarcoptes scabiei* chez les chiens traités pendant deux mois consécutifs.

Palatabilité

Lors de l'étude américaine d'efficacité sur le terrain menée chez des chiens appartenant à des clients, 806 doses de CREDELIO PLUS ont été administrées à 159 chiens, et dans 100 % des cas, les propriétaires ont réussi à administrer le produit. Aucun échec de l'administration n'a été signalé. Quatre-vingt-un pour cent des doses ont été offertes comme un libre choix ou avec de la nourriture; 18,2 % des doses ont été administrées en plaçant le comprimé à l'arrière de la gueule du chien.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Conserver entre 5 et 30 °C. Protéger de la lumière.

PRÉSENTATION

Le produit est offert en 5 teneurs : 56,25/2,11; 112,5/4,22; 225/8,44; 450/16,88 ou 900/33,75 mg de lotilaner/oxime de milbémycine par comprimé. Chaque teneur se présente en emballage chromocodé contenant 1, 3, 6 ou 18 comprimés à croquer aromatisés. Tous les formats ne sont peut-être pas offerts sur le marché.

FABRIQUÉ POUR

Elanco Canada Limited
1919 Minnesota Court, Suite 401
Mississauga, Ontario L5N 0C9

DATE : mars 2026

Credelio, Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d'Elanco ou de ses sociétés affiliées.

© 2026 Elanco ou ses sociétés affiliées.

<Elanco logo>

PrCredelio™/MC PLUS
Display Trays

Main Panel

PrCredelio™/MC PLUS

(lotilaner and milbemycin oxime)

(lotilaner et oxime de milbémycine)

Chewable Tablets / Comprimés à croquer

<Picture of a Dog>

<Graphic of a Flea> <Graphic of a Tick> <Graphic of Heartworm> <Graphic of Roundworm> <Graphic of a Demodex Mite> <Graphic of a Sarcoptes Mite> <Graphic of a Calendar>

<Elanco Logo>

Right Panel

X^i	COMPRIMÉS À CROQUER	<Picture of tablet> X^{ii} mg lotilaner & X^{iii} mg oxime de milbémycine	$X - X^{iv}$ kg
-------	------------------------	--	-----------------

Contient X boîtes de X^i comprimés chacune

PrCredelio™/MC PLUS
(lotilaner et oxime de milbémycine)

<Graphic of a Flea>

<Graphic of a Tick>

<Graphic of Heartworm>

<Graphic of Roundworm>

<Graphic of a Demodex Mite>

<Graphic of a Sarcoptes Mite>

<Graphic of a Calendar>

<Elanco Logo>

26	<u>Left Panel</u>		
	X^i CHEWABLE TABLETS	<Picture of tablet> X^{ii} mg lotilaner & X^{iii} mg milbemycin oxime	$X - X^v$ kg
27			
28	Contains X Cartons with X^i Tablets in Each		
29			
30	PrCredelio ^{TM/MC} PLUS (lotilaner and milbemycin oxime)		<Graphic of a Flea> <Graphic of a Tick> <Graphic of Heartworm> <Graphic of Roundworm> <Graphic of a Demodex Mite> <Graphic of a Sarcoptes Mite> <Graphic of a Calendar> <Elanco Logo>
31			
32	<u>Back Panel</u>		
33	Storage Conditions:		
34	Store between 5°C and 30°C. Protect from light.		
35			
36	Conditions d'entreposage :		
37	Conserver entre 5 et 30 °C. Protéger de la lumière.		
38			
39	Manufactured for: / Fabriqué pour :		
40	Elanco Canada Limited		
41	1919 Minnesota Court, Suite 401		
42	Mississauga, Ontario L5N 0C9		
43			
44	<u>Top Panel</u>		
45	Contains X Cartons with X^i Tablets in Each		
46	Contient X boîtes de X^i comprimés chacune		
47			
48	PrCredelio ^{TM/MC} PLUS		
49	(lotilaner and milbemycin oxime)		
50	(lotilaner et oxime de milbémeycine)		
51			
52			

53 **Bottom Panel**

54 Lot:

55
56 Exp:

ⁱ 1, 3, 6 or 18 tablets depending on presentation.

ⁱⁱ Lotilaner (En / Fr)	ⁱⁱⁱ Milbemycin Oxime (En / Fr)	^{iv} Body Weight (Fr)	^v Body Weight (En)
56.25 mg / 56,25 mg	2.11 mg / 2,11 mg	1,4 - 2,8 kg	1.4 - 2.8 kg
112.5 mg / 112,5 mg	4.22 mg / 4,22 mg	> 2,8 - 5,5 kg	>2.8 - 5.5 kg
225 mg	8.44 mg / 8,44 mg	> 5,5 - 11,0 kg	>5.5 - 11.0 kg
450 mg	16.88 mg / 16,88 mg	> 11,0 - 22,0 kg	>11.0 - 22.0 kg
900 mg	33.75 mg / 33,75 mg	> 22,0 - 45,0 kg	>22.0 - 45.0 kg

PrCredelioTM/MC PLUS
Blisters

1 Tab Blister

<Graphic of Dog> DIN XXXXXXXXⁱ PrCredelioTM/MC PLUS Xⁱⁱ mg lotilaner and Xⁱⁱⁱ mg milbemycin oxime chewable tablets/comprimés à croquer de Xⁱⁱ mg de lotilaner et Xⁱⁱⁱ mg d'oxime de milbémycine X – X^{iv} kg Lot: <Elanco Logo> Exp:

3 Tab Blisters

<Graphic of Dog> DIN XXXXXXXXⁱ PrCredelioTM/MC PLUS Xⁱⁱ mg lotilaner and Xⁱⁱⁱ mg milbemycin oxime chewable tablets/comprimés à croquer de Xⁱⁱ mg de lotilaner et Xⁱⁱⁱ mg d'oxime de milbémycine X – X^{iv} kg Lot: <Elanco Logo> Exp:	<Graphic of Dog> DIN XXXXXXXXⁱ PrCredelioTM/MC PLUS Xⁱⁱ mg lotilaner and Xⁱⁱⁱ mg milbemycin oxime chewable tablets/comprimés à croquer de Xⁱⁱ mg de lotilaner et Xⁱⁱⁱ mg d'oxime de milbémycine X – X^{iv} kg Lot: <Elanco Logo> Exp:	<Graphic of Dog> DIN XXXXXXXXⁱ PrCredelioTM/MC PLUS Xⁱⁱ mg lotilaner and Xⁱⁱⁱ mg milbemycin oxime chewable tablets/comprimés à croquer de Xⁱⁱ mg de lotilaner et Xⁱⁱⁱ mg d'oxime de milbémycine X – X^{iv} kg Lot: <Elanco Logo> Exp:
---	---	---

ⁱ DIN	ⁱⁱ Lotilaner	ⁱⁱⁱ Milbemycin Oxime	^{iv} Body Weight
02525674	56.25 mg	2.11 mg	1.4 - 2.8 kg
02525682	112.5 mg	4.22 mg	>2.8 - 5.5 kg
02525690	225 mg	8.44 mg	>5.5 - 11.0 kg
02525704	450 mg	16.88 mg	>11.0 - 22.0 kg
02525712	900 mg	33.75 mg	>22.0 - 45.0 kg