

**PrCredelio Quattro™**  
**Package Insert**

DIN XXXXXXXX  
DIN XXXXXXXX  
DIN XXXXXXXX  
DIN XXXXXXXX  
DIN XXXXXXXX

**PrCredelio Quattro™**

(lotilaner, moxidectin, praziquantel, and pyrantel chewable tablets)

For Veterinary Use Only  
Chewable Tablets  
Parasiticide  
For oral use in dogs only

**DESCRIPTION**

Credelio Quattro (lotilaner, moxidectin, praziquantel, and pyrantel chewable tablets) are chewable tablets available in five strengths for oral administration to dogs and puppies according to their body weight. Each tablet is formulated to provide doses of 20–40.8 mg/kg lotilaner, 0.02–0.0408 mg/kg moxidectin, 5–10.17 mg/kg praziquantel, and 5–10.17 mg/kg pyrantel (as pamoate salt).

**INDICATIONS**

Credelio Quattro is for use in dogs and puppies 8 weeks of age and older, and weighing 1.4 kg or greater. It is indicated:

1. For the treatment and control of adult tick [*Amblyomma americanum* (Lone Star tick), *Dermacentor variabilis* (American dog tick), *Ixodes scapularis* (black-legged or deer tick), *Rhipicephalus sanguineus* (brown dog tick)] and *Haemaphysalis longicornis* (Asian longhorned tick) infestations.
2. For the treatment and prevention of flea (*Ctenocephalides felis*) infestations.
3. For the treatment and control of intestinal nematodes: hookworm (L4, immature adult (L5) and adult *Ancylostoma caninum*, adult *Uncinaria stenocephala*) and roundworms (immature adult (L5) and adult *Toxocara canis*, and adult *Toxascaris leonina*).
4. For the treatment and control of tapeworm (*Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, and *Echinococcus multilocularis*) infections.
5. For the prevention of heartworm disease (*Dirofilaria immitis*). See **CAUTIONS**.
6. For the treatment of adult *Angiostrongylus vasorum* (lungworm) with 2 monthly doses.
7. For the reduction of *Borrelia burgdorferi* infections as a direct result of killing adult *Ixodes scapularis* vector ticks.

The veterinary medicinal product is for use in dogs with or at risk from mixed external and internal parasitic infestations/infections by ectoparasites, cestodes and nematodes at the same time.

## DIRECTIONS FOR USE

Credelio Quattro is given orally once a month, at the dosage of 20–40.8 mg/kg lotilaner, 0.02–0.0408 mg/kg moxidectin, 5–10.17 mg/kg praziquantel, and 5–10.17 mg/kg pyrantel (as pamoate salt). Credelio Quattro must be administered with food (see **Clinical Pharmacology**). Care should be taken to ensure that the dog consumes the complete dose, and that part of the dose is not lost or refused. If vomiting occurs within an hour after administration, readminister a new dose of Credelio Quattro. If a dose is missed, give Credelio Quattro immediately and resume a monthly dosing schedule.

## Dosing Schedule

| Body Weight (kg) | Tablets to Administer                             | Lotilaner per Tablet (mg) | Moxidectin per Tablet (mg) | Praziquantel per Tablet (mg) | Pyrantel* per Tablet (mg) |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1.4 – 2.8        | 1                                                 | 56.25                     | 0.056                      | 14.25                        | 14.25                     |
| > 2.8 – 5.5      | 1                                                 | 112.5                     | 0.113                      | 28.5                         | 28.5                      |
| > 5.5 – 11       | 1                                                 | 225                       | 0.225                      | 57                           | 57                        |
| > 11 – 22        | 1                                                 | 450                       | 0.45                       | 114                          | 114                       |
| > 22 – 45        | 1                                                 | 900                       | 0.9                        | 228                          | 228                       |
| > 45             | Administer the appropriate combination of tablets |                           |                            |                              |                           |

\* As pamoate salt

Due to geographic and climate variations across the country, a comprehensive plan, based on regional risk assessment and travel history, is recommended to determine when to treat.

## Tick Treatment and Control

Treatment with Credelio Quattro can begin at any time of the year, preferably starting before ticks become active, and continuing monthly through the end of the tick season.

## Flea Treatment and Prevention

Treatment with Credelio Quattro may begin at any time of the year, preferably starting before fleas become active, and continuing monthly through the end of the flea season. To minimize the likelihood of flea re-infestation, it is important to treat all dogs and cats within a household with a flea control product.

## Intestinal Nematode and Cestode Treatment and Control

Credelio Quattro should be administered as a single dose for the treatment of roundworm, hookworm, and tapeworm infections. Monthly use of Credelio Quattro will control any subsequent infections. Dogs may be exposed to and can become infected with gastrointestinal worms throughout the year, regardless of season or climate. Clients should be advised of appropriate measures to prevent reinfection of their dog with intestinal parasites.

## Heartworm Prevention

Credelio Quattro should be administered at monthly intervals within 1 month of the animal's first seasonal exposure to mosquitoes and continuing until at least 1 month after the dog's last seasonal exposure. If a dose is missed, give Credelio Quattro immediately and resume monthly dosing. When replacing a monthly heartworm preventive product, Credelio Quattro should be given within 1 month of the last dose of the former medication.

It is recommended, in accordance with good veterinary practices, that all dogs > 6 months of age should be tested for patent heartworm infections prior to beginning prophylactic medication for the first time. After the first season, all treated dogs should be retested at the start of the next season to certify treatment compliance before prescribing further medication. Thereafter, the determination of frequency of testing should be left at the discretion of the veterinarian.

## French Lungworm (*A. vasorum*) Treatment

For treatment, dogs should be administered 2 doses of Credelio Quattro one month apart.

## CAUTIONS

Lotilaner, one of the ingredients in Credelio Quattro, is a member of the isoxazoline class. This class has been associated with neurologic adverse reactions including tremors, ataxia, and seizures. Seizures have been reported in dogs receiving isoxazoline class drugs, even in dogs without a history of seizures. Use with caution in dogs with a history of seizures or neurologic disorders.

Prior to administration of Credelio Quattro, dogs should be tested for existing heartworm infections. Infected dogs should be treated with an adulticide to remove adult heartworms. Credelio Quattro is not effective against adult *D. immitis*.

The safe use of Credelio Quattro in breeding, pregnant, or lactating dogs has not been evaluated.

## WARNINGS

**Keep out of reach of children.** Wash hands after handling. If accidentally ingested, seek medical attention immediately.

## ADVERSE REACTIONS

The most frequently reported adverse reactions in laboratory clinical trials were vomiting and diarrhea.

In a US field safety and efficacy study, Credelio Quattro was administered to dogs for the prevention of heartworm disease. The study included a total of 372 dogs treated once monthly for up to 11 treatments (191 treated with Credelio Quattro and 181 treated with an active control). Over the 330-day study period, all observations of potential adverse reactions were recorded.

Adverse reactions seen in greater than 1% of dogs during the field study are summarized in the table below.

#### Dogs with Adverse Reactions in the Field Study

| Adverse Event                | Credelio Quattro<br>(%)<br>(N=191) | Control<br>(%)<br>(N=181) |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Diarrhea                     | 18 (9.42)                          | 14 (7.73)                 |
| Emesis                       | 17 (8.9)                           | 7 (3.87)                  |
| Anorexia                     | 10 (5.24)                          | 5 (2.76)                  |
| Lethargy                     | 10 (5.24)                          | 1 (0.55)                  |
| Weight loss                  | 6 (3.14)                           | 3 (1.66)                  |
| Abdominal pain               | 3 (1.57)                           | 2 (1.1)                   |
| Gastroenteritis              | 3 (1.57)                           | 0                         |
| Dehydration                  | 3 (1.57)                           | 3 (1.66)                  |
| Hemorrhagic diarrhea         | 2 (1.05)                           | 3 (1.66)                  |
| Abnormal behaviour           | 2 (1.05)                           | 1 (0.55)                  |
| Cough                        | 2 (1.05)                           | 0                         |
| Tachypnea                    | 2 (1.05)                           | 0                         |
| Systemic disorder NOS        | 2 (1.05)                           | 1 (0.55)                  |
| Elevated SAP                 | 1 (0.52)                           | 4 (2.21)                  |
| Convulsion                   | 1 (0.52)                           | 3 (1.66)                  |
| Musculoskeletal disorder NOS | 1 (0.52)                           | 2 (1.1)                   |
| Elevated liver enzymes       | 1 (0.52)                           | 2 (1.1)                   |

To report suspected adverse drug events or for technical assistance, contact Elanco Canada Limited at 1-800-265-5475.

#### Information for Animal Owners

*Echinococcus multilocularis* is a tapeworm species found in wild canids and domestic dogs. *Echinococcus multilocularis* can cause a highly pathogenic condition (alveolar hydatid disease).


Owners of dogs living in areas where this parasite is endemic should be instructed on how to minimize their risk of exposure to this parasite, as well as their dog's risk of exposure. Although Credelio Quattro was 100% effective in laboratory studies in dogs against this parasite, no studies have been conducted to show that the use of this product will decrease the incidence of disease in humans.

## SCIENTIFIC INFORMATION

### Active Ingredients


#### Lotilaner

Lotilaner is an ectoparasiticide belonging to the isoxazoline group. The chemical name is 3-Methyl-N-[2-oxo-2-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethyl]-5-[(5S)-5-(3,4,5-trichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4H-isoxazol-3-yl]thiophene-2-carboxamide, with a molecular formula of  $C_{20}H_{14}Cl_3F_6N_3O_3S$ .




#### Moxidectin

Moxidectin is an endectocide in the macrocyclic lactone class. The chemical name is (6R,25S)-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-[(E)-1,3-dimethyl-1-butenyl]-6,28-epoxy-23-oxomilbemycin B 23-(E)-(O-methyloxime); (2aE,4E,5'R,6R,6'S,8E,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-[(E)-1,3-Dimethyl-1-butenyl]-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydro-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethylspiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran]-4',17(3'H)-dione 4'-(E)-(O-methyloxime), with a molecular formula of  $C_{37}H_{53}NO_8$ .




### Praziquantel

Praziquantel is an anthelmintic belonging to the pyrazinoisoquinoline class. The chemical name for praziquantel is (11bRS)-2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, with a molecular formula of  $C_{19}H_{24}N_2O_2$ .



### Pyrantel

Pyrantel is a nematocide belonging to the tetrahydropyrimidine class. Pyrantel (as pyrantel pamoate) has the chemical (E)-1,4,5,6-Tetrahydro-1-methyl-2-[2-(2-thienyl)vinyl]pyrimidine 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (1:1), with a molecular formula of  $C_{11}H_{14}N_2S \cdot C_{23}H_{16}O_6$ .



## **Clinical Pharmacology**

### Mechanism of Action

Credelio Quattro contains four active pharmaceutical ingredients, lotilaner, moxidectin, praziquantel, and pyrantel (as pamoate salt).

Lotilaner inhibits insect and acarine gamma-aminobutyric acid (GABA)-gated chloride channels. This inhibition blocks the transfer of chloride ions across cell membranes, which results in uncontrolled neuromuscular activity leading to death of insects and acarines. The selective toxicity of lotilaner between insects and acarines and mammals may be inferred by the differential sensitivity of the insects and acarines' GABA receptors versus mammalian GABA receptors.

Moxidectin acts by interfering with the chloride channel-mediated neurotransmission in the parasite. This results in paralysis and death of the parasite.

Praziquantel's mode of action is not precisely known, but treated tapeworms undergo muscular paralysis accompanied by a rapid influx of calcium ions and the disruption of the tegument.

Pyrantel acts as a depolarizing, neuromuscular-blocking agent in susceptible parasites, causing paralysis and death or expulsion of the parasite.

### Pharmacokinetics

Due to reduced drug bioavailability of lotilaner in the fasted state, Credelio Quattro must be administered with a meal or within 30 minutes after feeding.

Following a single oral administration of Credelio Quattro at the minimum labeled dose in the fed state, or a single intravenous administration of 5 mg lotilaner, 0.005 mg moxidectin, 1.25 mg praziquantel, and 1.25 mg pyrantel per kg body weight to Beagle dogs (1.5 to 2.5 years old), the mean oral bioavailability for lotilaner, praziquantel, and pyrantel was 93%, 41%, and 29%, respectively. Bioavailability for moxidectin is not reported due to insufficient data to adequately describe the elimination phase following intravenous administration. For Credelio Quattro, the area under the curve from time of dosing to the time of the last measurable concentration ( $AUC_{last}$ ) was 5970, 1.75, 1.54, and 0.857 mg\*h/L for lotilaner, moxidectin, praziquantel, and pyrantel, respectively. Peak concentrations ( $C_{max}$ ) of 9070, 15.3, 390, and 122 ng/mL were reached ( $T_{max}$ ) 10, 4.5, 0.75, and 2.5 h after dosing for lotilaner, moxidectin, praziquantel, and pyrantel, respectively. Mean plasma elimination half-lives were 806, 634, 3.58, and 4.87 h for lotilaner, moxidectin, praziquantel, and pyrantel, respectively.

Following nine oral administrations of Credelio Quattro at 1X, 3X, and 5X the maximum labeled dose of 40 mg/kg lotilaner, 0.04 mg/kg moxidectin, 10 mg/kg praziquantel, and 10 mg/kg pyrantel, every 28 days in 8-week-old Beagle dogs, moxidectin and pyrantel area under the curve from time of dosing to the time of the last measurable concentration ( $AUC_{last}$ ) increased approximately dose proportional from 1X to 3X and less than dose proportional from 3X to 5X, whereas lotilaner increased less than proportional from 1X to 5X and praziquantel increased greater than proportional from 1X to 5X after most study doses. Within the 1X group, accumulation was observed between Days 0 and 224 with geometric mean accumulation ratios for  $AUC_{last}$  of 6.2 and 7.9 for lotilaner and moxidectin, respectively. Concentrations of praziquantel and pyrantel prior to each dose were below the limit of quantification.

### **Target Animal Safety**

#### Margin of Safety

Credelio Quattro was administered orally at 0X, 1X, 3X, and 5X the maximum labeled doses at 28-day intervals for nine treatments to 32 healthy, 8-week-old Beagle puppies (4 males and 4 females per group). Dogs in the control group received placebo.

Credelio Quattro-related clinical observations included a dose-dependent increase in

discoloured feces, diarrhea, and vomiting. All dogs recovered without treatment. Hypersalivation associated with vomiting on the day of dosing occurred in two of the 5X dogs

#### Avermectin Sensitive Collie Safety

Credelio Quattro was administered orally at 0X, 1X, 2X, and 5X the maximum labeled dose at 28-day intervals for three treatments to 32 healthy, avermectin sensitive adult Collie dogs (8 dogs/group). Dogs in the control group received a vehicle control. One dog in each of the control, 2X, and 5X groups had transient mild depression. Salivation and vomiting were observed in a dose-dependent manner in the 1X, 2X, and 5X groups. Diarrhea, with or without blood, was observed in all groups, including controls, and resolved without treatment.

#### Heartworm Positive Safety

Credelio Quattro was administered orally at 0X, 1X, and 3X the maximum labeled dose at 28-day intervals for three treatments to 24 healthy Beagle dogs with patent adult heartworm infections and circulating microfilariae. Dogs in the control group received placebo. Diarrhea and/or vomiting occurred in all dogs in the 3X group at various times up to 12 hours post-dose. Diarrhea occurred in fewer dogs in the 1X and control groups. All dogs experiencing post-dose gastrointestinal issues recovered without treatment. Hypersensitivity reactions (i.e., anaphylaxis, shock, collapse, respiratory distress, or depression) were not observed in any dog.

#### Field Safety

In a well-controlled field study, Credelio Quattro was used concurrently with other medications such as vaccines, antimicrobials, anthelmintics, antiemetics, steroidal and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), anesthetics, and analgesics. No adverse reactions were associated with the concurrent use of Credelio Quattro and other medications.

#### **Target Animal Efficacy**

##### Tick Treatment and Control

In well-controlled laboratory studies, *Rhipicephalus sanguineus* was determined to be the least susceptible tick species to lotilaner compared to *Amblyomma americanum*, *Dermacentor variabilis* and *Ixodes scapularis*. Therefore, only efficacy against *R. sanguineus* was evaluated with Credelio Quattro.

In well-controlled laboratory studies, Credelio Quattro was  $\geq 97.1\%$  effective against *Rhipicephalus sanguineus* ticks 48 hours after administration or infestation for 32 days.

In well-controlled laboratory studies, Credelio Quattro was 100% effective in the treatment of *Haemaphysalis longicornis* for 32 days.

In two separate, well-controlled laboratory studies, Credelio Quattro was effective at reducing *Borrelia burgdorferi* infections after dogs were infested with adult *Ixodes scapularis* vector ticks 28 days post-treatment.

## Flea Treatment and Prevention

In a well-controlled laboratory study, Credelio Quattro was 100% effective against adult fleas 24 hours after administration or infestation for 36 days.

In a 90-day well-controlled European field study conducted in households with existing flea infestations of varying severity, flea reductions of 99.9% to 100% were observed over the course of three monthly treatments with Credelio Quattro. Seventeen dogs with signs of flea allergy dermatitis showed improvement in all or some signs of erythema, papules, scaling, alopecia, dermatitis/pyodermitis, and/or pruritus as a direct result of eliminating fleas.

## Intestinal Nematode and Cestode Treatment and Control

In well-controlled laboratory studies, a single dose of Credelio Quattro was  $\geq 96.7\%$  effective against immature adult and adult *Toxocara canis*, adult *Toxascaris leonina*, L4, immature and adult *Ancylostoma caninum*, and adult *Uncinaria stenocephala* infections.

In a 10-day multicentre US field study, 75 dogs administered a single dose of Credelio Quattro and 38 dogs administered a single dose of active control were evaluated for efficacy. Compared to pre-treatment, Credelio Quattro reduced *Ancylostoma caninum* fecal egg counts by 99.9% and *Toxocara canis* fecal eggs counts by 94.4%.

In two well-controlled laboratory studies, a single dose of Credelio Quattro was 100% effective against *Echinococcus multilocularis*.

## Heartworm Prevention

In two well-controlled laboratory studies, a single oral dose of Credelio Quattro was 100% effective in preventing the development of adult *Dirofilaria immitis* in dogs inoculated with infective larvae 30 days before administration.

In a well-controlled U.S. field study, 156 dogs administered Credelio Quattro and 143 administered an active control for 11 consecutive months were evaluated for efficacy. No dogs treated with Credelio Quattro or the active control tested positive for heartworm disease. All dogs treated with Credelio Quattro and the active control product were negative for *D. immitis* antigen and blood microfilariae at study completion on Day 330.

## French Lungworm (*A. vasorum*) Treatment

In two well-controlled laboratory studies, Credelio Quattro was 100% effective in the treatment of adult *Angiostrongylus vasorum* when two doses were administered to infected dogs one month apart.

## Palatability

In a European field study, which included 630 doses administered to 210 dogs, dogs voluntarily consumed 74–76% of Credelio Quattro doses within 2 minutes from an empty bowl, on the floor, or when offered by hand. The remaining doses were

consumed when administered with a small amount of food or when placed in the dog's mouth.

### **STORAGE INFORMATION**

Store between 15°C and 25°C. Excursions permitted between 5°C and 40°C.

### **PRESENTATION/PACKAGE TYPES**

Credelio Quattro (lotilaner, moxidectin, praziquantel, and pyrantel chewable tablets) is available in five strengths of chewable tablets formulated according to the weight of the dog. Each tablet size is available in packages of 1, 6, or 12 tablets. Not all package sizes may be marketed.

### **MANUFACTURED FOR**

Elanco Canada Limited  
1919 Minnesota Court, Suite 401  
Mississauga, Ontario L5N 0C9

**DATE:** April 2026

Credelio Quattro, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

© 2026 Elanco or its affiliates.

**PrCredelio Quattro<sup>MC</sup>**  
**Notice d'emballage**

DIN XXXXXXXX  
DIN XXXXXXXX  
DIN XXXXXXXX  
DIN XXXXXXXX  
DIN XXXXXXXX

**PrCredelio Quattro<sup>MC</sup>**

(comprimés à croquer de lotilaner, moxidectine, praziquantel et pyrantel)

Pour usage vétérinaire seulement

Comprimés à croquer

Parasiticide

À usage oral uniquement chez les chiens

**DESCRIPTION**

Les comprimés à croquer Credelio Quattro (lotilaner, moxidectine, praziquantel et pyrantel) sont disponibles en cinq dosages pour l'administration orale aux chiens et chiots, selon leur poids corporel. Chaque comprimé est formulé pour fournir des doses de 20 à 40,8 mg/kg de lotilaner, de 0,02 à 0,0408 mg/kg de moxidectine, de 5 à 10,17 mg/kg de praziquantel et de 5 à 10,17 mg/kg de pyrantel (sous forme de sel de pamoate).

**INDICATIONS**

Credelio Quattro est destiné aux chiens et aux chiots âgés de 8 semaines et plus, et pesant 1,4 kg ou plus. Il est indiqué :

1. Pour le traitement et le contrôle des infestations de tiques adultes [*Amblyomma americanum* (tique étoilée), *Dermacentor variabilis* (tique américaine du chien), *Ixodes scapularis* (tique à pattes noires ou tique du cerf), *Rhipicephalus sanguineus* (tique brune du chien)] et *Haemaphysalis longicornis* (tique asiatique à longues cornes).
2. Pour le traitement et la prévention des infestations de puces (*Ctenocephalides felis*).
3. Pour le traitement et le contrôle des nématodes intestinaux : ankylostomes (L4, adulte immature [L5] et *Ancylostoma caninum* adulte, *Uncinaria stenocephala* adulte) et ascaris (adulte immature [L5] et *Toxocara canis* adulte, et *Toxascaris leonina* adulte).
4. Pour le traitement et le contrôle des infections par le ténia (*Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis* et *Echinococcus multilocularis*).
5. Pour la prévention de la dirofilariose (*Dirofilaria immitis*). Voir **PRÉCAUTIONS**.
6. Pour le traitement de l'*Angiostrongylus vasorum* (ver pulmonaire) adulte en 2 doses mensuelles.
7. Pour la réduction des infections à *Borrelia burgdorferi* résultant directement de l'élimination des tiques adultes vectrices *Ixodes scapularis*.

Ce médicament vétérinaire est destiné aux chiens présentant ou à risque de présenter simultanément des infestations/infections parasitaires externes et internes mixtes dues à des ectoparasites, des cestodes et des nématodes.

## MODE D'EMPLOI

Credelio Quattro doit être administré par voie orale une fois par mois, à une posologie de 20 à 40,8 mg/kg de lotilaner, 0,02 à 0,0408 mg/kg de moxidectine, 5 à 10,17 mg/kg de praziquantel et 5 à 10,17 mg/kg de pyrantel (sous forme de sel de pamoate). Credelio Quattro doit être administré avec de la nourriture (voir **Pharmacologie clinique**). Veiller à ce que le chien consomme la dose complète et qu'aucune partie de celle-ci ne soit perdue ou refusée. En cas de vomissements dans l'heure suivant l'administration, administrer une nouvelle dose de Credelio Quattro. En cas d'oubli d'une dose, administrer immédiatement Credelio Quattro et reprendre un schéma posologique mensuel.

## Schéma posologique

| Poids corporel (kg) | Comprimés à administrer                            | Lotilaner par comprimé (mg) | Moxidectine par comprimé (mg) | Praziquantel par comprimé (mg) | Pyrantel* par comprimé (mg) |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1,4 – 2,8           | 1                                                  | 56,25                       | 0,056                         | 14,25                          | 14,25                       |
| > 2,8 – 5,5         | 1                                                  | 112,5                       | 0,113                         | 28,5                           | 28,5                        |
| > 5,5 – 11          | 1                                                  | 225                         | 0,225                         | 57                             | 57                          |
| > 11 – 22           | 1                                                  | 450                         | 0,45                          | 114                            | 114                         |
| > 22 – 45           | 1                                                  | 900                         | 0,9                           | 228                            | 228                         |
| > 45                | Administrer la combinaison appropriée de comprimés |                             |                               |                                |                             |

\* Sous forme de sel de pamoate

En raison des variations géographiques et climatiques à travers le pays, il est recommandé d'établir un plan complet, reposant sur l'évaluation des risques régionaux et l'historique des déplacements, afin de déterminer le moment approprié pour le traitement.

## Traitement et contrôle des tiques

Le traitement par Credelio Quattro peut commencer à tout moment de l'année, de préférence avant que les tiques ne deviennent actives, et se poursuivre à intervalles mensuels jusqu'à la fin de la saison d'activité des tiques.

## Traitement et prévention contre les puces

Le traitement par Credelio Quattro peut commencer à tout moment de l'année, de préférence avant que les puces ne deviennent actives, et se poursuivre à intervalles mensuels jusqu'à la fin de la saison d'activité des puces. Pour minimiser les risques de réinfestation par les puces, il est important de traiter tous les chiens et chats d'un même foyer avec un produit anti-puces.

## Traitement et contrôle des nématodes et cestodes intestinaux

Credelio Quattro doit être administré en dose unique pour le traitement des infections à ascaris, à ankylostomes et à ténias. L'utilisation mensuelle de Credelio Quattro permettra de contrôler toute infection ultérieure. Les chiens peuvent être exposés à des vers gastro-intestinaux et en être infectés tout au long de l'année, indépendamment de

la saison ou du climat. Les clients doivent être informés des mesures à prendre pour éviter que leur chien ne soit de nouveau infesté par des parasites intestinaux.

### **Prévention de la dirofilariose**

Credelio Quattro doit être administré à intervalles mensuels dans le mois suivant la première exposition saisonnière de l'animal aux moustiques, et se poursuivre jusqu'à au moins un mois après la dernière exposition saisonnière du chien. En cas d'oubli d'une dose, administrer immédiatement Credelio Quattro et reprendre les doses mensuelles normales. Lors du remplacement d'un produit préventif mensuel contre la dirofilariose, Credelio Quattro doit être administré dans le mois suivant la dernière dose du médicament précédent.

Conformément aux bonnes pratiques vétérinaires, il est recommandé que tous les chiens âgés de 6 mois ou plus fassent l'objet d'un test de dépistage de la dirofilariose avant de recevoir un premier traitement prophylactique. Après la première saison, tous les chiens traités doivent être à nouveau testés au début de la saison suivante afin de vérifier le respect du traitement avant de prescrire toute médication supplémentaire. Par la suite, la fréquence des tests doit être laissée à la discrétion du vétérinaire.

### **Traitement du ver pulmonaire (*A. vasorum*)**

Pour le traitement, les chiens doivent recevoir 2 doses de Credelio Quattro à un mois d'intervalle.

### **PRÉCAUTIONS**

Le lotilaner, l'un des ingrédients du Credelio Quattro, appartient à la classe des isoxazolines. Cette classe a été associée à des réactions indésirables neurologiques, notamment des tremblements, une ataxie et des convulsions. Des convulsions ont été signalées chez des chiens recevant des médicaments de la classe des isoxazolines, même chez des chiens sans antécédents de convulsions. Utiliser avec prudence chez des chiens qui ont des antécédents de convulsions ou de troubles neurologiques.

Avant l'administration de Credelio Quattro, les chiens doivent être testés pour détecter une éventuelle infection par la dirofilariose. Les chiens infectés doivent être traités avec un adulticide pour éliminer les vers adultes responsables de la dirofilariose. Credelio Quattro n'est pas efficace contre *D. immitis* adulte.

L'innocuité de Credelio Quattro n'a pas été évaluée chez les chiens reproducteurs ou chez les chiennes gestantes ou qui allaitent.

### **MISES EN GARDE**

**Garder hors de la portée des enfants.** Se laver les mains après manipulation. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin.

## RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Les réactions indésirables les plus fréquemment rapportées lors des essais cliniques en laboratoire étaient des vomissements et des diarrhées.

Lors d'une étude sur l'innocuité et l'efficacité menée sur le terrain aux États-Unis, Credelio Quattro a été administré à des chiens pour la prévention de la dirofilariose. L'étude a porté sur un total de 372 chiens traités une fois par mois pendant un maximum de 11 traitements (191 traités avec Credelio Quattro et 181 traités avec un contrôle actif). Au cours des 330 jours de l'étude, toutes les observations d'éventuelles réactions indésirables ont été enregistrées.

Les réactions indésirables observées chez plus de 1 % des chiens au cours de l'étude sur le terrain sont résumées dans le tableau ci-dessous.

### Chiens présentant des réactions indésirables lors de l'étude sur le terrain

| Évènement indésirable            | Credelio Quattro<br>(%)<br>(N=191) | Contrôle<br>(%)<br>(N=181) |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Diarrhée                         | 18 (9,42)                          | 14 (7,73)                  |
| Vomissement                      | 17 (8,9)                           | 7 (3,87)                   |
| Anorexie                         | 10 (5,24)                          | 5 (2,76)                   |
| Léthargie                        | 10 (5,24)                          | 1 (0,55)                   |
| Perte de poids                   | 6 (3,14)                           | 3 (1,66)                   |
| Douleurs abdominales             | 3 (1,57)                           | 2 (1,1)                    |
| Gastroentérite                   | 3 (1,57)                           | 0                          |
| Déshydratation                   | 3 (1,57)                           | 3 (1,66)                   |
| Diarrhée hémorragique            | 2 (1,05)                           | 3 (1,66)                   |
| Comportement anormal             | 2 (1,05)                           | 1 (0,55)                   |
| Toux                             | 2 (1,05)                           | 0                          |
| Tachypnée                        | 2 (1,05)                           | 0                          |
| Trouble systémique SAI           | 2 (1,05)                           | 1 (0,55)                   |
| PAL élevée                       | 1 (0,52)                           | 4 (2,21)                   |
| Convulsions                      | 1 (0,52)                           | 3 (1,66)                   |
| Atteinte musculosquelettique SAI | 1 (0,52)                           | 2 (1,1)                    |
| Enzymes hépatiques élevées       | 1 (0,52)                           | 2 (1,1)                    |

Pour signaler des effets indésirables suspectés liés à un médicament ou pour obtenir une assistance technique, contacter Elanco Canada Limited au 1-800-265-5475.

### Informations pour les propriétaires d'animaux

*Echinococcus multilocularis* est une espèce de ténia que l'on retrouve chez les canidés sauvages et les chiens domestiques. *Echinococcus multilocularis* peut provoquer une affection hautement pathogène (échinococcose alvéolaire).


Les propriétaires de chiens vivant dans des zones où ce parasite est endémique doivent être informés des mesures à prendre pour réduire leur propre risque d'exposition ainsi que celui de leur chien. Bien que Credelio Quattro ait montré une efficacité de 100 % dans les études en laboratoire chez le chien contre ce parasite, aucune étude n'a été réalisée pour démontrer que l'utilisation de ce produit réduirait l'incidence de la maladie chez l'homme.

## RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

### Ingrédients actifs


#### Lotilaner

Le lotilaner est un ectoparasiticide appartenant au groupe des isoxazolines. Le nom chimique est 3-méthyl-N-[2-oxo-2-(2,2,2-trifluoroéthylamino)éthyl]-5-[(5S)-5-(3,4,5-trichlorophényl)-5-(trifluorométhyl)-4H-isoxazol-3-yl]thiophène-2-carboxamide, avec une formule moléculaire de  $C_{20}H_{14}Cl_3F_6N_3O_3S$ .




#### Moxidectine

La moxidectine est un endectocide de la classe des lactones macrocycliques. Le nom chimique est (6R,25S)-5-O-Déméthyl-28-déoxy-25-[(E)-1,3-diméthyl-1-butényl]-6,28-époxy-23-oxomilbémécine B 23-(E)-(O-méthylloxime); (2aE,4E,5'R,6R,6'S,8E,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-[(E)-1,3-Diméthyl-1-butényl]-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodécahydro-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tétraméthylspiro[11,15-méthano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadécine-13,2'-[2H]pyran]-4',17(3'H)-dione 4'-(E)-(O-méthylloxime), de formule moléculaire de  $C_{37}H_{53}NO_8$ .




## Praziquantel

Le praziquantel est un anthelminthique appartenant à la classe des pyrazinoisoquinoléines. Le nom chimique du praziquantel est (11bRS)-2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, avec une formule moléculaire de  $C_{19}H_{24}N_2O_2$ .



## Pyrantel

Le pyrantel est un nématocide appartenant à la classe des tétrahydropyrimidines. Le pyrantel (sous forme de pamoate de pyrantel) a la formule chimique (E)-1,4,5,6-tétrahydro-1-méthyl-2-[2-(2-thiényl)vinyl]pyrimidine 4,4'-méthylènebis[3-hydroxy-2-naphtoate] (1:1), avec une formule moléculaire de  $C_{11}H_{14}N_2S \cdot C_{23}H_{16}O_6$ .



## **Pharmacologie clinique**

### Mécanisme d'action

Credelio Quattro contient quatre principes actifs : lotilaner, moxidectine, praziquantel et pyrantel (sous forme de sel de pamoate).

Le lotilaner inhibe les canaux chlorure régulés par le GABA (acide gamma-aminobutyrique) chez les insectes et les acariens. Cette inhibition empêche le transfert des ions chlorure à travers les membranes cellulaires, ce qui entraîne une activité neuromusculaire incontrôlée conduisant à la mort des insectes et des acariens. La toxicité sélective du lotilaner entre les insectes et les acariens d'une part, et les mammifères d'autre part, peut être déduite de la sensibilité différente des récepteurs GABA des insectes et acariens par rapport à ceux des mammifères.

La moxidectine agit en perturbant la neurotransmission médiée par les canaux chlorure chez le parasite. Cela entraîne la paralysie et la mort du parasite.

Le mode d'action du praziquantel n'est pas précisément connu, mais les cestodes traités subissent une paralysie musculaire accompagnée d'un afflux rapide d'ions calcium et de la destruction du tégument.

Le pyrantel agit comme un agent dépolarisant bloquant la transmission neuromusculaire chez les parasites sensibles, provoquant leur paralysie et entraînant leur mort ou leur expulsion.

#### Pharmacocinétique

En raison d'une biodisponibilité réduite du lotilaner à jeun, Credelio Quattro doit être administré pendant un repas ou dans les 30 minutes suivant la prise alimentaire.

Après une administration orale unique de Credelio Quattro à la dose minimale indiquée avec alimentation, ou une administration intraveineuse unique de 5 mg de lotilaner, 0,005 mg de moxidectine, 1,25 mg de praziquantel et 1,25 mg de pyrantel par kg de poids corporel chez des chiens Beagle (âgés de 1,5 à 2,5 ans), la biodisponibilité orale moyenne était de 93 % pour le lotilaner, 41 % pour le praziquantel et 29 % pour le pyrantel. La biodisponibilité de la moxidectine n'est pas indiquée en raison de données insuffisantes pour décrire de manière adéquate la phase d'élimination après administration intraveineuse. Pour Credelio Quattro, l'aire sous la courbe du moment de l'administration au moment de la dernière concentration mesurable ( $ASC_{\text{dernière}}$ ) était de 5970, 1,75, 1,54 et 0,857 mg\*h/L pour le lotilaner, la moxidectine, le praziquantel et le pyrantel, respectivement. Des concentrations maximales ( $C_{\text{max}}$ ) de 9070, 15,3, 390 et 122 ng/mL ont été atteintes ( $T_{\text{max}}$ ) 10, 4,5, 0,75 et 2,5 h après l'administration pour le lotilaner, la moxidectine, le praziquantel et le pyrantel, respectivement. Les demi-vies plasmatiques moyennes d'élimination étaient de 806, 634, 3,58 et 4,87 heures pour le lotilaner, la moxidectine, le praziquantel et le pyrantel, respectivement.

Après neuf administrations orales de Credelio Quattro à 1X, 3X et 5X la dose maximale recommandée (40 mg/kg de lotilaner, 0,04 mg/kg de moxidectine, 10 mg/kg de praziquantel et 10 mg/kg de pyrantel) tous les 28 jours chez des chiens Beagle âgés de 8 semaines, l'aire sous la courbe ( $ASC_{\text{dernière}}$ ) a montré que pour la moxidectine et le pyrantel, l'augmentation était approximativement proportionnelle entre 1X et 3X et moins que proportionnelle entre 3X et 5X, tandis que pour le lotilaner, l'augmentation était moins que proportionnelle entre 1X et 5X, et pour le praziquantel, elle était plus que proportionnelle entre 1X et 5X après la plupart des doses étudiées. Dans le groupe 1X, une accumulation a été observée entre les jours 0 et 224 avec des rapports d'accumulation moyens géométriques pour l' $ASC_{\text{dernière}}$  de 6,2 et 7,9 pour le lotilaner et la moxidectine, respectivement. Les concentrations de praziquantel et de pyrantel avant chaque dose étaient inférieures à la limite de quantification.

## **Études d'innocuité chez les animaux cibles**

### **Marge de sécurité**

Credelio Quattro a été administré par voie orale à des doses de 0X, 1X, 3X et 5X la dose maximale recommandée, à intervalles de 28 jours, pendant neuf traitements, à 32 chiots Beagle sains âgés de 8 semaines (4 mâles et 4 femelles par groupe). Les chiens du groupe témoin ont reçu un placebo. Les observations cliniques liées à Credelio Quattro comprenaient une augmentation dose-dépendante des selles décolorées, de la diarrhée et des vomissements. Tous les chiens ont guéri sans traitement. Une hypersalivation associée à des vomissements le jour de l'administration du traitement est survenue chez deux des chiens ayant reçu la dose de 5X.

### **Tolérance chez les Collies sensibles aux avermectines**

Credelio Quattro a été administré par voie orale à des doses de 0X, 1X, 2X et 5X la dose maximale recommandée, à intervalles de 28 jours, pendant trois traitements, à 32 chiens Collie adultes sains et sensibles à l'ivermectine (8 chiens/groupe). Les chiens du groupe témoin ont reçu un véhicule sans substance active. Un chien dans chacun des groupes témoin, 2X et 5X a présenté une dépression légère transitoire. Une salivation et des vomissements ont été observés de manière dose-dépendante dans les groupes 1X, 2X et 5X. Une diarrhée, avec ou sans présence de sang, a été observée dans tous les groupes, y compris le groupe témoin, et s'est résolue sans traitement.

### **Tolérance chez les chiens positifs à la dirofilariose**

Credelio Quattro a été administré par voie orale à 0X, 1X et 3X la dose maximale recommandée, à des intervalles de 28 jours, pour un total de trois administrations, à 24 chiens Beagle sains présentant des infections actives par des vers adultes de la dirofilariose et des microfilaries circulantes. Les chiens du groupe témoin ont reçu un placebo. Des diarrhées ou des vomissements sont survenus chez tous les chiens du groupe 3X à différents moments jusqu'à 12 heures après l'administration. La diarrhée est survenue chez moins de chiens dans les groupes 1X et témoins. Tous les chiens ayant présenté des troubles gastro-intestinaux après l'administration du traitement ont guéri sans traitement. Aucune réaction d'hypersensibilité (c'est-à-dire anaphylaxie, choc, effondrement, détresse respiratoire ou dépression) n'a été observée chez les chiens.

### **Tolérance en conditions réelles**

Dans une étude de terrain bien contrôlée, Credelio Quattro a été utilisé simultanément avec d'autres médicaments tels que des vaccins, des antimicrobiens, des antihelminthiques, des antiémétiques, des anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens (AINS), des anesthésiques et des analgésiques. Aucune réaction indésirable n'a été associée à l'utilisation concomitante de Credelio Quattro et d'autres médicaments.

## **Efficacité chez les animaux cibles**

### **Traitement et contrôle des tiques**

Dans des études de laboratoire bien contrôlées, il a été déterminé que *Rhipicephalus sanguineus* était l'espèce de tique la moins sensible au lotilaner, comparativement à

*Amblyomma americanum*, *Dermacentor variabilis* et *Ixodes scapularis*. Par conséquent, seule l'efficacité contre *R. sanguineus* a été évaluée avec Credelio Quattro.

Dans des études de laboratoire bien contrôlées, Credelio Quattro a montré une efficacité  $\geq 97,1$  % contre les tiques *Rhipicephalus sanguineus* 48 heures après l'administration ou l'infestation, et cela, pendant 32 jours.

Dans des études de laboratoire bien contrôlées, Credelio Quattro a été efficace à 100 % pour le traitement des tiques *Haemaphysalis longicornis* pendant 32 jours.

Dans deux études de laboratoire bien contrôlées et indépendantes, Credelio Quattro a été efficace pour réduire les infections à *Borrelia burgdorferi* après que des chiens ont été infestés par des tiques adultes vectrices *Ixodes scapularis*, 28 jours après le traitement.

#### Traitement et prévention contre les puces

Dans une étude de laboratoire bien contrôlée, Credelio Quattro a été efficace à 100 % contre les puces adultes, 24 heures après l'administration ou l'infestation, et cela, pendant 36 jours.

Dans une étude de terrain européenne bien contrôlée de 90 jours, menée dans des foyers présentant des infestations de puces de gravité variable, des réductions de 99,9 % à 100 % des puces ont été observées au cours de trois traitements mensuels avec Credelio Quattro. Dix-sept chiens présentant des signes de dermatite allergique aux piqûres de puces ont montré une amélioration de tout ou partie des signes d'érythème, de papules, de desquamation, d'alopécie, de dermatite/pyodermite ou de prurit, résultant directement de l'élimination des puces.

#### Traitement et contrôle des nématodes et cestodes intestinaux

Dans des études de laboratoire bien contrôlées, une dose unique de Credelio Quattro a été efficace à  $\geq 96,7$  % contre les infections par *Toxocara canis* (adultes immatures et adultes), *Toxascaris leonina* adultes, *Ancylostoma caninum* (L4, adultes immatures et adultes) et *Uncinaria stenocephala* adultes.

Dans une étude de terrain multicentrique de 10 jours menée aux États-Unis, 75 chiens ayant reçu une dose unique de Credelio Quattro et 38 chiens ayant reçu une dose unique d'un contrôle actif ont été évalués pour leur efficacité. Par rapport à l'état avant traitement, Credelio Quattro a fait chuter de 99,9 % le nombre d'œufs d'*Ancylostoma caninum* et de 94,4 % les œufs de *Toxocara canis* présents dans les selles.

Dans deux études de laboratoire bien contrôlées, une seule dose de Credelio Quattro s'est révélée 100 % efficace contre *Echinococcus multilocularis*.

#### Prévention de la dirofilariose

Dans deux études de laboratoire bien contrôlées, une seule dose orale de Credelio Quattro a été 100 % efficace pour prévenir le développement de *Dirofilaria immitis*

adultes chez des chiens inoculés avec des larves infectieuses 30 jours avant l'administration.

Dans une étude de terrain bien contrôlée aux États-Unis, l'efficacité a été évaluée chez 156 chiens ayant reçu Credelio Quattro et 143 chiens ayant reçu un traitement témoin actif pendant 11 mois consécutifs. Aucun chien traité avec Credelio Quattro ou le groupe témoin actif n'a été testé positif à la dirofilariose. Tous les chiens traités avec Credelio Quattro et le produit de contrôle actif étaient négatifs pour l'antigène contre *D. immitis* et les microfilaries sanguines à la fin de l'étude au jour 330.

#### Traitement du ver pulmonaire (*A. vasorum*)

Dans deux études de laboratoire bien contrôlées, Credelio Quattro s'est révélé 100 % efficace dans le traitement de *Angiostrongylus vasorum* adulte lorsque deux doses, espacées d'un mois, ont été administrées à des chiens infectés.

#### Palatabilité

Dans une étude de terrain en Europe, portant sur 630 doses administrées à 210 chiens, ceux-ci ont volontairement consommé 74 à 76 % des doses de Credelio Quattro en moins de 2 minutes, que ce soit dans une gamelle vide, posée au sol, ou lorsqu'elles étaient offertes à la main. Les doses restantes ont été consommées soit lorsqu'elles étaient administrées avec une petite quantité de nourriture, soit lorsqu'elles étaient placées dans la gueule du chien.

### **RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPOSAGE**

Conserver entre 15 °C et 25 °C. Écarts autorisés entre 5 °C et 40 °C.

### **PRÉSENTATION/TYPES D'EMBALLAGE**

Credelio Quattro (comprimés à croquer de lotilaner, moxidectine, praziquantel et pyrantel) est disponible en cinq dosages de comprimés à croquer formulés en fonction du poids du chien. Chaque format de comprimé est disponible en emballages de 1, 6 ou 12 comprimés. Tous les formats d'emballage ne sont pas nécessairement commercialisés.

### **FABRIQUÉ POUR**

Elanco Canada Limited  
1919 Minnesota Court, Suite 401  
Mississauga, Ontario L5N 0C9

### **DATE : avril 2026**

Credelio Quattro, Elanco et le logo barre diagonale sont des marques déposées d'Elanco ou de ses filiales.

© 2026 Elanco ou ses sociétés affiliées.



PrCredelio Quattro<sup>TM/MC</sup>

Carton Labels

**Front Panel**

<dog icon> X<sup>i</sup> kg

DIN XXXXXXXXX<sup>ii</sup>

<Elanco logo>

X<sup>vii</sup> <tablet graphic> Chewable Tablets/ Comprimés à croquer

PrCredelio Quattro<sup>TM/MC</sup>

(lotilaner, moxidectin, praziquantel, and pyrantel chewable tablets)  
(comprimés à croquer de lotilaner, moxidectine, praziquantel et pyrantel)  
For Veterinary Use Only/ Pour usage vétérinaire seulement  
Parasiticide

<flea graphic>

Fleas

Puces

<tick graphic>

Ticks

Tiques

<heartworm graphic>

Heartworms

Vers du cœur

<lungworm graphic>

Lungworms

Vers pulmonaire

<dog graphic>

<roundworm graphic>

Roundworms

Ascaris

<hookworm graphic>

Hookworms

Ankylostomes

<tapeworm graphic>

Tapeworms

Ténias

For dogs/ Pour les chiens

**WARNING:** Keep out of reach of children. See package insert for complete warnings.

**MISE EN GARDE :** Garder hors de la portée des enfants. Voir la notice pour les mises en garde complètes.

**Back Panel**

<Elanco logo>

Each tablet contains X<sup>iii</sup> mg lotilaner, X<sup>iv</sup> mg moxidectin, X<sup>v</sup> mg praziquantel, and X<sup>vi</sup> mg pyrantel (as pamoate salt).

**INDICATIONS:** See package insert.

**DIRECTIONS FOR USE:** Credelio Quattro is given orally once a month, at the dosage of 20–40.8 mg/kg lotilaner, 0.02–0.0408 mg/kg moxidectin, 5–10.17 mg/kg praziquantel, and 5–10.17 mg/kg pyrantel (as pamoate salt). **Credelio Quattro must be administered with food.** See insert for complete directions for use.

**STORAGE INFORMATION:** Store between 15°C and 25°C. Excursions permitted between 5°C and 40°C.

Chaque comprimé contient X<sup>iii</sup> mg de lotilaner, X<sup>iv</sup> mg de moxidectine, X<sup>v</sup> mg de praziquantel et X<sup>vi</sup> mg de pyrantel (sous forme de sel de pamoate).

**INDICATIONS :** Voir la notice.

**MODE D'EMPLOI :** Credelio Quattro est administré par voie orale une fois par mois, à une posologie de 20 à 40,8 mg/kg de lotilaner, 0,02 à 0,0408 mg/kg de moxidectine, 5 à 10,17 mg/kg de praziquantel et 5 à 10,17 mg/kg de pyrantel (sous forme de sel de pamoate). **Credelio Quattro doit être administré avec de la nourriture.** Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

**RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPOSAGE :** Conserver entre 15 °C et 25 °C. Écarts autorisés entre 5 °C et 40 °C.

**Manufactured for/ Fabriqué pour :**

Elanco Canada Limited  
1919 Minnesota Court, Suite 401  
Mississauga, Ontario L5N 0C9

### Right Panel

<tablet graphic> X<sup>vii</sup> Chewable Tablets/  
Comprimés à croquer

X<sup>i</sup> kg

<Elanco logo>  
Pr**Credelio Quattro**<sup>TM/MC</sup>

### Left Panel

X<sup>i</sup> kg

Pr**Credelio Quattro**<sup>TM/MC</sup>

<Elanco logo>

### Bottom Panel

LOT :

EXP. :

### Top Panel

X<sup>i</sup> kg

Pr**Credelio Quattro**<sup>TM/MC</sup>

<Elanco logo>

| i<br>(Body Weight) | ii<br>(DIN) | iii<br>(Lotilaner)             | iv<br>(Moxidectin)             | v<br>(Praziquantel)            | vi<br>(Pyrantel)               |
|--------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.4 – 2.8 kg       | XXXXXXXX    | 56.25 mg (En)<br>56,25 mg (Fr) | 0.056 mg (En)<br>0,056 mg (Fr) | 14.25 mg (En)<br>14,25 mg (Fr) | 14.25 mg (En)<br>14,25 mg (Fr) |
| > 2.8 – 5.5 kg     | XXXXXXXX    | 112.5 mg (En)<br>112,5 mg (Fr) | 0.113 mg (En)<br>0,113 mg (Fr) | 28.5 mg (En)<br>28,5 mg (Fr)   | 28.5 mg (En)<br>28,5 mg (Fr)   |
| > 5.5 – 11 kg      | XXXXXXXX    | 225 mg (En)<br>225 mg (Fr)     | 0.225 mg (En)<br>0,225 mg (Fr) | 57 mg (En)<br>57 mg (Fr)       | 57 mg (En)<br>57 mg (Fr)       |
| > 11 – 22 kg       | XXXXXXXX    | 450 mg (En)<br>450 mg (Fr)     | 0.45 mg (En)<br>0,45 mg (Fr)   | 114 mg (En)<br>114 mg (Fr)     | 114 mg (En)<br>114 mg (Fr)     |
| > 22 – 45 kg       | XXXXXXXX    | 900 mg (En)<br>900 mg (Fr)     | 0.9 mg (En)<br>0,9 mg (Fr)     | 228 mg (En)<br>228 mg (Fr)     | 228 mg (En)<br>228 mg (Fr)     |

vii 1, 6 or 12 tablets